

# جغرافية افريقيا وحوض النيل



الأستاذ الدكتور

محمد ابراهيم حسن

كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

مركز الاسكندرية للكتاب

٤٦ شارع الدكتور مصطفى مشرفة

ت / ٨ - ٤٨٤٦٥ - الاسكندرية





# دراسات فى

## جغرافية إفريقيا وحوض النيل

الاستاذ الدكتور

محمد ابراهيم حسن

جامعة الاسكندرية

١٩٩٧

مركز الاسكندرية للكتاب

٤٦ ش الدكتور مصطفى مشرفة

ت : ٤٨٢٦٥٨ الاسكندرية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## الفصل الاول المنهج الاقليمي والفكر الجغرافي



## الفصل الاول المحتويات

### ١ - المنهج الاقليمي

١ - الاقاليم الخاصة

٢ - الاقاليم العامة

### ب - التصنيف الإقليمي

١ - اقاليم فردية

٢ - اقاليم مزدوجة

٣ - اقاليم مركبة او كبرى

### ج - طرق التصنيف الاقليمي

١ - الاقاليم التضاريسية

٢ - الاقاليم المناخية

٣ - الاقاليم النباتية

### د - الاقاليم الطبيعية

هـ - الاقاليم الجغرافية الكبرى

### و - الهدف من المنهج الجغرافى

١ - مشكلة التعميم

٢ - مشكلة المناطق الحديثة

٣ - مشكلة مقياس رسم الخريطة

٤ - مشكلة تغير ابعاد ومساحات الاقاليم الجغرافية

### ز - المنهج الاقليمي والفكر الجغرافى

### الخرائط

شكل ١ - منطقة النواه فى الوطن العربى

شكل ٢ - الهجرات الحامية والسامية الى افريقية العربية

## الفصل الأول المنهج الإقليمي والفكر الجغرافى

### ١ - المنهج الإقليمي :

يتمثل المنهج الإقليمي فى الدراسة الجغرافية فى أن يدرس الاقليم كوحده متكاملة جغرافيا بحيث يشكل شخصية جغرافية مستقلة متميزة تتفاعل مع الإقاليم الجغرافية الأخرى فى ظل العلاقات المكانية . وهنا تناقش العوامل الجغرافية التى اعطت الاقليم شخصية خاصة بارزة تجعله يختلف عن غيره من الاقاليم الجغرافية الأخرى .

والإقليم قد يشكل جزءا من دولة أو قد يشغل مساحة واسعة تمتد فى أكثر من قارة ، وقد يتضمن قارة بأكملها . فالمساحة تختلف من إقليم إلى آخر . إلا أن أهم ما يميز كلا منها هو ظاهرة التجانس من حيث الخصائص الجغرافية التى تشكل شخصيته العامة.

١ - الأقاليم الخاصة Special regions هى اقاليم جغرافية محدودة المساحة لكل اقليم منها شخصيته الجغرافية البارزة والتى تختلف تماماً عن المظهر الجغرافى العام لغيره من الاقاليم الأخرى المجاورة .

٢ - . الأقاليم العامة Generic regions هى اقاليم جغرافية عظيمة المساحة ذات خصائص جغرافية خاصة تميز كلا من هذه الاقاليم عن بعضها الآخر . إلا أنه فى نفس الوقت يمكن تصنيف كل من هذه الاقاليم الجغرافية الكبرى إلى أقاليم أو وحدات ثانوية تتشكل بسمات جغرافية خاصة .

## ب - التصنيف الاقليمي

ويمكن أن نقسم الاقاليم الجغرافية الى ثلاث مجموعات مختلفة تبعاً للعناصر أو الاسس التي تصنف على اساسها .

أ - اقاليم فردية : وهي التي تصنف على اساس عنصر أو عامل جغرافي واحد كأساس للتقسيم مثل عامل التضاريس أو عامل المناخ أو عامل التربة .

ب - اقاليم مزدوجة : وهي التي تصنف على اساس عنصرين أو عاملين جغرافيين كعاملى المناخ والسكان مثلاً .

ج - اقاليم مركبة أو كبرى : ويقصد بها تلك الاقاليم التي تصنف على اساس اكثر من عنصرين أو عاملين جغرافيين كأساس للتقسيم . فهى الاقاليم الجغرافية الكبرى كإقليم السهول الوسطى بالولايات المتحدة الأمريكية أو إقليم خوض الامزون بأمريكا الجنوبية أو إقليم قارة استراليا . وكل منها يشكل إقليماً جغرافياً متكاملاً على اساس عوامل جغرافية مختلفة ولكن يكمل بعضها الأخرى مثل الموقع الجغرافي ومظاهر السطح والمناخ وغطاء التربة والغطاء النباتي والتوزيع السكاني وأنواع النشاط الاقتصادى وشبكات النقل .

## ج - طرق التصنيف الاقليمي

ويقصد بها الوسائل التي تحدد شخصية الاقليم وفقاً للهدف من الدراسة :

- ١ - اقاليم التضاريسية : اذ صنف الباحثون سطح الأرض إلى اقاليم تضاريسية كبرى كالاقاليم الجبلية والهضبية والسهلية وذلك تبعاً لتنوع عناصر اشكال سطح الأرض والتي منها :
- ١ - منسوب الاقليم بالنسبة لمستوى سطح البحر .
- ٢ - طبيعة الانحدار .

٣ - التركيب الصخري والتطور الجيولوجي .

٤ - تنوع الظواهر التضاريسية بالاقليم .

فهذه هى أهم العناصر التى تميز اقليمًا تضاريسيًا عن آخر (١) ، والمجدول الآتى يوضح الاقاليم التضاريسية الكبرى فى العالم .

الاقاليم التضاريسية الكبرى	امريكا الشمالية	امريكا الجنوبية	وراسيا	افريقيا	استراليا و نيوزيلند	القطب الجنوبي	سطح العالم
السهول المستوية السطح	٧	١٨	٢	١	٤	-	٥٪
السهول غير المستوية السطح	٣٠	٢٩	٣٠	٤٤	٥١	-	٣١
الهضاب	٦	١٤	٣	٥	١	-	٥
سهول يتخللها التلال والجبال	٩	٧	١٠	٢٢	١٩	-	١١
المناطق التلالية	١٥	٨	١١	١١	١٢	-	١٠
مناطق المرتفعات المتوسطة							
المنسوب	٩	١٣	٢١	١٣	١٢	-	١٤
مناطق المرتفعات العظيمة							
المنسوب	١٦	١١	٣٢	٤	١	-	١٣
الجبال الثلجية	٨	-	-	-	-	١٠٠	١١
	١٦	١٢	٣٦	٢٠	٦	١٠	١٠٠٪

وهكذا اتجهت الدراسة نحو إيضاح العلاقة المترابطة بين التركيب الصخري وظواهر سطح الارض . وتبعًا لإختلاف التطور الجيولوجى وبنية

(١) د. حسن أبو العينين : آسيا الموسمية وعالم المحيط الهادى - بيروت ١٩٦٧ - ص ٢١ وما بعدها .

الطبقات وتنوع ظواهر سطح الأرض من إقليم إلى آخر فتمكن الباحثون من تمييز اقاليم تضاريسية متباينة . وبذلك أصبح من الممكن تقسيم سطح الأرض الى اقاليم تضاريسية مختلفة على اساس تنوع اشكال مظاهر سطح الأرض من اقليم إلى آخر .

٢ - الأقاليم المناخية : قُسم سطح الأرض الى اقاليم مناخية وفقاً لتنوع خصائص العناصر الأساسية لمناخ تلك الاقاليم . والإقليم المناخى قد يمثل إقليماً واحداً مترابطاً الأجزاء . كما قد يضم عدة اجزاء متفرقة من سطح الأرض بحيث تكون خصائص العناصر المناخية المختلفة التى تشكل شخصية الاقليم المناخية لهذه الاجزاء جميعاً متشابهة إلى حد كبير .

كما جاء ذلك فى تقسيم كوبن Koppen ١٩٢١ ، وتقسيم ثورنثويت Thorntwaite ١٩٤٣ فى كتابه عن مشكلات تصنيف المناخ

(Problems in the classification of climate)

فمثلاً قد ميز كوبن خمسة أقاليم مناخية كبرى لها علاقة وثيقة بتنوع الغطاء النباتى فوق سطح الارض تتمثل فى :

١ - اقليم المناخ المدارى وأهم ما يميزه أن درجة الحرارة الشهرية لأبرد شهور السنة تزيد عن ١٨°م .

٢ - إقليم المناخ الجاف حيث القيمة الفعلية للتبخر تزيد عن تلك المكتسبة من التساقط .

٣ - اقليم المناخ المعتدل الدفئ وأهم ما يميزه أن درجة حرارة أبرد شهور السنة تتراوح من ١٨°م إلى - ٣°م .

٤ - اقليم المناخ البارد وأهم ما يميزه أن درجة حرارة ابرد شهور السنة تنخفض عن - ٣°م وأن درجة حرارة أدفأ شهور السنة ترتفع عن ١٠°م .

٥ - اقليم المناخ القطبى : وأهم ما يميزه أن درجة حرارة أدفأ شهور السنة



تنخفض عن ١٠ م.

٣ - الأقاليم النباتية : كذلك قسم الباحثون سطح الأرض إلى أقاليم نباتية مختلفة تبعاً لتنوع مجموعات النباتات الطبيعية من إقليم الى آخر. والأقاليم النباتية يشكل تجانساً في الصفات العامة لمجموعة او لمجموعات رئيسية من النباتات الطبيعية التي تغطي جزءاً معيناً أو أجزاء واسعة من سطح الأرض ، ويقسم العالم إلى أربعة أقاليم نباتية رئيسية مختلفة . ويصنف كل إقليم رئيسي الى وحدات ثانوية كما يتضح فيما يلي :

١ - أقاليم الغابات وتشمل :

أ - الغابات الاستوائية والمدارية .

ب - غابات العروض المعتدلة.

ج - غابات العروض الباردة .

٢ - أقاليم الحشائش وتشمل :

أ - حشائش العروض المدارية (السفانا)

ب - حشائش العروض المعتدلة (الاستبس)

٣ - أقاليم النباتات الشوكية الحارة الجافة وتشمل :

أ - الشوكيات على هوامش الصحارى الحارة الجافة .

ب - الاعشاب الصحراوية الجافة الفقيرة داخل نطاق الصحارى الحارة الجافة .

٤ - أقاليم نباتات الصحارى الجليدية وتشمل :

نباتات التندرا

ومن الخطأ إن نذكر بأن أى إقليم محصور بين دائرتي عرض ما لابد وأن يتميز بمجموعة معينة من الغطاءات النباتية دون تحميل غيرها من الغطاءات

النباتية الاخرى ولو بنسبة محدودة . فمثلا تغطي الغابات المدارية نحو ٧٧٪ من حملة مساحة الاقليم النباتى المعروف باسم «إقليم الغابات المدارية ... بينما تشكل المساحة الباقية من هذه الغطاءات (٢٣٪) مجموعة متنوعة من النباتات دون المدارية والمعتدلة بل والقطبية الباردة والألبية (١) .

#### د - الاقاليم الطبيعية

وهى أقاليم متميزة على اساس العناصر الكبرى ممثلة فى التضاريس والمناخ والتربة والغطاء النباتى الطبيعى فضلا عن تميزها فى ظاهرتى التطور الجيولوجى والذنبات المناخية وما لهما من أثر جوهري فى تشكيل مظاهر السطح وتكوين انواع مختلفة من التربة والغطاءات النباتية الطبيعية .

وفى رأى هيرز تسون (١٩٠٥) Herbertson وهو من اوائل الرواد الذين قسموا سطح الأرض الى أقاليم طبيعية أو فيزيوجرافية ، أن أهم الأسس او العناصر التى تميز مثل هذه الاقاليم تتلخص فيما يلى :

١ - المظهر العام لسطح الإقليم وتنوع التصريف النهري

٢ - المظاهر المناخية على مدار السنة

٣ - التركيب الجيولوجي وانماط التربة

٤ - تنوع وتدرج الغطاءات النباتية

وأهم ما يميز هذا الاقليم الطبيعى وفقا لدراسة هيربرتسون أن تكون كل اجزائه متجانسة من حيث المظهر التضاريسى والوضع المناخى والبناء النباتى الذى يسود الاقاليم (٢) .

---

(١) د. يوسف تونى : جغرافية الأحياء - الجزء الاول - جغرافية النبات - القاهرة ١٩٦١ - ص ١٣٢ .

(2) Herbertson, A.J.: "The major natural regions an essay in systematic geography" - geog. Jour- Vol. 25, 1905, p. 300 - 9.

ورجح هيرتسون إضافة العامل البشرى الى العوامل السابقة فالانسان هو الذى يشكل البيئة التى يعيش فيها ليستفيد من الامكانيات والموارد الطبيعية التى تتمثل بها وهو الذى يصقلها ويحورها وفقا لاحتياجاته ولوازمه ، ولا شك أن الانسان يساهم فى خلق الشخصية الجغرافية للاقليم ، فزراعة اى من الغلات ترتبط بالمظاهر التضاريسية والمناخية وأنماط التربة والنشاط الانسانى بالأقاليم المختلفة من سطح الأرض .

#### هـ - الأقاليم الجغرافية الكبرى :

وأذا أضفنا العامل البشرى او عامل التقنية البشرية إلى العوامل الطبيعية لتحديد شخصية الاقليم فيفضل فى هذه الحالة ان يطلق على مثل هذه الاقاليم أنها اقاليم جغرافية ، وهذه ينتاب أبعادها واشكالها التغيير المستمر من عام إلى آخر ومن فترة إلى أخرى . فمناطق القمح الذى كان يتمثل فى اقليم نيو إنجلند بأمريكا الشمالية خلال القرن السابع عشر قد تزحزح تدريجياً نحو الغرب ، وأصبح يتركز فى الوقت الحاضر الى الغرب من البحيرات الامريكية . وأصبح الاقليم الشمالى الشرقى من الولايات المتحدة الامريكية يشكل القلب الصناعى العظيم لهذه الدولة .

وهكذا يتضح انه يمكن تقسيم سطح الأرض الى اقاليم جغرافية كبرى متباينة ، وكل اقليم منها يشكل اقليماً جغرافياً متجانساً وفقاً لعوامل جغرافية تميزه عن غيره من الاقاليم . وعليه فيمكن أن يقسم سطح الأرض الى الاقاليم الجغرافية الكبرى الآتية :

١ - إقليم عالم المحيط الهادى .

٢ - إقليم الشرق الاقصى .

٣ - إقليم الاتحاد الروسى (الاتحاد السوفيتى سابقاً)

- ٤ - إقليم الشرق الاوسط .
  - ٥ - إقليم اوربا (فيما عدا الاتحاد السوفيتى)
  - ٦ - إقليم إفريقيا (فيما عدا دول الشرق الاوسط)
  - ٧ - إقليم امريكا الشمالية (دون المكسيك)
  - ٨ - إقليم امريكا اللاتينية
- ويبدو أن اساس التقسيم لم يكن واحداً بل لكل من هذه الاقاليم شخصيته الجغرافية الخاصة والتي تختلف عن غيره من الاقاليم الأخرى فعلى سبيل المثال إن أهم ما يشكل الملامح الجغرافية الأساسية لأقليم المحيط الهادى يمكن أن نلخصها على النحو الآتى :
- ١ - اتساع المسطحات المائية عن اراضى اليابس .
  - ٢ - عظم مساحة الإقليم وقلة عدد سكانه.
  - ٣ - طبيعة النشاط الاقتصادى لجزره المتناثره من ناحية ، وبالقارات التى اكتشفت حديثاً ممثلة فى استراليا ونيوزيلندا من ناحية أخرى .
- وإقليم الشرق الأقصى يعرض شخصية جغرافية متميزة بلامح اساسية من أهمها :
- ١ - المناخ الموسمى السائد لمعظم أجزائه وتشابه الظروف المناخية والغطاءات النباتية من مكان لآخر .
  - ٢ - تشابه التركيب الجنسى لسكان الإقليم .
  - ٣ - عظم كثافة السكان بهذا الاقليم .
  - ٤ - إشتغال معظم السكان بحرفة الزراعة وانخفاض مستوى المعيشة لمعظم سكان اجزاء الاقليم .
- ومثل هذا التقسيم لاجزاء المعالم الى اقاليم جغرافية عظمى لم يلتزم بالحدود السياسية. ولكن تدرس الجغرافيا الاقليمية للدول المختلفة التى تقع داخل نطاق كل من الاقاليم الجغرافية الكبرى . أو بعبارة أخرى تناقش المقومات العامة

للإقليم الجغرافى الرئيسى التى تساهم فى خلق شخصيته الجغرافية المتميزة ، ثم جغرافية الدول التى تقع داخل نطاقه . ذلك لأن البيانات الاحصائية الدولية التى تفسر التطور الاقتصادى والمظاهر الاجتماعية والسكانية تختص عادة بدراسة كل دولة على حده وهى المحصورة داخل حدود سياسية متفق عليها دولياً .

وتبعاً لسهولة هذا التقسيم وتعيينه للأقاليم الجغرافية الكبرى بالعالم فى صورة مبسطة ، تظهر معظم احصائيات هيئة الأمم المتحدة فى الوقت الحاضر وفقاً لهذا التصنيف .

#### ٩ - الهدف من المنهج الإقليمى

ويمثل هذا الهدف فى إبراز الشخصية الجغرافية المتكاملة للإقليم مع التركيز على إبراز القيمة الفعلية الاقتصادية لهذا الإقليم وإمكانياته الطبيعية التى تضمها أراضيهِ والتى قد تساهم فى المستقبل القريب فى تقديم الحضارة البشرية خطوات سريعة نحو الرقى والتطور . ومن ثمَّ إيضاح الصورة الجغرافية العامة لأقاليم سطح الأرض المختلفة وإبراز أوجه الشبه والاختلاف بين كل إقليم وآخر . وتساهم الدراسة الجغرافية الإقليمية كذلك فى جمع معلومات متنوعة يهتم بها المختصون بشئون التخطيط والتنظيم الإقليمى وإيضاح أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية فى إقليم ما مثل مد الطرق وإنشاء الموانئ والمطارات وبناء الجسور والخزانات وإصلاح الأراضى البور والعناية الصحية للسكان، وإقتراح كيفية حل هذه المشاكل بأبسط الطرق وبصورة اقتصادية وفقاً للموارد الطبيعية بالإقليم وإمكانياته ومتطلباته فى المستقبلين القريب والبعيد .

هذا فضلاً عن إيضاح الأهمية السياسية والاقتصادية والسكانية لبعض الدول لإحياء الشعور القومى بها . فالدراسة الإقليمية للوطن العربى تبرز المقومات الجغرافية بوحده كإقليم جغرافى متكامل تأكيداً لهذا الشعور الجارف بالقومى العربية بين عشرات الملايين من السكان العرب فى منطقة تمتد ستة آلاف



كيلو متراً من الخليج إلى المحيط . فما القومية الأ شعور بالانتماء الى جماعة معينة على أسس معينة . والمقومات هي حقائق قائمة يكون البحث فيها مهمة وصفية تحليلية لا مسألة خلافية اجتهادية . فشعور العرب بقوميتهم وشخصيتهم المتميزة إستمر كاملاً حتى في فترات الاحتلال الأجنبي لبلادهم ورغم توجيه الاقتصاد الوطنى لمصلحة الدولة الاجنبية المستعمرة والتحالف مع الاقطاع المحلى والاقطاع المستورد متمثلاً فى الاستيطان القسرى للأوروبيين فى المغرب العربى وفلسطين .

وفى مجال التقييم العلمى للإقليم الجغرافى يحسن أن نشير إلى ما يسمى بمنطقة النواه فإن لكل حركة من حركات الوحدة الاقليمية «نواة» تتوفر لها مقومات طبيعية وبشرية واقتصادية متكاملة تبرز أهمية وحده الاقليم الجغرافى فيدعو الأهالى ويتصدون لتحقيقها . ومن أمثلة هذه المنطقة المركزية مقاطعة «براندنبرج» التى كانت نواه القومية الألمانية والتى أتاح لها توسط موقعها الجغرافى سهولة الاتصال بسائر أجزاء الوطن الألمانى ومنها انتشرت تيارات الوحدة الى المقاطعات الأخرى . ومثل ذلك يقال عن «حوض باريس» بالنسبة لوحده فرنسا ، ودوقية «موسكوف» بالنسبة لوحدة روسيا ، و «مملكة وسكس Wessex» فى جنوب إنجلترا بالنسبة لبريطانيا .

أما فى الوطن العربى كإقليم جغرافى متكامل فإن منطقة وادى النيل الأدنى والشام تمثل منطقة النواه لما تمتاز به من موقع جغرافى مشالى يشكل المكان الوسط الذى يمتد ما بين افريقيا العربية والغرب الاسيوى . وهى تضم اكثر من ثلث سكان الوطن العربى فضلاً عما تمتاز به من تنوع فى الثروة الاقتصادية ، وغو حضارى متقدم (١) . وهذه المنطقة هى التى أوقفت موجات المغول والموجات الصليبية التى داهمت الوطن العربى وهى التى تعمل على توحيد الوطن العربى

(١) د يوسف ابو الحجاج : وحدة الوطن العربى القاهرة . ١٩٦٠ ص ٦ وما بعدها .

فى اقليم جغرافى متكامل .

وهناك بعض المشاكل التى تعترض المنهج الإقليمى فى الدراسات الجغرافية  
والتي من أهمها :

#### ١ - مشكلة التعميم :

فعلى الرغم من أن الباحث يضع عادة اسساً ثابتة محددة عند تصنيفه  
للإقليم الجغرافى فقلماً نجد أن كل اجزاء الاقليم الواحد متشابهة كل التشابه أو  
متجانسة تماماً وكثيراً ما يصادف الباحث مناطق قد تكون صغيرة المساحة ولكنها  
تشكل بصفتها ثانوية قد لا تتفق مع الأسس أو الشروط العامة التى وضعت  
لتصنيف اقليم جغرافى ما . ومن ثم يأتى التعميم فى مثل هذه الدراسة إذ يجمع  
الباحث كلاً من هذه المناطق الصغيرة المتناثرة المختلفة الخصائص الجغرافية ضمن  
الاقليم الجغرافى الرئيسى .

#### ٢ - مشكلة المناطق الحدية أو الهامشية :

ويقصد بها هذه الأراضى التى تمتد حول إقليم جغرافى ما فاصله بينه وبين  
إقليم جغرافى آخر مختلف ومجاور . ومثل هذه الاقاليم الهامشية تجمع بين  
خصائص الاقليمين المجاورين المختلفين وفى مثل هذه الحالات يحسن أن تصنف  
مثل هذه الاراضى الحدية على انها مناطق انتقالية ويمثل إقليم ممر كاراكاسون  
Carcassone منطقة حدية بين كل من اقليم هضبة فرنسا الوسطى وإقليم  
مرتفعات البرانس فى الجنوب الفرنسى . ويعطى مثلاً جيداً لهذا النوع من  
المناطق الحدية الانتقالية .

#### ٣ - مشكلة مقياس . رسم الخريطة

إذ تختلف مدى كثافة المعلومات التى تضمها خريطة تصنيف الاقاليم  
الجغرافية الكبرى تبعاً لاختلاف مقياس الرسم الذى انشئت على أساسه فإذا  
كانت هذه الخريطة ذات مقياس صغير ( ١ : ١ مليون مثلاً ) فإنه من الصعب أن  
يوضح عليها كل التفاصيل الثانوية الدقيقة لتمييز تلك الاقاليم الجغرافية

المختلفة. والعكس قد يكون صحيحاً .

#### ٤ - مشكلة تغير أبعاد ومساحات الاقاليم الجغرافية :

فالأقاليم الجغرافية ليست ثابتة تماماً في ساحاتها وابعادها بل أن هذه الأبعاد تتغير من فترة زمنية الى أخرى تبعاً للصورة النهائية للملامح الجغرافية. ولنضرب مثلاً بالأقاليم الجبلية الى تتغير خصائصها الجغرافية من فترة الى أخرى لفعل التعرية الشديدة او لفعل التساقط والانزلاق فينخفض منسوبها او قد تصبح اكثر تصرفاً عما كانت عليه من قبل . كما قد تتعرض الى حدوث الثورات البركانية والتي قد تضيف مواداً جديدة الى سطح الاقليم وتشكله بظاهرات تضاريسية جديدة لم تكن تتمثل به من قبل . وكثيراً ما تسمع عن ظهور جزر بركانية جديدة فوق ارضية المحيط الهاد وترتفع تدريجياً فوق سطح مياه المحيط . وقد يهبط بعضها نحو القاع من جديد وتتلاشى تدريجياً . هذا بالإضافة الى مساحات كبيرة من المستنقعات تجفف تدريجياً كما هو الحال في جنوب العراق وشمال دلتا النيل .

ومن زاوية التوسع الاقليمي فإقليم الاتحاد السوفيتي في اوراسيا لم تظهر أهميته وشخصيته الجغرافية المميزة إلا بعد قيام الثورة الروسية الشيوعية عام ١٩١٧ وما تبعها من اتساع رقعة الاقليم بعد ما جنت البلاد من مكاسب عند نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥ ، ثم ما أصاب هذا الاتحاد السوفيتي من تفكك منذ عام ١٩٩٣ وظهور الاتحاد الروسى ممثلاً في دولة روسيا الاتحادية على انقراض الاتحاد السوفيتي السابق واستقلال دولة السابقة تحت اسم جماعة الكومولث او الاتحاد الروسى .

ويعمل كل عربى مخلص اليوم على إبراز الكيان المتماسك لاقليم الوطن العربى الكبير الممتد من الخليج العربى شرقاً الى المحيط الأطلسى غرباً حيث ترتبط جميع اجزاء هذا الاقليم بروابط تاريخية وثقافية ودينية ولغوية وحضارية وجنسية وقومية واحدة . ومن ثم تثل اراضى هذا الاقليم في الوقت الحاضر

إقليمًا جغرافيًا مميزًا عن بقية اجزاء العالم الأخرى وقد أضيفت اليه مساحات جديدة فى القرن الاثني عشر والأراضى الهامشية . هذا فضلاً عن ربطه بشبكات المواصلات العالمية الجوية والارضية والبحرية ولا سيما قناة السويس التى خلقت منه اقليمًا وسطًا فى قلب العالم القديم .

### ز - المنهج الاقليمي والفكر الجغرافى

إذ أن أصول الفكر الجغرافى تعرضت للمنهج لاقليم منذ العصور القديمة. فالحديث عن العلاقة بين البيئة والانسان فى اقاليم جغرافية متباينة يشكل حديثًا قديمًا يرجع إلى ايام الاغريق الرومان . فلأهل الجبال صفات لا تتوفر لأهل السهول . إذ أن سكان الجبال قوم طوال القامة يتصفون بالشجاعة والخلق ، بينما يمتاز سكان السهول بأنهم نحاف قصار القامة . وأشار هيرودوت فى زيارته لمصر فى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد أن تمتع المصريين بصحة متكاملة يكمن فى قلة تقلب الطقس وأن نهر النيل خلق منهم شعبًا زراعيًا متعاونًا فى ظل نظام إدارى فرضته البيئة المصرية التى خلقت من وادى النيل الأدنى إقليمًا جغرافيًا متكاملًا.

وقد اختلفت مثل هذه الأفكار فى اوربا المسيحية فى القرون الوسطى إذ ساد الاعتقاد إن اختلافات المناخ والتضاريس وتباين البشر فى الشكل والطباع إنما هى من حكمه الله تعالى ولا نقاش فيها نتيجة لهيمنة الكنيسة على الفكر الإنسانى فى هذه الفترة . أما الجغرافيون المسلمون فكان لهم شأن آخر أذ اهتموا بدراسة العلاقة بين البيئة والانسان فى اقاليم جغرافية متباينة (١) . وذلك كما جاء على سبيل المثال فى « مقدمه .. ابن خلدون » وفى كتاب « الحيوان ..

---

(١) د. عبدالفتاح محمد وهيبه : الارض والانسان - دراسة فى قواعد الجغرافيا البشرية - ص ٢ ، وما بعدها .

للجاحظ» وفى «الارجوزة السنية .. لابن سينا وفى «مروج الذهب ..  
للمسعودى» وفى «جغرافية الهند.. للبيرونى» وفى «عجائب المخلوقات  
وغرائب الموجودات .. للقزوينى» . ولا شك أن ابن خلدون من رواد القرن الرابع  
عشر الميلادى. كان انقيهم نظرة، وأوفاهم منهجاً، وأغزرهم مادة... وقد ناقش ابن  
خلدون التباين فى المظاهر المناخية والبيئية فى اقاليم جغرافية مختلفة وفق منهج  
اقليمى واضح .. وقد بين أن المعبر من الأرض حو أوسطها لإفراط الحر فى  
المجبوب والبرد فى الشمال . كما أن هذا المعبر من الأرض يتباين فى اقاليم  
جغرافية متنوعة وفقلاً لدى درجة خصوبة الترب ومدى الاستثمار البشرى لها .

وقد تعمق جغرافيو الغرب فى دراسة العلاقة بين البيئة والانسان فى  
اقاليم جغرافية متباينة مع اتساع دائرة المعرفة والنشاط فى البحث  
العلمى منذ اوائل القرن التاسع عشر . ونشير خاصة الى هيمولت ( ١٧٦٩ -  
١٨٥٩ ) Von Humbolt الذى تعتبر دراساته نقطة تحول فى تاريخ الفكر  
الجغرافى اذ اعتبر الانسان عاملاً جغرافياً يغير من سطح الأرض وفى نفس الوقت  
يتأثر بظروف البيئة الطبيعية فى اقاليم جغرافية متنوعة . وفى اواخر القرن  
التاسع عشر ظهر فيدال دى لابلان رائد المدرسة الفرنسية فى البحث الجغرافى  
الاقليمى الذى اكد على عمق العلاقة المتبادلة بين الانسان والبيئة فى اقاليم  
جغرافية متنوعة . ولا سبيل لاهراز وحدة الجغرافيا فى رأيه إلا باتباع المنهج  
الاقليمى . وتؤكد المدرسة الفرنسية الاقليمية ان الانسان ليس عبداً للبيئة وإنما  
يختار من بين امكانياتها ما يشاء تبعاً لمستواه الحضارى والتكنولوجى . فإن  
أنماط النشاط الاقتصادى على سطح الأرض فى اقاليم جغرافية متباينة ما هى  
إلا نتيجة لتفكير الانسان .

ويجب أن نؤكد على ظاهرة التكامل بين الانسان والبيئة فى أى اقليم  
جغرافى فالانسان ليس عبداً للبيئة كما اعتقد بعض المفكرين مثل فردريك  
ديمولان F. Demolins فى كتابه :



### Comment la route cree le type social

بحيث يؤكد انه لو أعاد التاريخ نفسه فلن يتغير فيه شيء لأنه سيكون استجابة لنفس مقتضيات البيئة متجاهلاً عامل الوراثة والسلالة ونمو الفكر البشرى. إلا أن راتزل F. Ratzel (١٨٤٤ - ١٩٠٤) كان أكثر اعتدالاً فاهتم بأعمال الانسان وكيف تخضع لمقتضيات البيئة كما إهتم بتوزيع الانسان على سطح الأرض والعوامل الطبيعية التي تتحكم في هذا التوزيع . وقد شبه الدولة أو الإقليم بكائن حي يخضع لقوانين طبيعية في نموه واضمحلاله . وجاءت تلميذته إلن سمبل Ellen Semple في كتابها الذي نشر ١٩١١ :

### Influences of Geographic Environment


فشرحت آراء راتزل الذي لم ينكر دور العامل البشرى في البناء الإقليمي . ووضحت ان الانسان من نتاج البيئة في أى إقليم جغرافى فهى التى رعته وغذته وهيئت له اعمالاً ووجهت افكاره وواجهته ببعض الصعاب الا انها همست له بتعليمات لحلها .

ومنذ اوائل القرن العشرين ازداد الاهتمام بعامل النشاط البشرى فى التغيير البيئى في أى إقليم جغرافى . فعلى المستوى الحضارى والتكنولوجى الذى وصل اليه المجتمع يتوقف مدى استثمار البيئة زراعياً حيث توجد الارض الخصبة المناسبة واستخراجاً للثروات المعدنية من باطن الأرض واستغلالها . كما أن اختيار المجتمع لبعض عناصر البيئة او نوع استغلاله للبيئة قد يتغير على مدى الزمن تبعاً لمدى إحتكاكه بالمجتمعات الاخرى فى اقاليم جغرافية مختلفة .


والمهم ان الانسان يتمتع بحرية مقيدة إذ أن البيئة تضع حدوداً عامة لم يستطع الانسان ان يتعداها . فهو لم يستطع ان يستقر فى القارة المتجمدة الجنوبية ولا فوق قمم الجبال المغطاة بالثلوج ولا فوق الكشبان المتحركة. ولم يستطع ان يتكاثر في الجهات الصحراوية الجافة ولا فى الجهات الغزيرة الامطار الدائمة . والبيئة عادة تضع اسلوب المعيشة او نمط الحياه الذى يتبعه الانسان.

فقلة الامطار وقلة الماء الباطنى لا تسمح بالاستقرار ولكن تؤدى الى نوع من الترحال والانتقال ، كما أن شدة البرودة فى المناطق القطبية لا تسمح بقيام الزراعة ويقوم الانسان بالصيد . وبطبيعة الحال فالإنسان البدائى اكثر تأثراً لظروف البيئة الطبيعية من الإنسان المتحضر وأقل تغييراً لضوابطها.

والمهم أن الجغرافى يجب ان يدرس فى اى اقليم جغرافى مدى التكامل بين عناصر البيئة الطبيعية وأنماط النشاط البشرى الى جانب تطوره واسلوب الحياة فيه.



شكل ١ - منطقة «النراة» في الوطن العربي



— الوطن العربي ، مركزه في المواصلات الجوية العالمية .

## الفصل الثانى الجغرافيا الطبيعية لإفريقيا

## الجغرافيا الطبيعية لإفريقيا

### المحتويات

#### أولاً : البنية والتطور الجيولوجى

- ١ - التطور الجيومورفولوجى .
- ٢ - ظاهرة الأخدود الإفريقى .
- ٣ - البحيرات الأخدودية .
- ٤ - ظاهرة النطاق الألبى .
- ٥ - نمو السهول والأودية النهرية فى الزمن الرابع .

#### ثانياً : التضاريس والأقاليم التضاريسية

- ١ - إقليم المغرب الأطلسى .
- ٢ - إقليم هضبة الصحراء الكبرى .
- ٣ - إقليم الهضبة الحبشية والهضبة الإستوائية .
- ٤ - إقليم الهضبة الجنوبية .

#### ثالثاً : المناخ والأقاليم المناخية النباتية

- ١ - العوامل الجغرافية التى تؤثر فى تنوع المناخ .
- ٢ - عناصر المناخ وأهميتها فى تنوع الأقاليم المناخية .
- ٣ - الأقاليم المناخية النباتية :
  - أ) المناخ الإستوائى والغابات الإستوائية .
  - ب) المناخ المدارى والسفانا الإفريقية .
  - ج) المناخ الصحراوى ونبات المناطق الهامشية .
  - د) مناخ البحر المتوسط وغطاؤه النباتى .
  - هـ) ظاهرة إنتشار العيون بأنواعها .

## الجغرافيا الطبيعية لإفريقيا

### أولاً : البنية والتطور الجيولوجى

#### ١- التطور الجيومورفولوجى :-

منذ ما قبل الزمن الأول كانت إفريقيا تشكل جزءاً من قارة جندوانا Land Gondwana أو القارة الجنوبية الضخمة التى تمتد ما بين جنوب آسيا وأستراليا حتى أمريكا الجنوبية . وفى الزمن الأول ساد المظهر الهضبي وكانت إفريقيا تحتل مركزاً وسطاً ، وفى الزمن الأول وأثناء الزمن الثانى تصدعت هذه الكتلة الضخمة وتفرقت أجزاؤها مكونة ما يعرف الآن بإفريقيا وأستراليا وهضبة الدكن الهندية وهضبة البرازيل وماجاورها وقارة إنتركيتيكا الجنوبية Antarctica . ويؤيد هذا الرأى تشابه التعاريج الساحلية الغربية لإفريقيا مع التعاريج الساحلية الشرقية لأمريكا الجنوبية وإنطباقهما . والتشابه فى البنية ما بين الجنوب الأفرقى والأرجنتينى وماحولها . وكذلك التشابه فى التركيب الصخرى ما بين جنوب غرب إفريقيا مع مرتفعات البرازيل الجنوبية .

وإستمرت الهضبة الإفريقية متماسكة فى جوهرها ولم تتأثر بالأحداث التكتونية والإلتوائية إلا قليلاً فى أطرافها . فطغيان مياه البحر القديم على أطرافها فى الزمن الثانى لهبوط أصابها ثم إنحسار هذه المياه البحرية أضاف إلى حافات القارة صخوراً جبيرة رسوبية تظهر فى مساحات واسعة شمال وشرق القارة بنوع خاص .

ومع إنتهاء العصر الترياسى بالزمن الثانى انفصلت جزيرة مدغشقر عن القارة الأم فالتركيب الصخرى متشابه بينهما فى أرض الجزيرة ومايقابلها من اليابس الإفرقى كصخور بلورية ورسوبية .

وفى العصر الكريتاسى بأواخر الزمن الثانى امتد لسان بحرى ما بين خليج

سرت بالشمال الإفریقی حتى جنوب نيجيريا والكمرون مكوناً نطاقاً من صخور  
جيرية . وذلك أثناء التوسع البحرى الضخم لبحر تيسسس Tethys القديم  
نتيجة للهبوط الهضبي العام .

#### ٢- ظاهرة الأخدود الإفریقی :-

ولعل من أهم الظواهر الفيزيوجرافية التى تكونت منذ أواخر الزمن الثانى  
وأوائل الزمن الثالث ظاهرة غور الأخدود الإفریقی الآسيوى العظيم الذى يمتد ما بين  
شمال مصب نهر زمبيزي بالجنوب الإفریقی متضمناً بحيره ملوى حيث يتشعب  
الى شعبتين إحداها الشعبه النيلية الغربية متضمنه بحيرات جنوب النيل  
حتى نيل فكتيريا . وأما الشعبه الشرقيه أو الحبشيه فتخترق جنوب إثيوبيا الى  
البحر الأحمر بخليجين . خليج العقبة وخليج السويس الى الغرب الآسيوى فى مد  
أخدودى عظيم يحتضن منخفض الأردن حيث البحر الميت ووادى البقاع اللبنانى  
حتى الجنوب التركى فى هضبة الأناضول . ويبلغ طول هذا الأخدود نحو ٤٨٠٠  
كم . وخير مثال لهذا الأخدود الإفریقی الآسيوى فيزيوجرافياً موضعاً مظاهر  
البيشة جيمورفولوجيا وتباين التركيب الصخرى وتعدد الإنكسارات والخوانق  
والسدود البركانية مع تناثر القمم البركانية وانتشار الأودية الجانبية ، خير مثال  
لكل هذه المظاهر الجيمورفولوجية المتباينة هو إقليم حوض نهر الأردن . كما يبدو  
من الدراسة الآتية :

#### ١- ظاهرة الانكسارات الجانبية وتكوين الأودية :

تكون حوض الأردن كجزء من الأخدود الآسيوى فى الفترة من العصر  
الكريتاسى الى عصر البلاوسين <sup>(١)</sup> . ويحتضن الحوض نهر الأردن بروافده  
المختلفة والبحر الميت ووادى العربيه <sup>(٢)</sup> ، ويحد شرقاً بهضبة الأردن وغرباً

W. B. Fisher : The Middle East, London 1950, p. 12 (١)

(٢) راجع خريطة فلسطين الطبيعية موضحاً عليها خطوط الإرتفاعات فى : The Time Atlas. Plate 52



بهضبة فلسطين . أما هضبة الأردن الجيرية فيزيد ارتفاعها في الجنوب بحيث يصل الى أكثر من ١٤٠٠ متر في اقليم معان . ويقل ارتفاعها نحو الشمال بحيث يتراوح بين ٢٠٠ ، ٥٠٠ متر في اقليم جرش . ويشذ عن هذه القاعدة جبل عجلون في الشمال حيث يزيد ارتفاعه عن ١٠٠٠ متر . وقد قطعت هذه الهضبة بعدد كبير من الأودية التي تنساب نحو المنخفض ، مثل وادي موسى في أقصى الجنوب حيث يتجه نحو الشمال الغربي وينتهي الى وادي العرابية ، ووادي الضبعة في الوسط وهو يمر بقلعة الضبعة وينتهي الى البحر الميت ، ووادي الزرقاء في الشمال وينتهي الى نهر الأردن .

وأما هضبة فلسطين فتتمثل في اقليم مفرط في الطول بالنسبة لمساحته الصغيرة التي لا تزيد على ٢٦,٠٠٠ كيلو متر مربع . ويمتد هذا الطول الهائل من نابلس على حدود الاقليم السوري الى رأس خليج العقبة لمسافة ٤٥٠ كم . أما العرض فلا يكاد يتجاوز ١٨٠ كم في أوسع جزء ، وأقل من هذا بكثير في معظم العروض . وإذا تبعنا هذه الهضبة من الشمال الى الجنوب وجدنا الكتلة الجبلية الشمالية التي تتكون من صخور جيرية والتي تعرف بالجليل يتراوح ارتفاعها في المتوسط بين ٣٠٠ ، ٧٠٠ متر فوق سطح البحر ، وأعلى نقطة فيها - وهي أعلى نقطة في فلسطين كلها - لا تزيد عن ١٣٠٠ م . وتطل هذه الهضبة نحو الجنوب بحافة انكسارية شديدة الانحدار على سهل مرج بن عامر الخصيب . وهو سهل أخدودي هبط على طول خطوط انكسارية ، وتغطي سطحه تربة سوداء غنية هي خليط من التفتات الجيرية والبالزلية التي حملتها عوامل التعرية من الصخور الجيرية والسدود البالزلية التي تتخلل هذه الصخور .

والى الجنوب من هذا السهل الأخدودي تمتد هضبة السامرة (حيث مدينتي جنين ونابلس) ثم هضبة يهودية أو الخليل (حيث بيت المقدس والخليل) . وهنا أيضا تسود الصخور الجيرية ولا يختلف متوسط الارتفاع كثيرا عن هضبة

الجليل . وإلى الجنوب من ذلك تمتد هضبة النجب ، وهي تشغل نحو نصف مساحة فلسطين وتبدو على شكل مثلث قاعدته فى الشمال بين البحر الميت والبحر المتوسط على خط عرض الخليل (حبرون) غزة تقريبا <sup>(١)</sup> . ويتبع ضلعاه خطى الحدود الفلسطينية الأردنية من ناحية ، والفلسطينية المصرية من ناحية أخرى . ويكاد يلتقى الضلعان عند خليج العقبة وتنحدر هذه الهضبة نحو منخفض الغور بسلسلة من الانكسارات المتوازية ويتراوح ارتفاعها بين ٥٠٠ ، ١٠٠٠ متر . والنجب الشمالى خاصة هضبة متوسطة الارتفاع كثيرة العيون والآبار وتغطيها تربة رملية مختلطة بالجير .

وقد قطعت هضبة فلسطين هي الأخرى بعدد كبير من الأودية التى تنساب نحو منخفض الأردن مثل وادى الرمان ووادى جيب اللذان يصبان نحو الشمال الشرقى من وادى الغور . ووادى الخليل الذى يبدأ من جبل الخليل وينتهى الى البحر الميت .

والهضبتان الفلسطينية والأردنية تخران بالانكسارات أو الفوالق الأرضية الجانبية ، والتى قد حولت بفعل عوامل التعرية الى أودية تنتهى نحو منخفض الأردن . ويتجمع فى هذه الأودية مياه السيول هذا فضلا عن المياه الباطنية . ويلاحظ أن الوادى عادة يتكون من مجموعة من المنخفضات الحوضية التى غطيت برواسب حديثة ، وفى قيعان هذه المنخفضات تتسرب وتتجمع المياه الباطنية .

#### ب- ظاهرة السدود البركانية ،

وتتمثل فى سدين : أحدهما الى الجنوب من بحيرة الحولة ، والثانى الى الجنوب من بحيرة طبرية . وخلف كل سد تجمعت مياه الأمطار والمسيلا


(١) محمد السيد غلاب : الجغرافية التاريخية لاقليم النجب . ص ٧٩ (المجعية الجغرافية المصرية - محاضرات الرسم الثقالى ١٩٥٦) .

وتكونت بحيرة فى اقليم حوضى . ومن فتحات فى هذه السدود خرجت مياه البحيرات لتغذى نهر الأردن . وتظهر الفتحة الرئيسية فى الطرف الجنوبى الشرقى لبحيرة الحولة ، والركن الجنوبى الغربى لبحيرة طبرية . وهكذا تقوم بحيرتا الحولة وطبرية بدور الخزانات الطبيعية لتغذية النهر الرئيسى . وظهرت هذه السدود البازلتية كرد فعل للحركة الأخدودية فى أواخر الزمن الثالث . وتظهر مثل هذه السدود البازلتية فى بعض الأودية الجانبية فى حوض الأردن وكذلك فى وادى البقاع الى الشمال من حوض الأردن . وخير مثال لذلك السد البازلتى فى مجرى نهر العاصى وفى قسمة الأوسط ، مما أدى الى تكوين مستنقعات الغاب التى تزيد مساحتها على ٣٥ , ٠٠٠ هكتار ( ٨٧, ٥٠٠ فدان ) .


#### جـ - ظاهرة انتشار طبقات اللافا<sup>(١)</sup>


تغطى التكوينات البازلتية البركانية مناطق متناثرة فى حوض الأردن ولاسيما فى هضبة حوران فى القسم الجنوبى الغربى من الاقليم السورى ، وكذلك فى الأطراف الشمالية من حوض الأردن حيث منابع نهري بنىاس والحصبانى . وتتميز هذه المناطق بكثرة الانكسارات التى مهدت لتكوين مثل هذه الطبقات من اللافا . وتتميز هذه المناطق بكثرة القمم البركانية ولاسيما جبل الدروز الى الشرق من السويداء مما أدى الى تعقد كبير فى النظام التضاريسى . وقد قطعت هذه الهضاب البركانية بعدد كبير من الأودية ولاسيما فى القسم الغربى من هضبة حوران حيث تنحدر هذه الأودية نحو الغرب وهى تقلل المنابع العليا لنهر اليرموك الذى يصب فى نهر الأردن الى الجنوب من بحيرة طبرية .

(١) بيروت ١٩٤١ Jacques Eddé : Geographie Liban - Syrie راجع خريطة التكوينات البركانية ص



١ - طبقات رسوبية ٢ - مياه باطنية ٣ - القاعدة الصخرية  
W. Fisher : The Middle East.





Zegeen Bada : Computer Aided - Syria

### ٣- البحيرات الأخدودية :-

والبحيرات الواقعة فى هذا الأخدود العظيم تمتاز بأنها بحيرات طويلة .  
أولها بحيرة نياسا أو ملاوى التى تقع فى الأطراف الجنوبية للأخدود بطول يصل  
الى ٥٧٥ كم ولا يتجاوز عرضها ٢٢ كم . وتنصرف مياهها جنوباً فى نهر شيرى  
الى نهر الزمبيزى . وأما بحيرة تنجانيقا فتقع فى الفرع الغربى أو النيلى من  
الأخدود وهى من أعمق بحيرات العالم بحق يصل الى ١٢٢٣ متراً . وتمتد الى  
الشمال منها بحيرة كيفو Kivu . ثم بحيرة إدوارد (أمين) . يليها شمالاً  
بحيرة ألبرت Albert أو مويوتو . ويصل بينهما نهر سمليكى Semliki .  
وينتهى الى بحيرة ألبرت نيل فكتوريا أو النيل الأعلى الذى ينبع من بحيرة  
فكتوريا بالهضبة الإستوائية . ويخرج من بحيرة ألبرت نيل ألبرت الذى يدخل  
السودان باسم بحر الجبل ويشكل اعالي نهر النيل الرئيسى .

أما بحيرات الفرع الشرقى أو الحبشى من الأخدود فأهمها بحيرة رودلف  
Rudolf التى تقع فى كينيا إلا الطرف الشمالى فيمتد فى إثيوبيا ويصب  
فيها نهر أمو Omo آتياً من الحبشة . بالإضافة الى بحيرات صغيرة أخرى الى  
الشمال منها . وتقع فى المد الأخدودى الذى ينفرج نحو البحر الأحمر .

ويجوار هذه البحيرات تظهر بعض الجبال البركانية الشامخة مثل جبل كينيا  
وجبل كلمنجارو Kilimngaro .

### ٤- ظاهرة النطاق الألبى :-

ممثل فى المغرب العربى الأطلسى الذى تكون أثناء الزمن الثالث فى ظل  
الحركة الألبية الضخمة التى شملت حوض البحر المتوسط وإمتدت فى شكل  
نطاق أوراسى يمتد ما بين الهضبة الأيبيرية المطلة على المحيط الأطلسى غرباً حتى  
هضبة التبت وهضاب الصين شرقاً الى المحيط الهادى . ويقابل هذا النطاق  
الأوراسى نطاق آخر ألبى يمتد ما بين أقصى الشمال فى شبه جزيرة ألسكا بأمريكا

الشمالية الى جزر تيرا دلفويجو Tierra Dellfuago بأقصى أمريكا الجنوبية وذلك فى نطاق ضخم غرب الأمريكتين .

ويمتاز هذا النطاق الأطلسى بالتباين التضارىسى فى تعدد سلاسله الجبلية المتوازية التى تحتضن هضاباً حوضية مقطعة بشبكات من الأنهار والأودية الجافة على نحو يشرح فى النظام التضارىسى .

وأثناء الزمن الجيولوجى الثالث وفى أواخر الزمن الثانى نتيجة للحركة الألبية الضخمة وُلِّمَ الأخدود الأفريقى الآسيوى ، تصدعت الهضاب الإفريقية ولاسيما الهضاب بالجنوب الإفريقى وظهرت جبال إندفاعية ومدرجات هضبية . كما ظهرت نتوءات صخرية أركيه فى مساحات واسعة تقدر بنحو ثلث مساحة القارة . وهى تحتوى على صخور بلورية ولاسيما من الكوارتز . وكذلك على صخور متحولة مثل الشيست والنيس والرخام . وتحتوى هذه الصخور على معادن مهمة بكميات إقتصادية وبأنواع جيدة مثل النحاس فى زائير وزامبيا والذهب فى غانة والترنسفال .

#### ٥- هو السهول والأودية النهرية فى الزمن الرابع :-

إذ إمتدت السهول فى نطاق طويل يحيط بالهضاب الداخلية والمرتفعات المجاورة . وقد نمت تدريجياً كرد فعل لتراجع المياه البحرية من ناحية والإرتفاع التدريجى للنطاق الألبى والأراضى المجاورة المتأثرة بالحركة الألبية من ناحية أخرى وتكونت أنواع من السهول الرسوبية فى مساحات واسعة تغطى بأنماط متباينة من التربة . كما تكونت الأودية النهرية مثل وادى النيل ووادى الكنفو ووادى نهـر الزمبىزى ووادى نهـر الاورنـج وانهار الغرب الأفريقى والشمال الأطلسى .

وفى عصر البلايستوسين بالزمن الرابع تأثر الشمال الإفريقى وكل حوض

البحر المتوسط بالعصر المطير الذي يقابل العصر الجليدى الأوربي بفتراته المختلفة . فتحوّلت الحواقي والأودية الانكسارية الى أودية نهريّة فى شبكات متنوعة . ولما إنتهى العصر المطير وعادت مظاهر المناخ شبه الجاف والمناخ البحرى جفت هذه الأودية وتحوّلت الى شبكات من الأودية الجافة ولكنها غنية بالمياه الجوفية مما يجعلها مناطق للتوسع الزراعى الحديث فى كل الشمال الأفرىقي بوجه خاص . كما هو الحال بإقليم مريوط وشمال سيناء ووسطها بالشمال المصرى وكذلك أودية الشمال الليبي حول خليج سرت ومايجاوره فى سهل بنغازى وسهل درنة وسهل الجفارة وسهل مصراته . وكذلك أودية بلاد المغرب العربى وغرب إفريقيا وحوض البحر الأحمر .

#### ثانياً : التضاريس والاقاليم التضاريسية

تشكل إفريقيا فى جملتها نطاقاً هضيباً تضاريسياً . وقد أحيط بشريط طويل من السهول الساحلية يضيق ويتسع على نحو يشرح فيما بعد : وقد تأثرت القارة بالحركات التكتونية والإلتوائية على طول تاريخها الجيولوجى الطويل منذ ما قبل الزمن الأول حتى العصر الحديث بالزمن الرابع . ونشير خاصة الى الحركات الكاليدونية فى أوائل الزمن الأول والهرسينية فى أواخره وحركة نشأة الأخدود الإفريقى الآسيوى فى الزمن الثانى . فضلاً عن الحركة الألبية الضخمة فى الزمن الثالث حتى أوائل الزمن الرابع . كما تأثرت القارة بفترات متفاوتة من التذبذب المناخى وماتبعه من فترات مطيرة يتخللها فترات جفاف حتى إستقر النظام المناخى فى أواسط الزمن الرابع ، ونتج عن هذه العوامل الجيومورفولوجية أن تصدعت القارة وأصبحت بحركات هبوط وإرتفاع ولاسيما فى أطرافها الشمالية والشرقية والجنوبية مما ترتب عليه ظهور أشرطة من المرتفعات الجبلية والمدرجات الهضبية على نحو نشرحه فى ظل تقسيم القارة الى إقاليمها التضاريسية الرئيسية الآتية :-



- ١ - إقليم المغرب الأطلسي .
- ٢ - إقليم هضبة الصحراء الكبرى .
- ٣ - إقليم الهضبة الحبشية الإستوائية أو هضبة البحيرات العظمى .
- ٤ - إقليم الهضبة الجنوبية .

وهي أقسام تضاريسية متداخلة ومتكاملة . وتشارك في ظاهرات الأحواض الداخلية والتقطع بالآودية النهرية والجافة والمرتفعات الإندفاعية وإنتشار خطوط الإنكسارات وقلة تعاريج السواحل أمامها .

(الطول بالميل)

جدول رقم (١١)

النهر	الموقع	طول المجرى
النيل	أفريقيا	٤١٤٥
الأمازون	أمريكا الجنوبية	٢٩٠٠
الميسسبى	أمريكا الشمالية	٣٧٦٠
أوب	آسيا	٣٢٠٠
يانججتسى	آسيا	٣١٠٠
أمسور	آسيا	٢٩٠٠
الكونغو	أفريقيا	٢٧١٨
هوانججهو	آسيا	٢٧٠٠
لينا	آسيا	٢٦٤٥
ماكبينزى	أمريكا الشمالية	٢٦٣٥
ميكونج	آسيا	٢٦٠٠
النيجر	أفريقيا	٢٦٠٠
ينسى	آسيا	٢٣٦٠
مارى ودارلنج	أستراليا	٢٣١٠
فولجا	أوروبا	٢٢٩٠

### ١- إقليم المغرب الأطلسي :-

ويمتد فى شمال غرب القارة مطلقاً على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي بسهل ساحلى ضيق . ويتسع قليلاً فى طرفه الشرقى حيث خليج تونس وسهل الجفاره التونسي صانعاً مع سهل الجفارة الليبي سهلاً هلالى الشكل يشكل الركن الغربى لخليج سرت بالبحر المتوسط . وأما الطرف الغربى لهذه السهول الأطلسية الضيقة فيتسع قليلاً أمام سواحل المحيط الأطلسي ليتصل بسهول موريتانيا أمام جزر كناريا Canary Islands

ومن عقدة الأطلس تشعب السلاسل الجبلية فى اتجاهات مختلفة فى الشرق تمتد الأطلسي البحرية مطلة على البحر المتوسط فى الجزائر وتونس بسهل ساحلى ضيق لعنق المياه . وتقتد هذه الجبال فى سلاسل متوازية بارتفاع نحو ٢٠٠٠ متراً أو يزيد قليلاً . ويقابلها جنوباً سلاسل أطلس الصحراء . ويحصران بينهما هضبة الشطوط . وهى هضبة شبه مغلقة إذ تحيط بها الجبال من كل جانب الا نحو الشرق والشمال الشرقى . وهى بذلك مغلقة أمام الرياح الغربية الممطرة . مما جعلها فى ظل مناخ شبه جاف وتكثر بها السبخات الملحية البحرية التى تسمى بالشطوط . وتنحدر الهضبة تدريجياً نحو سهول تونس الشرقية . وهى سهول القمع والنخيل والزيتون المشهورة .

ومن عقدة الأطلس غرباً تمتد جبال التل نحو الشمال الغربى لتتقوس نحو الشمال الشرقى فى جنوب اسبانيا بإسم جبال سيرا نفادا Sierra Nevada ويفصل بينهما مضيق جبل طارق إذ تشرف عليه مدينة طنجة . ومن العقدة الأطلسية تمتد جبال الأطلسي العظمى غرباً وجنوباً بغرب نحو المحيط الأطلسي بجبهه من مدرجات جبلية ويتفرع منها نحو الجنوب الغربى الأطلسي الخلفية أو الداخلية . ويحتضنان الهضبة المراكشيه المفتوحة نحو الغرب لتستقبل الرياح الغربية الممطرة . وبجبال الأطلسي الكبرى العظيمة الإرتفاع أعلى قمة جبلية فى

كل المغرب الأطلسى باسم قمة جبل نويكال التى يبلغ إرتفاعها نحو ٤١٦٥ متراً .

وتعمل عوامل التعرية على إزالة الطبقة العليا من صخور جيرية رسوبية لتظهر بعض نتوءات من صخور تارية ومتحولة قديمة . وقد قطعت هذه السلاسل الجبلية بعدد كبير من الممرات الجبلية والتى من أهمها ممر تازا Taza بين أطلس التل والأطلسى العظمى حيث يجرى نهر مولويه ليصب فى البحر المتوسط الغربى .

ومن الأنهار الأخرى القصيره نهر شليف بالجزائر والذى ينبع من هضبة الشطوط خلف الأطلس البحرية ثم ينثنى فى تقوس كبير مخترقاً جبال الأطلس البحرية نحو البحر المتوسط ليصب الى الشرق من وهران . ونهر مجردة الذى ينبع من الأطراف الشرقية للأطلس البحرية متجهاً نحو الشرق ليصب فى خليج تونس . وقد إستثمرت مياه هذه الأنهار مع المياه الجوفية فى التوسع الزراعى .

والى الجنوب من النطاق الأطلسى الجبلى تمتد احواض داخلية تسمى بالعروق فاصلة بين النطاق الجبلى شمالاً وهضبة الصحراء الكبرى جنوباً . ومن أهمها العرق الكبير الشرقى Grand Erg Aridental جنوب تونس والجزائر ، العرق الكبير الغربى Grand Erg Occidental جنوب الجزائر والمغرب . وقد قطعت هذه الأحواض بعدد كبير من شبكات الأودية الجافة مع بعض البحيرات السبخية والتى من أشهرها شط الجريد جنوب تونس وشط ملرير جنوب شرقى الجزائر . كما إنتشرت الواحات الداخلية فى هضبتى الشطوط ومراكش والأحواض الجنوبية ، وهى غنية بزراعة النخيل والزيتون والفاكهة على المياه الجوفية .

#### ٣٧- إقليم هضبة الصحراء الكبرى -

وتشكل امتداداً هضبياً فى وسط وغرب إفريقيا ممتدة الى الجنوب من النطاق الأطلسى المغربى حتى سواحل إفريقيا الغربية . وفى امتدادها الشرقى تصل الى مشارف الاخدود الإفريقى وهضبة الحبشة . وأما جنوباً فتنتهى الى الهضبة الإستوائية أو هضبة البحيرات العظمى .

وقمتاز بعدد من الظواهر الجيومورفولوجية من أبرزها :

أ) ظاهرة الاحواض الداخلية والتي من أهمها الأحواض التى تقع الى الجنوب من النطاق الأطلسى والتي أشرنا إليها سابقاً . وحوض تشاد الداخلى الذى تحيط به مرتفعات تاسيلي Tassili ومرتفعات تيبستى Tibesti فى تقوس ضخمة يمتد جنوباً بشرق الى مرتفعات دارفور Darfur بغرب السودان وامتدادها فى هضبة كردفان بوسط السودان . وهذا التقوس الكبير يشكل نطاقاً من مرتفعات ضخمة تتكون من صخور صلبة إندفعت الى أعلا كرد فعل للحركات الألبية والأخدودية المجاورة كما قاومت عوامل التعرية لصلابة صخورها . ويشرف هذا التقوس الجبلى الكبير شرقاً وجنوباً بشرق على حوض السودان الجنوبى أو حوض بحر الجبل كحوض هابط كرد فعل لإرتفاع الهضبة الحبشية الإستوائية أو هضبة البحيرات العظمى نتيجة لنمو الأخدود الإفريقى الآسيوى المجاور وحوض النيجر الى الشمال الغربى حيث ينحدر نحو سهول غرب إفريقيا . ويحاط هذا الحوض الكبير بمرتفعات هضبية من أهمها مرتفعات فوتا جالون Fouta Djallon فى الجنوب الغربى حيث ينبع نهر النيجر ونهر السنغال Senegal . وهى تشكل خط تقسيم المياه بين هذين النهرين وأنهار أخرى قصيرة تنحدر نحو المحيط الأطلسى . وإلى الشرق من هذه المرتفعات تمتد مرتفعات بتشى Bauchi فى نيجيريا بإرتفاع يزيد على ١٥٠٠ متر ثم مرتفعات أداماوا Adamawa فى الكمرن والتي يصل إرتفاعها الى ٣٩٠٠ متراً كمرتفعات بركانية شديدة التقطع النهرى لغزارة الأمطار .

ب) ظاهرة إنتشار شبكات الأودية الجافة فى كل الصحراء الكبرى منسابة نحو البحر المتوسط فى مصر وليبيا وأيضاً نحو البحر الأحمر . ومنها ماينتهى فى الأحواض الداخلية الى بعض البحيرات التى منها بحيرة تشاد فى الوسط وبحيرات الجريد ومليرير فى الشمال جنوب النطاق الأطلسى بالإضافة الى بحيرات الواحات المنتشرة . كما تمتاز هضبة الصحراء الكبرى بالتقطع النهري مثل نهر النيل ونهر النيجر ونهر السنغال ونهر الكنغر وروافده وأنهار المغرب الإفريقى .

ج ) ظاهرة تباين أنماط التربة لتنوع الإشتقاق الصخرى والتقطع النهري والأودية الجافة مثل :

١- تربة الأودية الجافة أو مايسمى بالمرائح الدلتاوية . وتمتاز تربتها بأنها طفلية ذات قطاع سميك وتخزن قدراً من المياه الجوفية . وهى فى الوقت الحاضر تشكل مناطق التوسع الزراعى كما يحدث فى الشمال الليبى فى سهل الجفارة وسهل مصراته . وفى الشمال المصرى فى سهل مريوط وفى إقليم الحسا بشرق هضبة نجد السعودية مطلا على الخليج العربى .

#### ٢- تربة المنحدرات والمدرجات الجبلية :

فالتنمو السكانى المتزايد عالمياً أدى إلى التوسع الزراعى نحو الأودية الجافة من ناحية وتحويل المنحدرات إلى مدرجات والزراعة الكنتورية الجافة من ناحية أخرى . وتأتى الصين الدولة الرائدة فى هذا الميدان فحولت معظم المنحدرات الهضبية والجبلية إلى مدرجات نقلت التربة إلى بعض منها لتحسين قطاع التربة كما حدث فى جوانب الحوض الأحمر فى غرب الصين . وتعتمد هذه التربة عادة على مياه الأمطار ونقل المياه إليهما فى أنابيب تستخدم طريقة الرش . وكذلك تربة المدرجات بالصحراء الكبرى والمغرب الأطلسى . ولاسيما مدرجات الشمال الليبى .

### ٣- التربة البركانية :

وهي تتكون من تفتتات الصخور البركانية ولاسيما البازلت وتشكل إنتشارا واسعا فى مناطق الثورانات البركانية القديمة فى الزمنين الثانى والثالث . ومن أشهر مناطقها تربة هضبة اليمن وهضبة الحبشة ، وفى إقليم الحجاز حيث أطلق عليها العرب لفظ « الحارات » وهى تربة سوداء خصبة تمتاز بتنوع مكوناتها المعدنية والعضوية فى نسيج معتدل وقطاع عميق . ونشير الى هذه التربة فى الكمرن وغرب إفريقيا .

### ٤- التربة السبخية بالواحات وخاصة واحة سيوة بصحراء مصر الغربية :

ويحد الواحة ناحية الشمال حافة شديدة الإنحدار يصل إرتفاعها حوالى ١٥٠ م. وتحدها من الجنوب رواسب رملية تمثل بداية بحر الرمال الأعظم ، أما من الشرق فإن منخفض الواحة مفتوح نسبياً نحو منخفض القطارة ومفتوح أيضا من الغرب نحو منخفض واحة جغبوب داخل الحدود الليبية . ويبلغ عدد سكان واحة سيوة ١٢,٠٠٠ نسمة (بكثافة تقترب من ١١ نسمة/كم<sup>٢</sup> ويتوزع هؤلاء السكان على الإمتداد الطولى للواحة فى عدة تجمعات أهمها مدينة سيوه فى وسط الواحة ، يليها من ناحية الغرب مناطق خميسة ومشندت وبهى الدين والمراقى ، أما أهم التجمعات السكانية شرق مدينة سيوه فتقع فى مناطق أغورمى وأبوشروف والزيتون . وتطورت المساحة المنزرعة بالواحة كما يقول رئيس المركز من حوالى ٢٠٠٠ فدان خلال الستينيات إلى حوالى ٣٥٠٠ فدان خلال السبعينات من هذا القرن ، ورغم أنه لا يوجد حتى الآن حصر فعلى للمساحات المنزرعة بالواحة إلا أنها تقدر حاليا بحوالى ٩٠٠٠ فدان ، أغلب المساحات المنزرعة تقع حول سيوه وأغورمى (٨٠٪ من المساحة الكلية المنزرعة) . ويعتمد النشاط الزراعى بصفة أساسية على زراعة النخيل (حوالى ٣٠٠ ألف نخلة) والزيتون (حوالى ١٠٠ ألف شجرة زيتون) محمل عليها أعداد ضئيلة من أشجار

الحاصلات البستانية الأخرى كالرمان (٥٠٠ شجرة) والموالح والمشمش والجوافة (فى حدود ألف شجرة لكل منها) . (مركز بحوث الصحراء ١٩٨٨) .

ورغم أن ظروف التربة والمياه والمناخ بالواحة تناسب إنتاج كثير من المحاصيل الحقلية إلا أنها غير منتشرة بالواحة باستثناء البرسيم الحجازى الذى يزرع محملا على الحاصلات البستانية وكمحصول إستصلاح فى الأراضى الجديدة . وجدير بالذكر أن مركز بحوث الصحراء يحاول فى بعض المواقع الرائدة إدخال كثير من محاصيل الحبوب كالقمح ومحاصيل العلف كالبنجر والشعير بأنواعه كزراعات شتوية ناجحة تحت ظروف الواحة . وقد ثبت نجاح هذه المحاصيل . وفى نفس الوقت يقوم بتدريب وإرشاد المزارع السيوى على طرق زراعة وإنتاج مثل هذه الحاصلات . وردا على سؤال عن معوقات الزراعة بواحة سيوة يقول الخبراء : تتعرض واحة آمون الأسطورية إلى ظاهرة فريدة ، فبينما تقع سيوة فى الصحراء الغربية والتى تعتبر من أكثر الصحارى جفافا فى العالم ، نجد أن مياه العيون والآبار المتدفقة بصفة مستمرة تهدد هذه الواحة بالغرق . فواحة سيوة البالغ مساحتها ١١٠٠ كم<sup>٢</sup> وعدد سكانها ١٢,٠٠٠ نسمة يقطن معظمهم فى تجمعات زراعية وسكانية فى مدينة سيوة وغربها فى دهبية وخميسة وميشندت وبهى الدين والمراقى وشرقها فى أغورمى وأبو شروف والزيتون وكذلك فى أم الصغير التى تبعد عن مدينة سيوة بمسافة ١٣٠ كم تتكون من ٣ مستويات من الناحية الطبوغرافية التخزينية فهى تطفو على خزان جوفى للمياه يتكون من :

١ - خزان الحجر الجيري العلوى الذى ينتمى إلى عصر الميوسين الأوسط وهو قريب من سطح الأرض ويتراوح عمقه بين ٢٠ - ٢٥ مترا وقد يصل إلى ٧٠ مترا أحيانا .

٢ - خزان الحجر الجيري السفلى ويتراوح عمقه بين ٧٠ - ١٣٠ مترا .

٣ - خزان الحجر الرملى النوبى وهو الخزان العميق الذى يتراوح سمكه بين ١٥٠٠ الى ٢٥٠٠ متر وعمقه يزيد عن ٦٠٠ متر من سطح الأرض .

يوجد بالواحة أكثر من ٢٠٠ عين متدفقة طبيعيا تتراوح ملحوة مياهها بين ٢٥٠٠ إلى ٨٠٠٠ جزء فى المليون ، كما تم حفر العديد من الآبار التى تستمد مصادر تغذيتها من الخزانات الجوفية السابق الإشارة إليها والتى وصل عددها إلى أكثر من ١٥٠٠ بئر ، تتراوح ملحوة مياهها بين ١٦٠٠ - ٢٥٠٠ جزء فى المليون ويصل تصرف البئر الواحد ما بين ٢٠ - ٥٠ متر مكعب فى الساعة ، كما تم حفر حوالى ٤ آبار عميقة تستمد مياهها من الخزان النوى الذى يبلغ تدفق أحدها ٥٠٠ متر مكعب فى الساعة وتبلغ ملحوته ٢٠٠ جزء فى المليون ، ويبلغ إجمالى تدفق العينين والآبار بالواحة ١٩٠,٠٠٠ متر مكعب يوميا أى حوالى ٧٠ مليون متر مكعب سنويا ومع استمرار تدفق المياه من العينين الضخمة التى قد يصل معدل تصرفها إلى أكثر من ٣٥ ألف متر مكعب فى اليوم وعدم كفاءة المصارف وقلتها وإهمال تطهيرها وعدم جودة شبكة للصرف الصحى بالواحة كذلك التوسع الزراعى غير المدروس فى الفترة الأخيرة وما صاحبه من حفر العديد من الآبار المتدفقة ذاتيا بصفة مستمرة . أدى كل ذلك الى معدل إرتفاع منسوب المياه الأرضية بالواحة .

وتتوقف صلاحية مياه الآبار للشرب والرى على نسبة الأملاح الذائبة وقد وضع هيوم وهيوز المراتب الآتية :

المرتبة	نسبة الأملاح الذائبة
جيد	من صفر - ١٠٠٠ جزء من المليون
متوسط	من ١٠٠٠ - ١٥٠٠ جزء من المليون
زدىء	من ١٥٠٠ - ٢٠٠٠ جزء من المليون
ردىء جدا	من ٢٠٠٠ - ٥٠٠٠ جزء من المليون
ردىء للغاية	أكثر من ٥٠٠٠ جزء من المليون



هذا ويلاحظ عادة أن مياه الآبار تتأثر بمياه الأنهار المجاورة . ففى إقليم مربوط مثلا تقل نسبة الأملاح الذائبة فى اتجاه عام من الغرب إلى الشرق ويرجح أن تفسير هذه الظاهرة هو تأثير مياه النيل التى تتسرب فى طبقات الدلتا نحو الطرف الشرقى من إقليم مربوط . وفى الأودية الغربية بالعراق يلاحظ أن نسبة الأملاح الذائبة فى مياه الآبار تقل فى اتجاه عام من الغرب نحو الشرق وتفسير ذلك يرجع الى تسرب مياه نهر الفرات فى الطبقات الطينية الجيرية نحو الأجزاء الشرقية من الأودية التى تقطع الهضبة الغربية وتتجه نحو الوادى .

ويختلف عمق الآبار فى الواحات من جهة إلى أخرى ففى الواحات المصرية مثلا يصل متوسط العمق فى الواحات الخارجة إلى ٢٠ مترا وفى البحرية ٣٠ مترا وفى الغرافرة ٢٥ مترا وفى سيوة ٢٠ مترا . ويتوقف عمق البئر عادة على عاملين أحدهما مدى إرتفاع المنخفض بالنسبة لسطح البحر والثانى مدى البعد بين سطح البئر والطبقة الخازنة التى تتركز على صخور متبلورة صماء .

ومن واحة إلى أخرى يختلف متوسط كمية الأملاح الذائبة فى مياه الآبار ويصل هذا المتوسط فى الواحة البحرية إلى ٢٠٤ جزء من المليون بينما فى سيوة الى ٢٢٣٠ جزء فى المليون .

#### د- الأحواض الجوفية :

كظاهرة جيمورفولوجيه هامة تميز الإقليم ومنها ٥ أحواض رئيسية فى الصحراء الكبرى فى شمال إفريقيا وهى :

- ١- الأبرج الغربى الكبير : ويقع جنوب سلسلة جبال أطلس فى الجزائر ، ويتغذى من مياه الأمطار على سلسلة الجبال ، ويترواح منسوب المياه الأرضية فيه ما بين ٧٠٠ متر فى الشمال إلى ٣٠٠ متر فى الجنوب .
- ٢- الأبرج الشرقى الكبير : ويقع شرق الأبرج الغربى الكبير ، والجهة الشرقية منه ملاصقة للحدود بين تونس والجزائر ، ومنسوب المياه الأرضية يترواح

فيه من ٤٠٠ متر فى الجنوب إلى ١٠٠ متر بالقرب من البحر ويتغذى من الأمطار المحلية المباشرة .

٣ - حوض تنزروفت ويقع جنوب الأبرج الغربى الكبير فى الجزائر ، ويترواح منسوب المياه فيه ما بين ٢٠٠ - ١٥٠ متر فوق سطح البحر .

٤ - حوض تشاد : وتتجمع فيه الأمطار المحلية فى الطبقات المسامية ، ويترواح منسوب المياه الأرضية فيه ما بين ٤٠٠ متر فى مناطق السقوط و ٢٠٠ متر بالقرب من بحيرة تشاد .

٥ - حوض الصحراء الغربية : وهو أكبر حوض مائى يقع فى شمال إفريقيا ، وهو مشترك بين مصر وليبيا والسودان .

جدول رقم (أ) أحواض المياه الجوفية الرئيسية  
بالصحراء الكبرى فى إفريقيا

الأحواض المائية	مساحة الحوض "ألف كم <sup>٢</sup> "	المخزون من المياه "مليون م <sup>٣</sup> "	التغذية الطبيعية "مليون م <sup>٣</sup> "
الأبرج الغربى الكبير	٣٣٠	١٥٠٠٠٠	٤٠٠
الأبرج الشرقى الصغير	٣٧٥	١٧٠٠٠٠	٦٠٠
فزان	١٧٥	٤٠٠٠٠	٦٠
الصحراء الغربية بمصر	١٨٠٠	٦٠٠٠٠٠	١٥٠٠
تشاد	١١٠٠	٣٥٠٠٠٠	١٢٠٠
النيجر	٥٢٥	١٨٠٠٠٠	٣٠٠
تنزروفت	٢٤٠	٤٠٠٠٠	٢٠
المجموع	٤٥٤٥	١٥٣٠٠٠٠	٤٣٨٠

٣- القليم الهضبة الحبشية والهضبة الإستوائية أو هضبة البحيرات العظمى ،  
وتمتد الى الجنوب الشرقى من هضبة الصحراء الكبرى مطلة على البحر  
الأحمر والمحيط الالهندي بسهل ساحلى يضيق عند باب المندب وخليج عدن ثم  
يتسع تريجياً حول الصومال والقرن الإفريقى . وأهم مايميز هضبة البحيرات  
العظمى عن هضبة الصحراء الكبرى صغر مساحتها نسبياً وانتشار البحيرات  
الحوضية العذبة وشدة تضرسها وتصدعها . إذ أن الهضبة فى موقعها الجغرافى  
بين فرعى الأخدود الإفريقى العظيم تأثرت بشبكة من الخوانق الإنكسارية مع  
إرتفاع سطحها ما بين ١٥٠٠ إلى ١٨٠٠ متر فوق سطح البحر . وقد إنتشرت  
القمم البركانية والتي من أهمها قمة رأس داشان Ras Dashan فى شمال  
الهضبة وإرتفاعها ٤٦٢٠ متراً وجبل تشيوكا حوالى ٤١٥٣ متراً وجبل بيرهان  
Birhan بارتفاع يصل الى أكثر من ٦٠٠٠ متراً . وهذه الجبال تنتشر حول  
بحيرة تانا Tana التى تشغل فوه بركان قديم . ويخرج منها النيل الأزرق فى  
عدة خوانق إنكسارية متجهاً الى الشمال الغربى ليصب فى النيل الرئيسى عند  
الخرطوم . ويوازيه شمالاً نهر عطبرة الذى يجرى فى مجراه الاعلا بهضبة الحبشة  
فى خانق إنكسارى عميق باسم نهر تاكيز Takkaze . ويتجه هو أيضاً نحو  
الشمال الغربى ليصب فى النيل عند بلده عطبره . وقد قطعت هضبة الحبشة  
بعدد كبير من الخوانق الإنكسارية التى تجرى فيها أنهار صغيرة فى كل الجهات  
. ونشير الى بعض منها مثل نهر السوبات Sabat الذى ينبع من جنوب هضبة  
الحبشة فى خانق إنكسارى نحو الشمال الغربى ليصب فى النيل عند مدينة  
الملكاال . وبفضل مجراه العميق اندفعت المياه نحو النيل الأبيض وإندفعت معها  
مياه بحر الجبل بأعالى النيل إلى الشمال حتى الخرطوم فى النيل الرئيسى .

وبفضل الخوانق الإنكسارية العميقة لكل من نهر السوبات والنيل الأزرق  
ونهر عطبره تجمعت مياه أمطار الحبشة الموسمية الصيفية مكونة فيضان النيل

الرئيسى . كما تمتاز هضبة الحبشة أيضاً بكثرة أحواضها الهضبية الصغيرة حيث البحيرات العذبة المتناثرة مثل بحيرات زوا Zaua وشالا Shala وألاتا Allata. وأبايا Abaya بجنوب الهضبة الحبشية .

وأما الهضبة الإستوائية فتشكل إمتداداً صوب الجنوب الغربى لهضبة الحبشة . وتقع كهضبة حوضية إستوائية بين الفرع الغربى أو النيلى والفرع الشرقى أو الحبشى للأخود الإفريقى مما أدى الى تصدعها وإنتشار شبكات من الحوائق الإنكسارية الجانبية .

وقد توجت الهضبة فى عدة أحواض داخلية من أهمها حوض بحيرة فكتوريا Victoria التى ينبع منها النيل بأسم نيل فكتوريا ليصب فى بحيرة ألبرت التى تقع مع بحيرة ادوارد Edward فى الفرع النيلى أو الغربى للأخود الإفريقى . ويصل بين البحيرتين نهر سمليكى Semliki. ويخرج النيل من بحيرة ألبرت Albert مخترقاً السودان الجنوبى بإسم بحر الجبل وروافده ليواصل رحلته شمالاً باسم النيل الأبيض نحو الخرطوم بعد أن يخترق مستنقعات بحر الجبل .

وبقى النيل فيما وراء هذه المستنقعات والسدود سرا غامضا قد أغلقت دونه الأبواب وذلك منذ أقدم العصور حتى أوائل القرن التاسع عشر ، حيث تعاقب المستكشفون بعضهم اثر بعض ، وعلى اثر المستكشفين جاء المبشرون والمستعمرون الى أعالي النيل وهكذا انقشعت السحب وأميط اللثام الذى ظل يحجب وجه النيل دهرًا طويلا ، ولم تلبث الحضارة بحاسنها ومساوئها أن بسطت نفوذها على هذه الأقطار القاسية . وفى الوقت الحاضر بدأ الاهتمام بأمر تطهير النهر من السدود النباتية فلا تترك لتتراكم وتكون تلك العقبة الكؤود التى تعرقل الملاحة وتعطل المواصلات .

وأما من حيث نظام التصرف المائي لأنهار هذا الحوض الكبير الجنوبي الذى تشملته هضبة البحيرات تظهر الحقائق الجغرافية الهامة الآتية :

#### أولاً :

ان متوسط ما ينصب من بحيرة فكتوريا الى النيل هو ٥٦ مليوناً من الأمطار المكعبة فى اليوم أو حوالى ٦١٢ متراً مكعباً فى الثانية ، ويبدو أن هذا التصرف ضعيف اذا علمنا أن المساحة السطحية لماء البحيرة يزيد على ٦٦,٠٠٠ كيلو متر مربع . وان منسوبها لا يتغير الا قليلاً . يرجع السبب فى ذلك الى عظم ما تفقده البحيرة بالتبخر الى ما ينصرف منها الى نهر النيل ونسبة ٩ : ٢ . وقد قدر هرسث أن الكميات المختلفة من المياه المكتسبة والمفقودة على أساس عمق المياه فى البحيرة هى على النحو الآتى تقريباً :<sup>(١)</sup>

١٢٠ سنتيمتراً

من الأمطار

المكتسب

٣٠ سنتيمتراً

من الأنهار التى

تصب فيها

١٢٠ سنتيمتراً

من التبخر

الفاقد

٣٠ سنتيمتراً

من تصرف نيل

فكتوريا

#### ثانياً :

فمقادير الأمطار والتبخر متعادلة تقريباً وتبلغ نحو أربعة أمثال كمية المياه التى تدخل الى البحيرة أو تخرج بواسطة الأنهار . ويوضح البحث أيضاً أن معدل المتوسط اليومي لتصرف بحر الجبل شمال

(١) هرسث : موجز عن حوض النيل - القاهرة ١٩٤٦ ص ٥٥ ترجمة وزارة الأشغال المصرية

بحيرة البرت هو ٦٥ مليوناً من الأمتار المكعبة . ويبدو هنا أن الفرق كبير بين تصرف نيل فكتوريا وبحر الجبل ، وذلك مع ملاحظة أن بحيرة البرت اصغر مساحة من بحيرة فكتوريا إذ تبلغ مساحتها نحو ٥٣ كيلو متر مربع ومرجع هذا الفرق بين تصرف النهرين أن نسبة التبخر من مياه بحيرة فكتوريا أعلى بكثير منها في بحيرة البرت إذ تمتاز هذه البحيرة بارتفاع سواحلها الاخمدوية فتقل نسبة التبخر .

#### ٤- إقليم الهضبة الجنوبية ،

ويمتد الى الجنوب من خط الاستواء في نظام هضبي يختلف كثيراً عن الأقاليم الهضبية الأخرى المشار إليها . إذ يتميز بالظواهر التضاريسية الآتية :

أ) الارتفاع الهضبي : إذ يتراوح ارتفاع الهضبة ما بين ٩٠ إلى ١٨٠ متر في ارتفاع تدريجي نحو الجنوب مع تموج في السطح .

ب) تنحدر الهضبة إنحداراً شديداً نحو سهل ساحلى ضيق يبلغ إتساعه نحو ثلاثين كم أو يزيد قليلاً . إلا سهل موزمبيق Mozambique أمام جزيرة مدغشقر Madagascar إذ يصل في إتساعه الى نحو ٥٠ كم . وذلك لتصدع الإقليم بسبب انفصال جزيرة مدغشقر عن الهضبة الأم منذ أواخر الزمن الأول مما أدى الى ضعف التركيب الصخري وتعرضه لعوامل التعرية التي حولت الإقليم الى سهل تحتاني متسع . وهكذا تمتاز الهضبة الإفريقية الجنوبية بحافات شديدة الإنحدار في معظم أجزائها .

ج) يبدو الساحل قليل التعاريج مع قلة في الخلجان المتعمقه في الداخل الهضبي . وتقل الجزر الساحلية التي من أهمها جزر زنجبار قرب دار السلام أمام تنزانيا . وجزيرة مدغشقر التي يفصلها مضيق مورمبيق عن البحر الجنوبي

الشرقى من القارة . وهى هضبية فى مظهرها العام يحيط بها سهل ساحلى يتسع قليلاً فى قسمه الغربى .

د ) ظاهرة النظام الحوضى إذ تنقسم الهضبة الى عدة أحواض نهريّة من أهمها حوض نهر الكنغو وروافده Congo B asin وحوض نهر الزمبيرى وروافده Zambesi وحوض نهر الأورنج وروافده Orange . وسنناقش هذه الأنهار عند دراسة التصريف النهري .

هـ ) ظاهرة البحيرات الداخلية : فى بطون الأحواض المنخفضة ومن أشهرها بحيرة أمبولاند Amboland فى نامبيا Namybia وتنتهى إليها بعض الأودية الجافة . وبحيرة أو كافانجو السبخية Okavango شمالاً بتشوانا Be-chuanaland وتنتهى إليها أيضاً مجموعة من الأودية الجافة والاختار النهرية الموسمية . وبحيرة بانجويلو Bangweulu وبحيرة مويرو Mweru وتنتهى اليهما أنهار داخلية ويقعان الى الجنوب الشرقى من منخفض الكنغو بالوسط الشمالى للهضبة الجنوبية . وتنتشر هنا تربة سبخية فى دور الإستصلاح للتوسع الزراعى بإستخدام مياه الأنهار المحلية والاختار النهرية الموسمية والمياه الجوفية .

و ) ظاهرة الأخدود الإفرقى : فى شرق الهضبة الجنوبية ممتداً الى الشمال من مصب نهر زمبيزى فى خائق إنكسارى ضخم مركب حيث هبط القاع وإرتفعت الجوانب فى جبال أخدودية متضرسة معقدة . ويستمر هذا المد الأخدودى شمالاً حتى هضبة البحيرات الاستوائية . ويحتضن بحيرة نياسا Nyasa أو ملوى الطولية وبحيرة تنجا نيقا Tanga nyka الطولية أيضاً . وهو يتشعب الى شعبتيه وهما الشعبة الغربية أو النيلية والشعبة الحبشية أو الشرقية ممتداً الى البحر الأحمر على نحو شرح من قبل . ويقع بين الفرعين الأخدوديين إقليم الهضبة الاستوائية ببحيراتها .

ومن أهم نتائج هذا المد الأخدودى إن إنتشرت جبال بركانية شاهقة من أهمها قمة كليمانجارو وبارتفاع يصل إلى ٥٨٩٥ متراً فوق سطح البحر وتغطيها ثلوج دائمة وكذلك جبل كينيا الذى يرتفع الى ٥١٩٤ متراً وجبل مبرو وارتفاعه ٤٦٣٠ متراً وجبل إلجن Elgon وارتفاعه ٤٣١١ متراً وتنتشر على هذه القمم الشاهقة الارتفاع الثلوج رغم وقوعها فى إقليم إستوائى ومدارى . وهى جبال شديدة الانحدار تكثر بها الفوالق والانكسارات .

وجبال وهضاب الجنوب الإفريقى كلها تصدعت بنمو الأخدود الإفريقى العظيم بدرجات متفاوتة . فهضبة الفلد الأعلى بالجنوب تمتد فى إقليمى أورانج والترانسفال Transvaal يصل إرتفاعها الى نحو ١٨٠٠ متر . وتنتهى شرقاً بكتلة باسوتو Basuto الصخرية الشاهقة التى تمتاز بحافة جبلية مرتفعة هى دراكنز برج Drakensberg ( ٣٠٠٠ متر) مطلة على منحدرات ناتال Natal بسهلها الضيق . وقد إندفعت هذه الحافات الجبلية الى اعلا كرد فعل للحركة الأخدودية المجاورة . كما أن الجزء الجنوبى من الهضبة فى جمهورية جنوب إفريقيا يمتد جنوباً فى شكل مدرجات متوالية تبدأ شمالاً بمرتفعات كمزبرج Koms Berg ومرتفعات نيوفلد Nieuw Veld ثم الكارو الكبرى great Karroo يليها الكارو الصغرى Little Karroo ويتراوح إرتفاعها ما بين ٦٠٠ الى ٣٠٠ متر . وكل هذه المدرجات هى الأخرى تصدعت بالكيان الأخدودى والحركة الإلتوائية .

أما عن التصرف النهري فنهر الكنفو وروافده يشغل حوضاً ضخماً شمال غرب هضبة إفريقيا الجنوبية . وينبع النهر من حافات الفرع الغربى للأخدود الإفريقى . وهو صالح للملاحة داخل الحوض لمسافة ١٦٠٠ كم قبل أن يتصل ببحيرة ستانلى بول Stanley Pool شمال كنشاسا عاصمة زائير . وأما المسافة بين العاصمة والمصب على المحيط الأطلسى فهى مجرى ضيق شققها النهر



فى صخور الحافة الغربية الجبلية بخمسة شلالات يجرى بينها النهر سريعاً فلا يصلح للملاحة . ورافده الرئيسى نهر أوبانجى Ubangi ينبع من خط تقسيم المياه بين الكنفو وحوض بحر الجبل بالنيل الجنوبى حيث تنبع بعض روافد نهر بحر الجبل الذى يشكل أعالي النيل . ثم ينساب شمالاً الى النيل الأبيض . وتبلغ كمية المياه التى يصرفها النهر الى المحيط الأطلسى بحوالى ١٣٥٠ كيلو متر مكعب سنوياً . كما يبلغ وزن الرواسب ٦٨ مليون طن سنوياً . وتمتاز المياه أمام المصب بعذوبتها لمسافة ٣٠ كم من الساحل . واللون العكر لمياه المحيط يستمر لمسافة ٥٠٠ كم من الساحل .

ونهر أورنج ينبع من حافة جبال دراكنزبرج فى أقصى الجنوب الشرقى ثم يتحدر نحو الغرب حتى يتصل به رافده نهر فال Vaal . وبعدها يخترق الهضبة فى عدة شلالات قبل أن يصب فى المحيط الأطلسى مخترباً صحراء كلهرى . وتصريفه النهري يصل الى ٩١ كم<sup>٣</sup> فى السنة والأمطار التى تسقط فى حوضه الاوسط يتجمع بعضها فى بحيرات ملحية منها بحيرات جروت فليبر Vloer وجيل فليبر Geel Vloer . وهو نهر غير صالح للملاحة لضحولة المياه ولاسيما فى الشتاء لقلة الأمطار وضياها فى رمال الصحراء . كما لا يصلح للملاحة فى قسمه الاعلا لشده الانحدار مع وجود الشلالات .

ونهر زمبيزى Zambezi ينبع من مرتفعات أنجولا جنوب حوض الكنفو ومعه عدد كبير من الروافد التى تتجمع فى النهر الرئيسى فتندفع المياه فى شلالات فكتوريا . ثم يصلح بعد ذلك للملاحة متجهاً شرقاً فى تقوس نهري كبير يتجه بعده النهر نحو الجنوب الشرقى ليصب فى المحيط الهندى الى الجنوب من بحيرة ملوى حيث ينبع نهر شيرى Shire متجهاً جنوباً ليصب فى نهر زمبيزى عند الطرف الغربى للدلتا الكبيره التى تبلغ مساحتها ٨٠٠٠ كم<sup>٢</sup> . ويتفرع فيها النهر الى عشرة فروع أهمها فرع شندى Chinde الذى ينتهى عند

ميناء شندى وهو صالح للملاحة . ونظراً لهبوط الدلتا هبوطاً ضعيفاً إنتشرت بها السبخات والبحيرات الضحلة مشابهة فى ذلك أهوار جنوب العراق . فهى منطقة لاتصلح للنمو السكانى . وتخضع للتجفيف التدريجى كمناطق للتوسع الزراعى . ويلقى النهر برواسبه سنوياً بنحو مائة مليون طن فى هذه المساحات السيخة . ومصدر المياه الرئيسى لهذا النهر هو الأمطار . الا أنها تقل كثيراً فى فصل الجفاف فتجف بعض الروافد الغربية وتتجمع المياه فى بحيرة لجامى -Nga mi كبحيرة نهريه للروافد الغربية . وتقع جنوب النهر الرئيسى قرب شلالات فكتوريا . ويبلغ تصريف النهر السنوى نحو ٥٠٠ كم<sup>٣</sup> .

ونهر النيجر Niger : وينبع من المنحدرات الداخلية لهضبة فوتا جالون Fouta Djallon بالغرب الإفرقى ومعه مجموعة من روافده العليا الى الجنوب من بامكو Bamako ثم ينساب النهر بعد تجمع روافده فى نهر رتسى نحو الشمال الشرقى الى مدينة تمبكتو . وهذه التفرعات تصنع بحيرة كبيرة أثناء الفيضان الصيفى ثم تنكمش فى فصل الجفاف . وبعد مدينة تمبكتو يتقوس النهر فى ثنيبه نهريه ضخمة نحو الجنوب الشرقى ليصب فى المحيط الأطلسى بدلتا كبيرة ، وفى قسمه الأدنى يتصل به رافده الرئيسى نهر بنوى Benue الذى ينبع من مرتفعات الكمرن Kameroons ويبلغ تصريف النيجر ٢٩٣ كم<sup>٣</sup> سنوياً . وتقدر الرواسب التى يحملها بنحو ٦٧ مليون طن سنوياً .

ونهر النيل هو أطول أنهار العالم بطول يصل الى ٦٦٧٠ كم . ويختلف عن كثير من أنهار العالم فى أنه ينبع فى الجنوب من بحيرة فكتوريا بالهضبة الاستوائية غزيرة الأمطار طول العام فيتسع حوضه لكثرة روافده ثم يضيق هذا الحوض شمالاً إذ يعبر النهر نطاق الصحراء الكبرى الفقيرة جداً فى أمطارها فلا يرفده روافد عند عبوره للسودان الشمالى حتى البحر المتوسط .

ويخترق النهر ٣٥ من درجات العرض فتبدأ منابعه من خط عرض ٤° جنوباً

حيث ينبع رافده نهر روفوفو من الحافة الشرقية للفرع الغربى النيلى للأخدود الإفريقى العظيم ثم يصب فى نهر كاجيرا Kagera الذى يعتبر المنبع الاستوائى الرئيسى للنيل . وهو بدوره يصب فى الساحل الغربى لبحيرة فكتوريا بالهضبة الاستوائية . وهى التى تغذى النيل بالمياه على مدار العام لأمطارها الدائمة الغزيرة ( لتتبع نظام التصريف المائى لنهر النيل تفصيلاً راجع الفصل الخاص بمصادر المياه بالشمال الإفريقى ضمن فصول هذا الكتاب).

ويخرج من البحيرة نيل فكتوريا الذى يُمون نهر النيل بمياه دائمة ويقدر متساوياً تقريباً طول العام . وتعرضه شلالات ريبون وأوين . ويصب فى بحيرة ألبرت عند شلالات مرشيزون . ويخرج النهر من البحيرة بأسم نيل ألبرت حتى حدود السودان مع أوغنده ثم يدخل السودان الجنوبى بأسم نهر بحر الجبل ماراً بمنطقة شاسعة من المستنقعات والسدود النباتية التى تعيق الملاحة حتى بحيرة نو No ليتصل برافده بحر الغزال الذى ينبع غرباً من خط تقسيم المياه بينه وبين نهر أوبانجى Ubangi الرافد الرئيسى لنهر الكونغو . وبحر الجبل وروافده يكون الحوض الجنوبى للنيل باسم حوض بحر الجبل الذى يحاط شرقاً بهضبة الحبشة وجنوباً بالهضبة الاستوائية وغرباً بهضبة أوبانجى - شارى Ubangi - Shari وهى خط تقسيم المياه المشار اليه وتشكل إمتداداً جنوبياً لهضبة دارفور بغرب السودان .

وبعد منطقة المستنقعات يستمر النهر شمالاً باسم النيل الأبيض ويتصل به جنوباً رافده نهر السوبات الذى ينبع من جنوب هضبة الحبشة . وينتهى النيل الأبيض عند الخرطوم ليتصل برافده الرئيسى النيل الأزرق الذى ينبع من بحيرة تانا Tana بوسط هضبة الحبشة . ثم يجرى فى خواتم انكسارية فى تقوس ضخم من البحيرة نحو الجنوب فالشمال الغربى حتى يتصل بالنيل الرئيسى عند الخرطوم . والنيل الأزرق هو المغذى الرئيسى لنهر النيل بمياه أمطار الحبشة الصيفية الموسمية .



### ثالثاً - المناخ والاقليم المناخية والنباتية

#### (١) العوامل الجغرافية التي تؤثر فى تنوع المناخ :-

##### أ - الموقع الجغرافى :

فأفريقيا تمتد ما بين خطى عرض ٣٧ شمالاً و ٣٥ جنوباً وينصفها تقريباً خط الإستواء . ويقطعها المداران . وبذلك يسود بها المناخ المدارى مع إرتفاع فى درجة الحرارة إلا حيث المرتفعات الجبلية والقمم العالية . وهى لموقعها الى الجنوب الغربى من الكتلة الاوراسية الشمالية الضخمة فقد تأثرت بالضغط الجوى الاوراسى على مدار السنة إذ تهب رياح شمالية وشمالية شرقية جافة أدت الى إنتشار الصحراء الإفريقية الكبرى التى تشغل نحو نصف مساحة القارة . كما أن إمتداد المحيطين الهندى والأطلسى على جانبي القارة مع ذراعهما البحر المتوسط شمال القارة والبحر الأحمر الى الشرق منها كان له أبعد الأثر فى تنوع الأقاليم المناخية بالقارة .

##### ب - المظهر المصفى :

السائد بالقارة مع مد جبلى ألبى صغير فى طرفها الشمالى الغربى جعلها مسرحاً كبيراً لتحرك الرياح المحيطية المطرة بحيث تصل الرياح الموسمية الصيفية المطرة من المحيط الأطلسى حتى هضبة الحبشة وحوض البحر الأحمر . كما تشوغل رياح من المحيط الهندى فى وسط وجنوب القارة مسقطه لأمطار موسمية . كما أن ضيق السهل الساحلى وقلة تعاريجه عامة حول الهضبة الإفريقية العظيمة المساحة أضعف من توغل التأثير البحرى نحو داخل القارة وجعل المناخ القارى شبه الجاف هو السائد . إلا أن شدة إنحدار الحافات الهضبية فى معظم الجهات مكن من تصادم الرياح البحرية الرطبة بها فتسقط أمطاراً تصادمية كما أن النطاق الألبى الأطلسى الشمالى الغربى للقارة لم يقف عقبة فى سبيل توغل بعض الرياح الإعصارية نحو هضبتى الشطوط ومراكش بوجود

ممرات هوائية متسعة تسمح بتوغل بعض الأعاصير . والموقع الجغرافي للنطاق الأطلسي ممتد في اتجاه عام ما بين الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي . يهد للرياح الإعصارية التصادم بالكتلة الجبلية واسقاط أمطار غزيرة تزيد على ١٠٠ مم في بعض المناطق .

### جـ - التيارات البحرية :

فقارة إفريقيا تتأثر مناخياً بثلاث مناطق من الضغط المرتفع الدائم تتمثل في منطقة الضغط المرتفع الدائم على المحيط الهندي ومنطقة الضغط المرتفع الدائم على المحيط الأطلسي الشمالي أو الضغط الأزوري ومنطقة الضغط الدائم المرتفع على المحيط الأطلسي الجنوبي . ومنها تخرج رياح ممطرة نحو القارة وفقاً لحالة الضغط المتغير عليها على مدار السنة .



وأهم التيارات المحيطية التي تؤثر مناخياً على إفريقيا تتمثل في :

١ - التيار الاستوائي الجنوبي الدافئ مؤثراً على السواحل الشرقية للقارة إذ تدفعه الرياح التجارية حتى يضل ساحل القارة عند خط عرض ١٠ جنوباً ثم

يواصل مسيرته جنوباً باسم تيار موزيبيق فيرفع من درجة حرارة المياه الساحلية ويزداد التبخر فالأمطار على اليابس المجاور .

٢ - تيار غينيا الدافئ . وهو تيار استوائى يؤثر على سواحل خليج غينيا فيرفع من درجات الحرارة والتبخر فتزداد حملته الرياح الجنوبية الغربية فى الرطوبة مسقطه أمطاراً غزيرة على الساحل طول العام وأمطاراً صيفية فى الداخل على نحو يشرح فيما بعد .

٣ - تيار بنجويلا البارد الذى تدفعه الرياح الجنوبية نحو الشمال حتى مصب نهر الكونغو . مسبباً إنخفاضاً نسبياً فى درجة الحرارة وكثرة الضباب على الساحل الغربى جنوب خط الاستواء مايساهم فى إمتداد صحراء كلهارى .

٤ - تيار كنارى البارد مندفعاً بالرياح الشمالية الغربية نحو الجنوب ماراً بسواحل إفريقيا الشمالية الغربية والغربية ولاسيما أمام سواحل المغرب وموريتانيا . فيسبب كثرة الضباب وإعتدال الحرارة صيفاً مع قلة فى البتخر من مياه المحيط فتتعدم الأمطار صيفاً .

#### د- الغطاء النباتى :

فإن انتشار الغابات الاستوائية والمدارية بغاباتها الكثيفة ذات الأوراق العريضة ومع إنتشار المساحات المستنقعية والسبخية تزداد كمية تبخر المياه مما يزيد من غزارة الأمطار . والظاهرة تتكرر أيضاً فى أراضي السفانا الغنية ولاسيما فى حوض الجبل بمستنقعاته الواسعة الإنتشار وحول الغابات الاستوائية والمدارية كنطاق إنتقالى من سفانا كثيفة واشجار متناثرة كثيرة الأوراق مما يساهم فى زيادة التبخر وسقوط الأمطار الصيفية .

## (٢) عناصر المناخ وأهميتها في تنوع الاقاليم المناخية :

### أ- الضغط والرياح في شهر يناير

إذ تتأثر القارة بالضغط الأوراسي المرتفع شمالاً والذي يمتد حتى الصحراء الكبرى والضغط المنخفض على وسط وجنوب القارة بالإضافة الى الضغط المرتفع الدائم على المحيط الهندي والأطلسي الشمالي والمحيط الأطلسي الجنوبي.

فتهب رياح تجارية شمالية شرقية جافة على الصحراء الكبرى وماحولها . كما تهب رياح تجارية جنوبية شرقية ممطرة من المحيط الهندي على وسط وجنوب القارة . ومن المحيط الأطلسي تهب رياح شمالية غربية وغربية وجنوبية غربية اعصارية ممطرة على شمال وشمال غرب القارة وغربها وجنوبها . مع ملاحظة أن الرياح الشمالية تهب موازية للساحل الغربي مما أوصل النطاق الصحراوي حتى الساحل . وكذلك الرياح الجنوبية تهب موازية للساحل الغربي أمام صحراء كلهاري .

### ب- الضغط والرياح في يوليو

إذ تتأثر القارة بضغط مرتفع نسبياً على البحر المتوسط وضغط منخفض جداً على الصحراء الكبرى والوسط الإفريقي وضغط مرتفع نسبياً على داخل الجنوب الإفريقي الهضبي . بالإضافة الى ضغط دائم على المحيط الهندي والمحيط الأطلسي الشمالي والجنوبي .

فتهب رياح جافة شمالية شرقية وشمالية على الشمال الإفريقي والصحراء الكبرى متجهة نحو الضغط المنخفض الاستوائي ، وتهب رياح جنوبية شرقية من المحيط الهندي وهي رياح رطبة ممطرة على وسط وشرق القارة .

وتهب رياح ممطرة غربية وجنوبية غربية من المحيط الأطلسي على وسط القارة وتمتد حتى هضبة الحبشة وجنوب السودان .



### جـ - النظام الحرارى والأمطار

فتمتاز إفريقيا بارتفاع حرارى طول العام فأقل الشهور حراره يصل الى ٦٠ مئوية إلا على المرتفعات الجبلية . والتباين الحرارى يتمثل فى معدلات المدى اليومى والسنوى إذ لا يتجاوز الدرجتين فى المناخ المدارى بينما يرتفع فى المناخ الصحراوى الى ٦٧ مئوية . وخطوط الحرارة المتساوية تسير موازية لخطوط العرض تقريباً فى الصحراء الشمالية بينما تسير موازية للساحل الجنوبى الغربى ابتداء من خط الاستواء تقريباً . ومرجع هذه الظاهرة الى تيار بنجويلا البارد الذى يمر بالساحل الإفريقى الجنوبى الغربى من الجنوب نحو الشمال حتى قرب خط الاستواء .

والامطار تقل تدريجيا شمالا وجنوبا من النطاق الإستوائى الغزير المطر طول العام وذلك لأن القارة يسودها المظهر الهضبى القليل التموج فى السطح . وتكاد تنعدم الأمطار فى الصحراء الكبرى شمالاً وفى صحراء كلهاى أو ناميب جنوباً . ولكن الأمطار تزيد بشكل ملحوظ فى النطاق الأطلسى الشمالى الغربى حيث السلاسل الجبلية تواجه الرياح الإعصارية الممطرة الشمالية الغربية والغربية . كما تزيد الأمطار فى الطرف الجنوبى الشرقى وشرق جزيرة مدغشقر لإرتفاع السطح المواجه للرياح الرطبة الجنوبية الشرقية من المحيط الهندى وتقل به الأمطار كثيراً فى القرن الإفريقى والصرمال إذ تهب الرياح الرطبة الجنوبية متوازية للساحل . كما تمتد أراضي الصحراء الكبرى حتى سواحل المحيط الأطلسى غرباً لهبوب الرياح الشمالية موازية للساحل مع تيار كنارى البارد . وكذلك الوضع أمام سواحل صحراء كلهاى جنوباً حيث تهب الرياح الجنوبية موازية للساحل مع تيار بنجويلا البارد .

ويمكن أن يميز بين ثلاث مناطق للأمطار فى القارة بالنسبة لكمية الأمطار ومواسم سقوطها

#### ١- منطقة الامطار الدائمة طول العام :

ممثلة فى النطاق الساحلى لخليج غانه وحوض نهر الكنگو بالإضافة الى جنوب شرق القارة فى إقليم ناتال وشرق جزيرة مدغشقر . بأمطار سنوية هابين ١٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ سم . فهى فى فريتون Freetown عاصمة سيراليون Sierra Leone ٤٠٠ سم وفى كوكيلهاث فيل Coquilhatville على نهر أو بنجى رافد نهر الكنگو ١٧٧ سم وفى دربان Durban على الساحل الجنوبى الشرقى باقليم ناتال Natal ١٠٠ سم . وهى بسبب الرياح الممطرة من المحيط المجاور طول العام .

#### ٢- منطقة الامطار الفصلية :

وتقع على جانبى حوض الكنگو وشمالاً حتى السودان الجنوبى فى نطاق عريض يمتد شرقاً الى هضبة الحبشة وغرباً متضمناً حوض النيجر وحوض نهر السنغال حتى ساحل المحيط الأطلسى وخلف هضبة فوتا جالون . ثم يتقوس هذا النطاق نحو جنوب الكنگو محتضناً كينيا وتنزانيا وزامبيا وموزمبيق وزيمبابوى وانجولا وماحولها من أراضى فى الجنوب الإفرقى .

وهذا النطاق الضخم يتعرض للرياح الممطرة الموسمية صيفاً الجنوبىة الشرقية من المحيط الهندى والجنوبىة الغربية والغربية من المحيط الأطلسى نحو نطاق الضغط المنخفض بوسط القارة . أما فى الشتاء فتسود رياح جافة من الضغط المرتفع القارى . هذا والنطاق المغربى الأطلسى فى شمال غرب القارة مع الطرف الجنوبى الغربى للقارة تسودهما أمطار شتوية إعصارية . وفى الصيف تصل إليها الرياح جافة أو شبه جافة .

وتتراوح كمية الأمطار فى هذه المنطقة الفصلية المطربين ٥٠ سم الى ١٠٠ سم . فهى فى كيبوتون Capetown ٥٠ سم فى جنوب غرب القارة وفى الجزائر ٧٦ سم وفى لامو Lamu بالسهل الساحلى الكينى على المحيط الهندى ٩٣ سم .

### ٣ - منطقة جافة معظم أيام السنة ،

وتشتمل على الصحراء الكبرى وصحراء كلهارى بالجنوب الإفريقى . بمعدل سنوى للمطر أقل من ٢٥ سم يتبخّر معظمها عند وصولها الى سطح الأرض . وتثقل هذه الصحارى مناطق للضغط المرتفع القارى شتاءً فتخرج الرياح جافة الى الأطراف . وفى الصيف تستقبل هذه الصحارى رياحاً من المحيطات المجاورة وقد وصلت جافة أو شبه جافة مما أدى الى خلق هذه المساحات الصحراوية . مع ملاحظة أن الرياح الغربية تهب من المحيط الأطلسى المجاور فتتمر على سواحل هذه الصحارى موازية لها فلا يسقط أمطاراً إلا بقدر ضئيل . ولا سيما أن هذه الرياح تسير دافعه لتتأثر بتيار كنارى البارد شمالاً وتيار بنجويلا البارد جنوباً مما يؤدى الى إنتشار الضباب على السواحل الصحراوية

### ٣ - الانقاليم المناخية والنباتية :

#### أ) المناخ الاستوائى وغاباته

فيتمثل فى معظم حوض الكنفو شمال خط عرض ٥° جنوباً وساحل خليج غينيه والساحل المجاور حتى خط عرض ١° شمالاً والساحل الشرقى لجزيرة مدغشقر . ويمتاز هذا المناخ بحرارة مرتفعة وأمطار غزيره طول العام بمعدل حرارى سنوى ما بين ٢١ الى ٢٤ م° ولا يتجاوز معدل أكثر الشهور حرارة عن ٢٧ م° فالمدى السنوى ضئيل لا يتعدى درجتين م° والرطوبة النسبية مرتفعة على مدار العام فيكون الشعور بالجو الحار عظيماً ومؤثراً على النشاط البشرى . والمعدل السنوى للأمطار يفوق ٣ سم والنهاية العظمى للمطر فى شهرى يوليو وأغسطس مع انخفاض شديد للضغط على الصحراء الكبرى فتندفع الرياح الغربية والجنوبية الغربية من المحيط الأطلسى نحو الداخل فتسقط أمطاراً غزيره على النطاق الاستوائى . واما السهل الساحلى الشرقى لمدغشقر فيستقبل الرياح المحيطة بالمطره على مدار العام من الضغط المرتفع الدائم على المحيط الهندى

وعدد الأيام الممطرة نحو ٢٠٠ يوماً . كما تحدث بعض الأمطار التضاريسية ههنا الحافات الهضبية مثل الكمرون وقوتا جالون . وتهب بعض العواصف الرعدية الشديدة عند إلتقاء الرياح الشمالية الشرقية الجافة بالكتل الهوائية الرطبة المحيطية مصحوبة بأمطار غزيرة تقتلع الأشجار وتضر بالزراعة . وذلك عادة في بداية ونهاية فصل الأمطار الغزيرة الصيفية . وأمطار الكنفو دائمة مع قمتين للمطر تتفصلان عادة مع فصلى تعامد الشمس على خط الاستواء .

وأما عن النبات الطبيعي فقد فُخض عن المناخ المطير الحار طول العام المشار إليه أن نمت غابات استوائية كثيفة تتشابه أغصانها فتمنع أشعة الشمس من الوصول إلى أرض الغابة المستنقعية السبخية المظلة .

وقد إنتشرت بها الحشرات والزواحف والقردة في جو رطب خائق . والشجر يبلغ متوسط طوله نحو ٣٠ متراً . وعلى السواحل تنمو غابات المانجروف Mangrove فتظهر بعض جذورها فوق سطح الماء . وتنمو ورائها أشجار نخيل الزيت . وقد قطعت مساحات واسعة من هذه الغابات لتحل محلها زراعة الأشجار الخشبية الإقتصادية والتبغ والبن والقطن والفاكهة وبعض محاصيل الحبوب في الأراضي الداخلية الأقل مطراً ولاسيما أشجار زيت النخيل كمحصول تجارى .

#### ب) المناخ المدارى والسفانا الإفريقية :

ويسود هذا المناخ في ٤٠٪ من مساحة القارة . وهى مساوية لمساحة الصحارى وأشباه الصحارى بها . ويمتد محيطاً بالمناخ الاستوائى فى حوض الكنفو ليغطى هضبة البحيرات الاستوائية التى يحول إرتفاعها دون تقدم المناخ الاستوائى بها . ثم يتقوس هذا النطاق الى الجنوب من حوض الكنفو فى الجنوب الإفريقى حتى مشارف صحراء كلهارى . ويمتد لسان من هذا المناخ المدارى نحو

الساحل الإفريقى الغربى ماراً بساحل جمهوريات غانا وتوجو وينين . إذ تقل الأمطار فى هذه المنطقة الساحلية فهى فى أكرا Accra ٦٥ سم سنوياً بينما تصل فى منطقة أسينى Assinie بساحل العاج الى نحو ٢٠٠ سم . وتقل الأمطار فى هذه المنطقة الساحلية الممتدة ما بين رأس ثرى بينتس Cape Three Points حتى حدود نيجريا الغربية قرب لاجوس Lagos بسبب مرور تيار غينيا الحار بعيداً عن الساحل وهبوب الرياح الجنوبية الغربية موازية للساحل فتقل أمطارها فى طريقها نحو الضغط المنخفض على السودان الجنوبى . ويمتد هذا النطاق المدارى شمالاً حتى حدود الصحراء الكبرى . وتسقط الأمطار صيفاً بفعل الرياح المحيطية الرطبة من المحيطين الهندى والأطلسى نحو الضغط المنخفض القارى . والإقليم شتاءً يتأثر بالرياح الداخلية الجافة من الضغط المرتفع القارى . وتزداد كمية الأمطار فى الأراضى المتاخمة للمناخ الاستوائى الى حوالى ٢٠٠ سم وتقل كلما بعدنا نحو الأطراف الى أقل من ٤٠ سم .

والحرارة مرتفعة طول العام بحيث لا يهبط معدلها الشهرى عن ١٦م وأما المدى السنوى فلا يتعد ١٠م . وتنخفض معدلات الحرارة على الأراضى المرتفعة فتفرق بين سفانا المنخفضات وسفانا المرتفعات . وتزداد كمية الأمطار على الأراضى المواجهة للرياح المحيطية بينما تقل فى الداخل فى ظل المطر . فالأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من هضبة الحبشة تستلم قدراً من الأمطار يصل الى نحو ١٨٠ سم لمواجهتها للرياح المحيطية الجنوبية الغربية بينما تقل الأمطار الى ٥٠ سم فى الأراضى الداخلية فى ظل المطر . وكذلك هضبة أنجولا وهضبة البحيرات الاستوائية يستلزمان قدراً أكبر من الأمطار فى المناطق المواجهة للرياح المحيطية الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية .

والنبات الطبيعى يتمثل فى حشائش قصيرة خشنة مع شجيرات متناثرة . والحشائش فصلية لاتصلح كثيراً لرعى الماشية والأغنام . بل هى مسرح لبعض

الحيوانات البرية المتوحشة كالغيل ووحيد القرن والظباء والزراف والحمار الوحشى والأسود والنمور . وقلت هذه الحيوانات لكثرة الصيد حتى أن بعضها فى طريق الإنقراض . وقد تنبّهت الدول المعنية وبعض الهيئات العلمية لهذه الظاهرة فأخذت فى إجراءات الحفاظ على هذه الثروة القومية الطبيعية . واجتثت بعض هذه الحشائش لتحل محلها زراعة البن والمطاط والقطن والحبوب معتمدة على الأمطار الصيفية والرى إذا قلت الأمطار .

وتبدو حشائش السفانا طويلة (أكثر من ١٢٠ سم) وكثيفة وتتخللها أشجار متباعدة وذلك قرب نطاق المناخ الاستوائى . ثم تصبح حشائش أقل طولاً (من ٦٠ - ١٢٠ سم) مع قلة فى الأشجار كلما بعدنا نحو الأطراف شمالاً وجنوباً . وتظهر أشجار السنط Accasia ذات القمم المسطحة والأغصان شبه العمودية على السبّاق والتي لايزيد إرتفاعها عن خمسة أمتار ويشغل هذا النوع من السفانا نحو ١٥ ٪ من المساحة . وفى بداية فصل المطر الذى يمتد من ٧ إلى ٩ أشهر تنمو الحشائش وأوراق السنط فى مساحة خضراء متسعة . ومع حلول فصل الجفاف من ٣ إلى ٥ أشهر يتحول الإقليم الى أرض جافة . وتتغير أنواع الحشائش مع الإرتفاع والانتشار على سطح الهضاب المتموجة السطح كهضبة البحيرات وهضبة الحبشة وأنجولا وهضاب كينيا وماحولها . وتنمو أيضاً غابات البامير .

#### ج ( المناخ الصحراوى ونبات المناطق الهامشية :

ويتمثل فى الصحراء الكبرى شمالاً وصحراء كلهارى جنوباً . فأما الصحراء الكبرى فتغطى مساحة ضخمة مابين سواحل المحيط الأطلسى غرباً حتى البحر الأحمر شرقاً بسطح هضبي فى مظهره . وقد قسم الى عدة أحواض داخلية من أهمها الأحواض الشمالية التى تقع جنوب النطاق الأطلسى باسم العرق الشرقى والعرق الغربى . كما تمتد مرتفعات الحجار وتبسى ودارفور فى وسط الصحراء

الكبرى فى قوس ضخمة ما بين جنوب الجزائر حتى غرب السودان . وقد احتضنت عدداً من الأحواض الداخلية من أهمها حوض الجوف الذى يمتد حتى موريتانيا وجنوباً يندمج مع حوض النيجر . ثم حوض تيسستى وحوض دارفور . هذا بالإضافة إلى شبكات الأودية الجافة التى تنساب فى جميع الجهات . وتشكل شبه جزيره سيناء إمتداداً جغرافياً للصحراء الكبرى بأوديتها الجافة وأحواضها الداخلية . وتشير أخيراً إلى الأحواض الداخلية بالصحراء الليبية المصرية والتى من أهمها منخفض الكفرة ومنخفض فزان ومنخفض القطارة ومنخفض الروادى الجديد ومابها من واحات متناثرة.

وأما صحراء كلهارى أو ناميب فتتمدد فى جنوب غرب إفريقيا إلى الجنوب من أنجولا محتضنة أراضي بيسرانا Bechuanaland وناميبيا Namibia حتى سواحل المحيط الأطلسى . ويمر بجنوبها نهر أورنج Orange ورافده فال Vaal . وقد تموج سطحها فى أحواض داخلية تفصلها نتوءات هضبية للتباين فى التركيب الصخرى . ومن هذه المرتفعات دامارالاند Damaraland مع انتشار البحيرات والسبخات البحيرية تنتهى إليها شبكات من أودية جافة .

وأما عن التفسير الجغرافى لهذه الصحارى فتتمدد الصحراء الكبرى فى ظل الكتلة الأوراسية الضخمة إلى الشمال والشمال الشرقى ويفصل بينهما البحر المتوسط . وتهب الرياح الشمالية الشرقية والشمالية من هذه الكتلة الأوراسية فتصل إلى الصحراء الكبرى جافة أو شبه جافة . أما صحراء كلهارى فتتمدد أمام الساحل الغربى جنوب خط الاستواء فى نطاق ضيق . وتصل إليها الرياح الجنوبية الشرقية من المحيط الهندى وقد تخلصت من معظم مياهها فى رحلتها الطويلة بالجنوب الإفريقى فتصل هى الأخرى جافة أو شبه جافة .

ولاتزيد كمية المطر السنوى عن ٢٥ سم حيث يتبخر الجزء الكبير قبل نفاذه إلى التربة . وفى النطاق الهامشى المجاور من أراضى الإستبس الفقير يصل

المعدل السنوى الى نحو ٦٠ سم يسمح بنمو حشائش فصلية صالحة للرعى خاصة فى إستبس شمال الصحراء . وأمطار هذه الصحراء على الرغم من قلتها فهى لاتسقط بانتظام بل بصورة مفاجئة وغزيرة فى بضع ساعات فتمتد تسول عارمة فى الوديان الجافة . وهى تسقط شتاءً فى الصحراء الكبرى نتيجة لتسرب بعض أعاصير البحر المتوسط . وصيفاً بسبب توغل الرياح الجنوبية الغربية من خليج غانه والمحيط الأطلسى . وأما صحراء كلهارى فأمطارها قليلة صيفاً مع وصول فلول الرياح الجنوبية الشرقية . وهذه الصحارى شتاءً تشكل مناطق ضغط مرتفع محلى تخرج منها رياح جافة .

وأهم ما يميز الصحراء الكبرى بالإضافة الى قلة أمطارها ظاهرة المدى الحرارى الكبير بين الليل والنهار والصيف والشتاء . حيث يصل المدى اليومى فى معظم مناطقها الى ٢٢م والسنوى أكثر من ٢٠م وكثيراً ما تصل درجة الحرارة العظمى الى نحو ٥٥م والحرارة الصغرى تنخفض الى أقل من ٤م . وتمتاز المناطق الساحلية بإعتدال درجات الحرارة لتأثير التيار البحرى المائى البارد ممثلاً فى تيار كنارى البارد شمالاً و تيار بنجويلا البارد جنوباً . ويتكون الضباب فى الصباح الباكر نتيجة للتيارات المحلية التى تهب من الساحل البارد .

والمناطق الهامشية للصحارى تزداد فيها كمية الأمطار . وهى فصلية تتراوح ما بين ٢٥ الى ٥٠ سم فتنبو حشائش فصلية قصيرة ونبات شوكى دائم يصلح لرعى الماشية والأغنام والماعز . ومن أهم هذه المناطق الهامشية التى يطلق عليها مجازاً لفظ إستبس صحراوى نطاق شمال الصحراء الكبرى فى مصر والشمال الليبى وجنوب غرب المغرب . كما يمتد فى الهضبة المراكشيه وهضبة الشطوط فى الجزائر وتونس . وأمطاره شتوية تتأثر بنظام مناخ البحر المتوسط . كما يمتد شريط آخر جنوب الصحراء الكبرى ما بين شمال غرب السنغال الى سواحل البحر الأحمر فى إريتريا وجيبوتي وخليج عدن الى الصومال بالمحيط الهندى .



وحول إقليم صحراء ناميب الجنوبية يمتد نطاق من الإستبس يستلم أمطاراً صيفية تسمح بنمو الحشائش للرعى .

وهذه الصحارى غنية بالمياه الجوفية فى بطون أحواضها ووديانها الجافة تستثمر فى التوسع الرعوى والزراعى الحديث .

#### ٥- مناخ البحر المتوسط وغطاءه النباتى :

ويتمثل خاصة فى المغرب العربى الأطلسى وإقليم الجبل الأخضر وبرقة بالشمال الليبى . بالإضافة الى الطرف الجنوبى الغربى من الجنوب الإفرقى بإقليم رأس الرجاء الصالح Cape of good hope . ويمتاز بأنه حار جاف صيفاً ومعتدل مطر شتاءً . وأمطار الشتاء مرجعها الرياح العكسيه الغربيه الإعصارية من المحيط الأطلسى المجاور . وتزيد الامطار مع الإرتفاع إذ تصل الى نحو ١٥٥ سم سنوياً مع تساقط بعض الثلوج . وتقل الأمطار على السهول الساحلية بمعدل يتراوح ما بين ٥٠ الى ٨٠ سم . مع ملاحظة أن الأمطار تنجذب فى كمياتها وفترات سقوطها من سنة الى أخرى كما يبدو من جدول أمطار شحات بإقليم الجبل الأخضر الليبى . ومرجع ذلك الى تنجذب خطوط الأعاصير الرئيسية بسبب إنكماش واتساع منطقة الضغط المرتفع الدائم على المحيط الأطلسى .

أما درجات الحرارة فتتراوح ما بين ٢٢ الى ٢٦م صيفاً تهبط الى ما بين ١٢ الى ١٥م شتاءً . وقد تصل الى درجة التجمد أحياناً فى الهضاب الداخلية مثل هضبة الشطوط مع حدوث الصقيع .

والنبات الطبيعى كما توضحه الخريطة المرفقة عن المغرب العربى يختلف باختلاف الإرتفاع وتباين كمية الامطار وطول فترة فصل الجفاف . وعلى المرتفعات تسود أشجار الفلين والبلوط والكستناء وبعض الصنوبريات . كما

تنتشر على المنحدرات السفلى حشائش الإستبس مع شجيرات متناثرة . ويكثر  
رعى المواشى والأغنام والماعز وتربيتها . كما تنتشر زراعة الحبوب ولاسيما  
القمح والحمضيات والزيتون والكروم والفواكهة فى مناطق متناثرة على السهول  
والاودية النهرية وعلى المدرجات الجبلية وفى الأحواض الداخلية .

### هـ- ظاهرة العيون بأنواعها :-

ويمتاز إقليم مناخ البحر المتوسط بظاهرة إنتشار العيون . ونشير إلى التوزيع الجغرافى لمياه العينين بمنطقتى الجبل وبنغازى بالشمال الليبي كمثال لهذه الظاهرة بالشمال الإفريقى ولاسيما فى بطون الاودية وعلى خطوط الإنكسارات . فبعض تجمعات المياه الجوفية تجد طريقها الى سطح الأرض خلال الكهوف أو الكسور فتخرج على هيئة عيون وتوجد فى المنطقة مجموعة كبيرة من العيون ، تتباين فى طبيعتها وفى كمية المياه التى تنتجها .

أ - سهل بنغازى : يوجد به عين رئيسية تصب فى البحر وهى عين زيانة وعين كهف الكوفية . ومن المعتقد طبقاً للدراسات الحديثة أن هناك مجرى مائى جوفى كبير ربما له أكثر من فرع فى تلك المنطقة وهذا المجرى المائى هو الذى يغذى عين زيانة وعين الكوفية وهو مصدر المياه فى القرىها وسيدى منصور . وهذا المجرى المائى يتبع التشققات التى تنتشر فى شبكة كبيرة بالاقليم . وهذه التشققات جاءت كرد فعل لحركة الرفع التدريجى التى أصابت الاقليم بفعل تحرك النظام الألبى فى حوض البحر المتوسط منذ عصر الايوسين بأوائل الزمن الثالث .

وتضخ حالياً كمية مياه من مصدر بنينة تبلغ حوالى ٢٠٠ لتر/ث لتغذية مدينة بنغازى بمياه الشرب وقد لوحظ أن نسبة الملوحة بها تتزايد باستمرار السحب ويجرى حالياً تنفيذ مشروع ضخ المياه من سيدى منصور لتغذية مدينة بنغازى وقد قامت شركة جيڤلى بقياس تصرف عين زيانة وقدرت هذا التصرف بحوالى ١,٢ م مكعب/ثانية فى شهر مارس ويرتفع الى حوالى ٥ م مكعب/ث فى شهر أغسطس وتنوعية المياه مالحة من ١٢,٠٠٠ الى ١٥,٠٠٠ جزء فى المليون عند المصب فى البحر . ويعتقد أن تصرف العين يزداد فى الصيف حين تصل مياه الأمطار المغذية للمجرى المائى التى تسقط فى مناطق بعيدة فى موسم الشتاء .

ب - الجبل الأخضر : توجد عدة عيون يمكن تفصيلها كما يلي :

١ - عين الدهوسية : وتعطى التغذية الرئيسية لخط مياه الشرب لمدينة البيضاء والمرج وبعض المدن الصغيرة وصمم الخط على أساس أن تصرف العين ٢٢٠ لتر/ث . وبالنظر الى تناقص تصرف العين يرجع أن هذا النقص يرجع بصفة أساسية الى وجود فاقد فى داخل العين وليس فقط بسبب هبوط المتوسط العام لسقوط الأمطار فى المنطقة فى السنين الأخيرة . كما أنه لوحظ حالياً أن المياه لا تكفى لاحتياجات الشرب فى مدينة البيضاء والمرج وهذا يرجع الى عدة أسباب منها :

١ - أن كميات من المياه تقدر بحوالى من ٢٥ الى ٣٠ لتر/ث تسحب من الخط فى بدايته مما يسبب نقص التصريف وهبوط الضغط اللازم على الخزانات .

٢ - وقد تكون هناك زيادة فى الاستهلاك لرى الحدائق حول المنازل أو لاستعمالها فى أغراض أخرى .

٣ - وقد تكون ساعات تشغيل الطلمبات غير كافية .

وترى جيفلى أنه يمكن زيادة تصرف العين بمقدار من ٢٥ الى ٥٠ ٪ من تصرفها الحالى وتحدد كمية الضخ ويحدد المكان المناسب لتركيب الطلمبات الاضافية لسحب هذه المياه وفقاً للدراسات . ويقدر تصرف العين فى هذه الحالة بحوالى ٣٠٠ لتر/ث بفرض زيادته ٥٠ ٪ .

٢ - عين ستيوه : تصرفها يقدر بحوالى ٢٣ لتر/ث وهى غير مستغلة حالياً الاستغلال اللازم .

٣ - عين مسه : يقدر تصرفها بحوالى ٢٠ لتر/ث تستغل جزء بسيط منها فى الزراعة .

٤ - مجموعة عينون فى هضبة الوسيطه : وعددها (٧٢) عينا متناثرة ما بين مسه شرقا وعين ستيوه غربا منها (٤٠) عين تصب طوال السنة ومجموع تصرفها ٢٢ لتر/ث والباقي يجف فى فترة الصيف والعينون الدائمة غير مستغلة استغلالا تاما حاليا .

٥ - عين رأس الهلال : تصرفها ٩ لترات/ث وموقعها بعيد ويجرى استغلالها فى زراعة مساحات صغيرة بالموقع .

٦ - عين مارة : تصرفها ٤٥ لتر/ث يستغل منها ٢٠ لتر/ث فى أغراض الرى .

٧ - عين بو منصور وعين البلاد ووادي درنة : قدرت شركة هيدروبروجكت تصرفها بحوالى ٥٨٠ لتر/ث يستغل منها حوالى ١٥٠ لتر/ث لأغراض الشرب فى مدينتى درنة وطبرق وكذلك لرى بعض المساحات المجاورة وهناك دراسة قدمتها هيدروبروجكت لاستغلال المياه الفائضة فى مشروع زراعى تحت الرى بمنطقة الفتايح . ومشروع الفتايح ضمن الاصلاح الزراعى وقد تم مسح شامل لعينون وادى درنة وروافده وفقا للخريطة المرفقة .

وعن التوزيع الجغرافى للمياه الجارية السطحية :

تقدر مساحة تجمع الأمطار بمنطقة الجبل الأخضر وسهل بنغازى بحوالى ٩٠٠ كم<sup>٢</sup> ويبلغ متوسط مايسقط من الأمطار على هذه المساحة طول السنة حوالى ٣٠٥ مليار م<sup>٣</sup>/ . يتبخر بعضها ويتسرب منها جزء فى باطن الأرض وتستهلك النباتات جزءا آخر أما الجزء الذى لا يتسرب الى باطن الأرض فيجرى فى الوديان الكثيرة وقد يجد طريقه الى البحر . ويمكن حجز بعض هذه المياه فى الوديان التى لها مناطق تجمع كبيرة وذلك باقامة سدود عليها للاستفادة من تلك المياه سواء باستغلالها فى اعادة تغذية الخزان الجوفى بدلا من ضياعها فى

البحر أو فى استغلالها فى أعمال الرى التكميلى فضلا عن حماية المدن الرئيسية التى كثيرا ماتتعرض لخطر تجمع هذه المياه الجارية عقب العواصف المطرية الشديدة وذلك لوقوعها بالقرب من مصبات هذه الوديان فى البحر .

ومشروع وادى القطارة يتمثل فى اقامة مجموعة من السدود بغرض حماية مدينة بنغازى من الفيضانات واعادة تغذية الخزان الجوفى . واستخدام المياه المحجوزة خلف السد فى مشروع زراعى لرى حوالى ٥٠٠٠ هكتار بالمنطقة<sup>(١)</sup> . ومشروع وادى درنة يشمل اقامة سدين رئيسيين كما يشمل اقامة مجموعة من السدود على روافده الرئيسية . فضلا عن اقامة مشروع زراعى بمنطقة الفتاح لرى ١٥٠٠ هكتار باستغلال مياه السدود بالاضافة الى المياه الجوفية ومياه العينون ومياه محطة مجارى درنة فى أعمال الرى . والمشروع يوفر الحماية لمدينة درنة من أخطار الفيضان . كما درست هيدرولوجية الوديان فى المنطقة واقترح اقامة مجموعة من السدود الصغيرة فى ثلاثة مواقع من بين عشرة مواقع أجريت بها الدراسة وهذه المواقع الثلاث هى وادى زازو ووادى الغوط قرب المرج ووادى الخليج قرب درنة . وهذه السدود تحتزن كمية من المياه فى حدود من نصف الى مليون م<sup>٣</sup> فى السنة والتى يمكن استخدامها فى الرى الجزئى لمساحات صغيرة من الأرض تترواح ما بين ١٠٠ الى ٣٠٠ هكتار . هذا المسح الهيدرولوجى لازال مستمرا فى باقى شبكات الأودية الجافة التى تتشعب فى كل الاقليم فى اتجاهات مختلفة<sup>(٢)</sup> .


(١) تقدر مساحة حوض وادى القطارة بنحو ١٣٥٠ كم<sup>٢</sup> . ويهدف المشروع الى حيز نحو ٢٠ مليون متر مكعب سنويا بفضل سدين رئيسيين وسبعة سدود فرعية . هذا بالاضافة الى تثبيت التربة وتقليل الجفافها . (ص ٢٠ من كتاب معرض طرابلس الدولى مارس ١٩٧٤) .

(٢) أ - د . محمد ابراهيم حسن : دراسات فى جغرافية الوطن العربى وحوض البحر المتوسط - الاسكندرية ١٩٨٩ - ص ٣٣٠ وما بعدها .

ب - ليبيا : الأطلس التعليمى - طرابلس - ١٩٨٥ ص ٣٦ ، ٣٧ .


متوسط كمية الأمطار في شحات ( الجبل الأخضر الليبي )  
في سنوات ١٩٤٦/١٩٦٥ - ١٩٦٦/١٩٧٠


السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	شهور أخرى	المجموع
١٩٦٦	٢١٧,٩	٢٥٠,٠	١٠٩,٩	٢٢,٥	٤٦,٠	٣٣,٥	١٦٨,٥	٦٦,٥	٦٩٩,٨
١٩٦٧	١٢٥,٥	٨٥,١	١٠٨,٩	٣٣,١	١٤٥,٢	٥٤,٨	١١٥,٤	١٨,٢	٦٨٦,٢
١٩٦٨	١٩٩,٢	٩٠,٦	٥٥,٩	٠,٣	١٠٥,٦	٩٦,٤	١٢٥,٠	١٠٨,٧	٧٨١,٧
١٩٦٩	٢٤٣,٣	٣٣,٠	٧٢,٨	٣٤,٥	١٥٠,١	٢٦,٦	١١٥,٧	٢١,٣	٦٩٧,٢
١٩٧٠	٦٤,٦	٦١,٤	١٤٥,٦	٢٥,٠	٣٤,٩	٩٦,٥	١٦,٧	٢٧,٥	٤٨٣,٢
متوسط	١٧٠,١	٦١,٢	٩٨,٦	٢٣,١	٩٦,٣	٦١,٥	١٠٨,٢	٥٠,٤	٦٦٩,٤
متوسط	١٣١,٧	٨٩,٩	٦١,٤	١٤,١	٥٤,٣	٧٣,٣	١٢٣,٢	٢٤,٥	٥٧٢



( نقل من : المغرب العربي - دكتور إبراهيم رزق الله )







## الفصل الثالث

### أنماط التربة بالشمال الإفريقي

### دراسات إقليمية

#### المحتويات

- ١ - نطاق التربة وارتباطها بتتابع فترات المطر في عصر البلايستوسين بالشمال الإفريقي.
- ٢ - أنماط التربة في سهل بنغازي وتطورها.
- ٣ - القدرة الانتاجية لأراضي سهل بنغازي.
- ٤ - إنشاء السد العالي.
- ٥ - السد العالي أنقذ مصر من كارثة الجفاف.
- ٦ - زيادة رقعة الاراضي الزراعية.
- ٧ - التربة الرسوبية الفيضية النهرية وأنماطها.
- ٨ - الدورة الزراعية والتربة.
- ٩ - الدورة الزراعية وأثرها في التنمية الزراعية.

## انماط التربة بالشمال الإفريقى دراسات اقليمية

### الخرائط والصور

- ١ - خريطة تضاريس سيناء.
- ٢ - مجموعة من القور قمتد فى منخفض الكفرة بالشمال الليبى .
- ٣ - بحيرات منخفض الكفرة.
- ٤ - الخريطة المورفولوجية لاقليم مربوط شمال غرب مصر.
- ٥ - اقليم قناة السويس.
- ٦ - الصحارى المصرية وشبكات الاودية الجافة.
- ٧ - بحيرات شمال دلتا النيل .
- ٨ - تربة الجزر الرملية بوسط دلتا النيل
- ٩ - تضاريس مصر.
- ١٠ - الجزائر الرملية فى دلتا النيل
- ١١ - الرى والصرف فى دلتا النيل .

## أ- نطاقات التربة وإرتباطها بتتابع فترات المطر في عصر البلايستوسين بالشمال الإفريقي:

وقد أخذت التربة الحديثة تنمو في كل الشمال الإفريقي نموا تدريجيا منذ عصر البلايستوسين حتى الوقت الحاضر متأثرة في ذلك بتتابع فترات المطر التي عاصرت فترات الجليد في أوروبا. وهنا نشير إلى أن الإقليم يمكن أن يقسم في هذا الصدد إلى ثلاثة نطاقات عرضية شرقية غربية تتمثل في:

- أ- النطاق الشمالي الذي يمتد إلى الشمال من خط عرض ٣٠ شمالا.
- ب- النطاق الأوسط ويقع بين درجتي ٢٥° - ٣٠° شمالا.
- ج- النطاق الجنوبي وينحصر بين ٢٥° - ٢٠° شمالا.

ويمتاز النطاق الشمالي بخمس فترات مطيرة إمتدت غربا حتى المحيط الأطلسي تعاصر خمس فترات باردة أو جليدية في وسط أوروبا. وتكونت في أثنائها التربة السوداء والتربة الحمراء<sup>١</sup>.

أما النطاق الأوسط الذي يمتد بين خطي عرض ٢٥° - ٣٠° فهو إقليم هضبي في جملته وقد تتأثرت عليه مجموعة من المنخفضات أو الواحات التي من أشهرها واحة سيوه في مصر، وواحات جغبوب وجالو وأوجلة ومراده وغدامس في ليبيا. وواحات العرق الشرقي والعرق الغربي في الجزائر والمغرب. ويتغير الوضع في هذا النطاق عنه في النطاق الشمالي فهنا لا نجد من فترات المطر الخمس سوى فترتين واضحتين تعاصرا فترتي جليد ريس، وفورم في وسط أوروبا. وهنا تنتشر تربة الواحات السبخية وتربة اللوم الأحمر التي تظهر خاصة فوق مرتفعات جبل السودا وهضبة الهاروج في وسط ليبيا.

<sup>١</sup> جودة حسنين جودة: أبحاث في جيومورفولوجية الأرض الليبية - من منشورات جامعة قاريونس - ص ١٢ وما بعدها. فترات الجليد الخمس هي: ما قبل جيلز 'Pre-günz' جونز، مندل 'Mindell'، ريس 'Riss'، فورم 'Vurm'.

والنطاق الجنوبي يمتد منبسطا بين خطي عرض ٢٥ - ٢٠ وهو نطاق هضبي أيضا ويمتاز بالمنخفضات الكبيرة التي منها منخفض الواحات الداخلة والخارجة في مصر ومنخفض الكفرة ومنخفض فزان في ليبيا. ومن الدراسة التحليلية لأنواع من التربة الحمراء وطبقات سميكة من الكاولين في كل من جنوب ليبيا وهضبة الحجار في جنوب الجزائر تبين حدوث تعاقب لفترات الجفاف والرطوبة إستوعبت الزمن الثالث وسادت ظروف مناخ المغاا بحزارتها ومطرها حتى أواخر البلايوسين. ويحل الجفاف مع بداية البلايستوسين بالزمن الرابع، ويستمر حتى نهاية أواسطه إذ لا تظهر الرطوبة مرة أخرى إلا في البلايستوسين الحديث معاصرة لقرتي ريس، وفورم في أوروبا. ثم تسود بعد ذلك الظروف الصحراوية متحركة في عمليات التعرية وإنتشار تربة الكثبان وتربة الأودية الجافة.

ويظهر هذا التتابع المناخي الذي أشرنا إليه في جنوب ليبيا بصورة أكثر وضوحا في إقليم تشاد وإمتداده غربا في السنغال بين دائرتي عرض ١٤ - ٢٠ شمالا على وجه التقريب<sup>١</sup>. وأخيرا نشير إلى أن هذا التتابع المناخي قد أدى إلى ظهور تربات حمراء مع أمطار أكثر من ٤٠٠ مم في المناطق التي كان المطر يتراوح فيها بين ٤٠٠ - ٣٠٠ مم تظهر تربات الإستبس الغنية بالجير وشبيهة بتربات اللوس. أما في الأصقاع التي كانت تتراوح أمطارها من ٣٠٠ - ١٠٠ مم فنجد التربة تميل إلى التركيب الجبسي والجيري وفقا للإشتقاق الصخري حسب الطبقات الصخرية السفلى.

### ٢- أنماط التربة في سهل بنغازي وتطورها:

ولنأخذ سهل بنغازي مثلا لمدى نمو التربة في الزمن الجيولوجي الرابع. فهذا السهل ينحصر بين الجبل الأخضر والساحل الشرقي لخليج سرت كمثلث رأسه في الشمال عند بلدة توكره وقاعدته في الجنوب بين بلدتي الزويتينة على الساحل وأنتيلات في الداخل إلى الشرق. ويضيق السهل في الشمال لإقتراب الحافة الخارجية للجبل الأخضر من الساحل

<sup>١</sup> Knetsch. G: Geohydrological Ground Water Investigations In North African Desert Regions. - من أبحاث الأمم المتحدة سنة ١٩٦٢.

ولكنه ما يلبث أن يتسع صوب الجنوب وذلك لإبتعاد الحافة عن الساحل تدريجيا. والسهل هنا يتداخل مع الأراضي السهلة الفسيحة الممتدة نحو خليج سرت. وأقصى عرض لسهل بنغازي يصل إلى ٥٠ كم ويتدرج السهل من منسوب سطح البحر إلى ارتفاع يتراوح بين ١٥٠ - ٢٠٠ م عند أسفل حافة الجبل الأخضر. ويقطع هذه الحافة عدد كبير من الأودية الخانقية، وبعضها يمتد على أبعاد قد لا تزيد أحيانا عن بضعة عشرات من الأمتار<sup>١</sup>. وتتجبع بعض الأودية في عبور سهل بنغازي إلى ساحل البحر كوادي السلايب إلى جنوبي تكرة وادي القطارة جنوبي بنغازي<sup>٢</sup>. وبعضها الآخر يقطع جزءا من السهل ثم تفيض مياهه قبل أن يداني الطريق البري من بنغازي إلى توكرة. وتنتشر رواسب هذه الأودية قرب مصباتها في السهل. وتتموج أرض سهل بنغازي متخذة شكل منخفضات ضحلة تكسوها التربة الحمراء. ويفصل بينها ربوات قليلة الارتفاع ضعيفة الإنحدار عارية من التربة في معظم الأحيان. وسهل بنغازي صخري السطح في معظم أجزائه فيظهر الصخر الجيري عاري في بقع مختلفة الأشكال تحيط بها تربات ضحلة حمراء أو بنية محمرة. وهذه الصخور الجيرية الرسوبية البحرية النشأة تنتمي في جملتها إلى عصر المايوسين. وتنتشر رواسب الزمن الرابع على طول الشريط الساحلي وتمتد في الداخل كغطاء رقيق من تربة حمراء تكسو الصخور الجيرية. وهذه الرواسب البلايستوسينية تبدو دائما رقيقة السمك إلا في بطون الأودية التي تعبر السهل إذ يزداد سمك التربة الحمراء فيتراوح بين ٦ - ٧ م بوادي القطارة في موقع الهواري على طريق سلوق جنوبي بنغازي بنحو ٩ كم. وهي تتركز في هذا الموقع على صخر جيري مايوسيني ناصع البياض ويستثمر في صناعة الأسمنت.

وتنوع التربة في سهل بنغازي يظهر واضحا على جانبي الطريق الرئيسي عبر السهل. هذا وعند مصبات الأودية في السهل تنتشر الرواسب

<sup>١</sup> يحسن الرجوع إلى (١) الأطلس الوطني للجماهيرية الليبية (اللوحة ص ٣١)، (ب) خريطة ليبيا الجيومورفولوجية ١:٢٥٠,٠٠٠ - لوحة بنغازي ش ذ ١٤٣٤.

<sup>٢</sup> محمد إبراهيم حسن: إقليم وادي القطارة - دراسة في جغرافية الإنتاج الزراعي - مجلة كلية التربية - جامعة الفاتح - العدد التاسع ١٩٧٨ - طرابلس ١٩٧٩ - ص ٢٠٥-٢٢٥.

في شكل مراوح دلتاوية من تربة طفالية تستدق حبيباتها، وتتظم هذه الدلتاوات المروحية في نطاق يمتد قريبا من أسفل حافة الجبل الأخضر وتتجدد هذه المراوح في شتاء كل عام مع تساقط الأمطار التي تسيل في الأودية حاملة لرواسب صلصالية حمراء تخصب المزارع البعلية للقمح والشعير والحشائش.

ونشير أيضا إلى ظاهرة الحفر الكارستية التي تغطي أحيانا بتربة حمراء مع تفتت صخري محلي وأحيانا تملؤها المياه الجوفية على شكل بحيرات صغيرة متناثرة في سهل بنغازي. وتظهر هذه الحفر نتيجة للإذابة الموضعية لصخور جيرية لينة في المناطق الضعيفة التي تأثرت بحركات تكثونية أصابت إقليم الجبل الأخضر في الزمنين الثالث والرابع<sup>١</sup>.

وإشارة إلى أصل هذه الظاهرة ندرس ثلاثة نطاقات صدعية أحدها يمتد من سيدي منصور في الشرق عبر منطقة الكوفية إلى عين زبانة على الساحل غربا<sup>٢</sup>. والنطاق الثاني يمتد من بنية شرقا إلى بوعطني. والنطاق الثالث يوازي وادي القطارة الأدنى وينتهي جنوب بنغازي. وتتجمع مياه الأمطار والمياه الجوفية في هذه الصدوع متسربة في مجاري باطنية صوب البحر. وقد شاهدنا بعض هذه الحفر الكارستية في دراستنا الحقلية لإقليم سهل بنغازي. وهي حفر متفاوتة الأحجام وتشرف جدرانها على قيعانها بإتحدارات شديدة. ولاحظنا بنوع خاص أن جوانبها الشرقية شديدة الإتحدار مما يؤكد أن هذه الحفر نتجت عن إذابة الماء السطحي للتكوينات الجيرية الضعيفة بالتعاون مع الماء الجوفي الذي يتسرب من الشرق إلى الغرب نحو البحر مع الإتحدار العام للسهل.

وقد ظهرت بعض الكهوف الجيرية العميقة التي من أشهرها وأهمها كهف الليثي أو الغدير، ونسبة الأملاح بمياهه مرتفعة. والكهف الثاني في منطقة الكوفية ويسمى بالجبيخ، ويصل عمقه إلى نحو ٢٤ مترا ومنسوب

<sup>١</sup> L. King: The Morphology Of The Earth - Glyver & Boyd -

Britain 1967 - P. 252-271.

<sup>٢</sup> راجع الخريطة المرفقة عن القسم الشمالي من سهل بنغازي.



الماء على نحو ٤م وماؤه عذب ونسبة ملوخته ٣ جزء لكل ١٠,٠٠٠ جزء وتستخدم مياهه في ري الأراضي المجاورة.

ومشروع القطارة يعمل على تحسين نوعية وكمية المياه الباطنية على جانبي الوادي في مجراه الأدنى حتى إقليم مدينة بنغازي علما بأن حجم بحيرة للتخزين أمام السد الرئيسي على مجرى الوادي الأدنى يصل إلى مائة مليون متر مكعب ومساحة بحيرة التخزين عند السطح هي ١٧٠٠ هكتار لري حوالي ٤٠٠٠ هكتار في شكل مزارع اقتصادية من تربة طغلية معتلة التماسك<sup>١</sup>.

وفي تتبعنا لأنواع التربة في سهل بنغازي نشير إلى تربة الكثبان الرملية التي تمتد بحذاء خط الساحل. وهذه الكثبان الرملية الحديثة تتصل في هيئة نطاق من رمال ناصعة البياض، ويتفاوت ارتفاعها من ٥ - ١٠م. ويمكن تتبعها من الزويتينة حتى بلدة دريانة على الساحل. ومن بعدها تضمحل حتى تتلاشى عند قرية برسيس جنوبي توكرة بنحو ٩كم. وبعدها نجد الشاطئ صخريا تشرف عليه جروف قليلة الارتفاع. وتتركب هذه الكثبان قديمها وحديثها من حطام الأصداف البحرية الدقيقة الحبيبات التي إندمجت ببعضها بالكلسيت وهي تخلو عادة من الرواسب الحصوية والحفريات الكبيرة الحجم. والكثبان القديمة تظهر مغبرة اللون لطول تأثرها بعمليات التجوية وسفي الرواسب الحمراء من التربة الحمراء المجاورة. وهي ظاهرة طبيعية تميز الإقليم.

وبين سلاسل الكثبان الشاطئية الحديثة ونطاق الكثبان الداخلية القديمة يمتد شريط من سبخات محلية إذ يسود نوع من التربة المحلية السبخية الفقيرة. وبعض هذه البحيرات السبخية يتصل بالبحر بفتحات صغيرة تغذيها بمياه الشتاء بفعل الأمواج العاصفة. وقد ردمت بعض هذه السبخات طبيعيا بالرواسب القارية وتحولت أرضها للزراعة وكما حدث حول قرية دريانة مثلا. كما جفت بعضها صناعيا حول مدينة بنغازي. وهنا تظهر التربة الملحية وقد غطيت بغطاء أبيض يمتد مغبرا محمرا بسبب اختلاط الأملاح بالمواد الصلصالية الحمراء والتي تنقلها الرياح أو مياه الأودية

<sup>١</sup> محمد إبراهيم حسن: المرجع السابق - ص ٢٠٨ وما بعدها.

التي تنتشر في هذا السهل كما أشرنا من قبل. وتعتمد هذه الظاهرة في الجزء الأدنى من وادي القطارة.

وإمتداد سهل بنغازي شرقا وشمالا بشرق يتمثل في إقليم الساحل الذي يضيق بالتدريج من بضعة كيلومترات عند توكرة إلى حوالي كيلومتر عند طلمیثة. ثم يكاد يختفي بعد ذلك حتى نهاية الإقليم. والمصطبة الأولى بإقليم الجبل الأخضر وهي التي تلي السهل الساحلي مباشرة قد تأثرت بالتعرية الكارستية وتكسوها تربة حمراء سميكة في كثير من المناطق ولاسيما في سهل المرج، كما تخترقها المجاري الوسطى لبعض الأودية التي أشرنا إليها من قبل<sup>١</sup>. وتشرف حافات هذه المصطبة على إقليم الساحل. ويتراوح ارتفاعها بين ١٠٠ - ٢٥٠ مترا جنوبي توكرة ويتراوح ارتفاع المصطبة الثانية بين ٤٥٠ - ٦٠٠ مترا وحافتها تزداد ارتفاعها وقربا من البحر المتوسط كلما إتجهنا نحو الشمال الشرقي. ففي منطقة البيضاء يصل ارتفاعها إلى حوالي ٦٠٠ مترا ولا تبعد عن إقليم الساحل بأكثر من بضعة كيلومترات بل تكاد تتلاقى الحافتان الأولى والثانية في إنحدار وعرض شديد نحو إقليم السهل الساحلي. وتتميز هذه المصطبة الثانية من إقليم الجبل الأخضر بكثرة أخواضها الصغيرة المغطاة بالتربة الحمراء البنية السمكية مع بعض الحفر الكارستية<sup>٢</sup>. والأخواض المتناثرة المغطاة بتربة سميكة تشكل ظاهرة تميز مدرجات الجبل الأخضر<sup>٣</sup>. بينما لا نلاحظ مثل هذه الظاهرة على نطاق واسع في إقليم السهل المجاور.

وعن القدرة الإنتاجية لأراضي سهل بنغازي فيلاحظ أن أراضي الدرجة الأولى والثانية والثالثة محدودة المساحة متناثرة في بعض بطون

Buru M.: Soil Analysis & Its Relation To Land Use In Elmarj<sup>١</sup>  
Plain - Cyrinaica - Bulletin Of The Faculty Of Arts - Vol. II -  
Benghazi 1968 - P. 41-42.

<sup>٢</sup> للتعرض في المصطبة الثانية يميز هذا الإقليم كما يبدو من مراجعة الخرائط الطبوغرافية مقياس ١:٥٠,٠٠٠ مثل لوحات جردس العبيد وتاكلس والبيضاء.

Kikhia. M.: Le Nomadisme Pastoral en Cyrenaïque<sup>٣</sup>  
Septentrionale. رسالة دكتوراه غير منشورة - ١٩٦٨ - ص ٢٧ وما بعدها.

الأودية التي تقطع هذا السهل<sup>١</sup> كما يبدو واضحا من الخريطة التفصيلية الخاصة بتصنيف التربة<sup>٢</sup>. فأراضي الدرجة الأولى رسوبية عميقة القطاع عمقها أكثر من ١٢٠ سم قوامها غالبا طمي طيني مع بعض الرمال ولا توجد بها تجمعات جيرية هشة أو صلبة. وأما أراضي الدرجة الثانية فهي رسوبية ذات تكوينات مختلطة متوسطة العمق ٨٠ - ١٢٠ سم وطبقة سطح التربة يسودها التكوين الطيني وبها نسبة قليلة من القطع الصخرية على سطح الأرض وكذلك يقطع التربة. وأراضي الدرجة الثالثة رسوبية طميية جيرية يتراوح عمقها بين ٥٠ - ٨٠ سم متوسطة التماسك ويوجد على السطح ويقطع التربة نسبة متوسطة إلى مرتفعة من القطع الصخرية تصل إلى نحو ٢٠٪. وأما أراضي الدرجة الرابعة فهي تمثل النوع المساند في هذا السهل وهي أراضي ضحلة يقل سمكها عن ٥٠ سم وغالبا ما يظهر الحجر الجيري على السطح وهي أراضي يصعب إستغلالها إقتصاديا، ولذلك وجهت في الإستثمار الزراعي الحديث نحو زراعة المراعي التي تمثل أنسب إستثمار لمتل هذه الأراضي.

وقلة الأيدي العاملة الفنية تشكل إحدى مشكلات إستثمار الأراضي في هذا الإقليم إلا أن الدولة تتغلب على هذه المشكلة تدريجيا بالتوسع في إستخدام التقنية العلمية الحديثة وتدريب الأيدي العاملة الوطنية على الأساليب العلمية المتطورة التي من شأنها توفير الأيدي العاملة مع جلب بعض العمال من المناطق المجاورة<sup>٣</sup>.

وأما عن تنوع مصادر المياه وأثره في نمو التربة، فتحضن أراضي سهل بنغازي جزائنا جوفيا رئيسيا يمتد في مثلث يحده الجبل شرقا والبحر شمالا وغربا وخط يمتد عرضيا من الجبل الأخضر إلى بنغازي جنوبا. ويتكون هذا الخزان من تجاوير وشقوق تكونت في العصر المايوسيني،

<sup>١</sup> محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي - الطبعة الثانية - ص ٣٥١، ٣٥٦.

<sup>٢</sup> الأطلس الوطني: ليبيا - خريطة سهل بنغازي التفصيلية عن إستثمار الأراضي.

<sup>٣</sup> Salem Hajjaji: The Agricultural Development Plans In The L. A. ٢  
-Jamahiriya & The 5 Years Agricultural Transformation Plan - 1976  
1980 - P. 76-77.

وتمتد في طبقات جيوية ضخمة. ويتميز بظاهرة الفجوية حيث تتحرك المياه عبر الفجوات الكهفية والشقوق<sup>١</sup>. ويمكن أن يعطي هذا الخزان من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ لتر/ثانية. ولكن يجب إختيار مواقع الآبار بعيدا عن البحر لمنع تدّخل مياه البحر. ويبلغ سمك الطبقات الحاملة للمياه من ٥٠ إلى ٦٠م. أما عمق المياه بها فيتراوح ما بين ٢٠ إلى ١٠٠م تحت سطح الأرض<sup>٢</sup>. هذا بالإضافة إلى تجمعات مائية محدودة داخل الكثبان الرملية التي أشرنا إلى توزيعها من قبل على طول الساحل. ولا شك أن هذه المياه الجوفية في بطون التكوينات الجيرية قد ساهمت في إنتشار ظاهرة الكارست التي ناقشناها من قبل. ويقدر مجموع الإستهلاك والمخطط له ما بين سيدي خليفة وطمليئة بنحو ١٥ مليون م<sup>٣</sup>/عام<sup>٣</sup>.

ويحظى الإقليم بكمية من الأمطار تزيد نحو الشمال الشرقي لتوغل الساحل في البحر في مواجهة الرياح المطيرة وأيضا لإقترب حافات الجبل الأخضر وإزدياد ارتفاعها في ذلك الإتجاه كما يبدو من الخريطة المرفقة موضحة مواقع الحافات بالنسبة للساحل المجاور. وإذا تتبعنا أرقام الأمطار وفقا للجداول الرسمية، يتضح لنا أنها تزيد نحو الشمال والشمال الشرقي فهي نحو ٢٢٨مم في إقليم بنغازي، و ٢٧٦مم في توكرة، و ٣٣١مم في طلميئة نتيجة لهذه الظاهرة المشار إليها مؤكدة أهمية الموقع الجغرافي وهي تطبق أيضا على نظام المطر في كل من المصطبة الأولى والمصطبة الثانية بإقليم الجبل الأخضر. فنجد مثلا أن معدلات الأمطار تزيد في المصطبة الأولى كلما إتجهنا نحو الشمال الشرقي فهي ٢٩٧مم في فزوزغة، و ٣٣١مم في المرج، و ٤٤٢مم في العويلية، وكذلك ٥٠٠مم في بطة. وإقليم السهل الساحلي يلي المصطبة الأولى من حيث موارد المياه. وتتحدّر إليه الأودية والمياه الجوفية من المناطق الأكثر ارتفاعا في الداخل. ولهذا فمياهه الجوفية قريبة نسبيا من السطح. كما أن

١ أمانة السندود المائية: منجزات ثورة الفاتح من سبتمبر في قطاع السدود والموارد المائية - ديسمبر ١٩٧٨ - ص ٢٧.

٢ محمد إبراهيم حسن: دراسة في جغرافية ليبيا والوطن العربي - الطبعة الثانية - ص ٣٠٦.

٣ أمانة السندود المائية: المرجع السابق - ص ٣٥.

٤ محمد إبراهيم حسن: جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط - ١٩٨٩ - ص ٣٣٢، ٢٤٠.

قربه من البحر يساهم في إرتفاع رطوبته النسبية وتكاثر الندى. إلا أن أبرز عيوبه يتمثل في إختلاط المياه الجوفية بمياه البحر المالحة في الطبقات القريبة من مستوى سطح البحر<sup>١</sup>، مما أدى إلى ظهور مساحات متناثرة من التربة الملحية والسبخية.

والمياه السطحية مكملة للمياه الجوفية في التوسع الزراعي والرعوي ولذلك تتجه السياسة المائية الحديثة نحو التوسع في إنشاء السدود على الأودية الجافة لتحقيق الأهداف الآتية:

- ١- التحكم في الفيضانات وحماية المدن والأراضي الزراعية.
- ٢- تغذية الخزانات الجوفية.
- ٣- حجز المياه التي كانت تضيع هباء إلى البحر وإستغلالها في أغراض مختلفة.
- ٤- مقاومة إنجراف التربة وإستزراع أراضي جديدة.

ومشروع وادي القطارة يمثل أهم مشروعات التخزين بالإقليم. ويمتد الوادي لمسافة ٦٠ كم ليصب في البحر المتوسط عند قاريونس جنوب غربي بنغازي. وقد أقيم سد رئيسي على مجرى الوادي على بعد ٣٠ كم جنوبي مدينة بنغازي ويصل حجم بحيرة التخزين لم السد إلى مائة مليون متر مكعب، هذا بالإضافة إلى إقامة سد ثانوي على مسافة ١٠ كم شمال موقع السد الرئيسي. وحجم بحيرة التخزين لم السد الثانوي يصل إلى خمسة ملايين متر مكعب. هذا بالإضافة إلى إقامة سبعة سدود فرعية على الروافد الرئيسية لوادي القطارة لمنع الرواسب من الوصول إلى بحيرتي التخزين لتقليل الإطماء في خزانات السدود وتغذية تربة هذه الأودية بظمي متجدد. وقد أفاد هذا المشروع في التوسع الزراعي المتكامل وفقاً لخطة علمية حديثة في أراضي الوادي والدلتا والأراضي المجاورة<sup>٢</sup>. ويشكل هذا

١ سعد قسطندي: مناخ إقليم المرج - مجلة كلية الآداب - جامعة بنغازي - العدد السابع ١٩٧٥ - ص ٢٦٧ وما بعدها.

٢ محمد إبراهيم حسن: إقليم وادي القطارة - دراسة في جغرافية الإنتاج الزراعي - مجلة كلية التربية - جامعة الفاتح - العدد التاسع ١٩٧٨ - ص ٢٠٨.

المشروع مثالا جيدا لمدى التكامل في الإستثمار الزراعي بين أنماط التربة وتنوع مصادر المياه والتقنية الحديثة.

وختاما عن أنماط التربة في إقليم سهل بنغازي فإنه يستخلص من هذا العرض التحليلي لتصنيف التربة في إقليم سهل بنغازي الأنماط الرئيسية الآتية للتربة:

- ١- تربة الأودية الجافة التي تشكل شبكة كبيرة تقطع الإقليم وهي تبدأ من الجبل الأخضر مخرقة سهل بنغازي نحو ساحل البحر المتوسط .
- ٢- تربة الدلتاوات المروحية التي تتمثل في نطاقين أحدهما يمتد عند أسفل المصبوبة الأولى للجبل الأخضر عند الأطراف الداخلية لسهل بنغازي ينما يمتد النطاق الثاني عند الأطراف النهائية للسهل مطلة على البحر المتوسط وهي تشكل نهايات الأودية التي تمكنت أن تصل بمصبباتها حتى البحر المتوسط.
- ٣- التربة الحمراء التي تظهر في الأجزاء الأكثر إنخفاضاً من سهل بنغازي الذي ينحدر تدريجياً نحو البحر المتوسط في شكل تموجات خفيفة تؤدي إلى خلق منخفضات ضحلة تكسوها التربة الحمراء. كما أن كثيراً ما تغطي الحفر الكارستية بتربة حمراء مع تفتت صخري محلي.
- ٤- التربة الجيرية الكارستية التي تنتشر حول الحفر الكارستية على شكل تفتتات جيرية رسوبية. وقد أشرنا تفصيلاً إلى هذه الحفر الكارستية التي نشأت في مناطق الصدوع الضعيفة نتيجة لإذابة الماء السطحي والجوفي للتكوينات الجيرية الضعيفة. وقد ردمت هذه الحفر بالتربة الحمراء وأحيانا تحولت إلى بحيرات صغيرة متناثرة في سهل بنغازي.
- ٥- التربة الملحية السبخية التي تمتد في شريط حول البحيرات والسبخات بين سلاسل الكتبان الشاطئية الحديثة ونطاق الكتبان الداخلية القديمة. وهي تربة فقيرة لإرتفاع نسبة الأملاح بها. وقد جففت معظم السبخات حول مدينة بنغازي وبدء في إستصلاح التربة الملحية السبخية بغسلها وحرثها حرثاً عميقاً مع إضافة الأسمدة المناسبة لتحسين نسيج التربة وإرتفاع نسبة المواد العضوية والأزوتية بها. وبدأ الزحف الزراعي

الحديث يمتد نحو هذا الشريط من التربة السبخية على طول النطاق بين بنغازي وتوكره.

٦- التربة الكثيبيية ممثلة في تربة الكثبان الرملية التي تمتد بحذاء خط الساحل. والكثبان الحديثة تتصل في هيئة نطاق من رمال بيضاء يتفاوت ارتفاعها من ٥ - ١٠ م. والكثبان القديمة الداخلية تظهر مغبرة اللون لتأثرها بعمليات التجوية وسفي الرواسب الحمراء من التربة الحمراء المجاورة التي تغطي الأحواض والحفر الكارستية.

وهكذا يبدو أن تصنيف التربة في سهل بنغازي يعتمد على عاملي الإشتقاق الصخري والتفاعل المناخي مع عامل التقنية الفنية الحديثة ممثلة في التوسع في إستخدام الأسمدة المناسبة والحرث الحديث والدورات الزراعية المناسبة والتقنين المائي الحديث في نظام الري.

#### ٤ - إنشاء السد العالي:

ومصر في حاجة ماسة إلى دقة الإشراف على توزيع المقننات المائية إذ يبلغ المتوسط السنوي للتصريف النهري في مصر في نصف القرن الماضي ٩٢ مليار متر مكعب في السنة، ولكن مصر تستغل من هذا المقدار نحو ٥٨ مليار متر مكعب، وأما الباقي وهو ٣٤ مليار متر مكعب فيضيع في البحر المتوسط أثناء الفيضان<sup>١</sup>. هذا فضلا عن ٤٠ مليار متر مكعب يفقدها النيل في منطقة مجراه الأعلى وهذا يساوي ٤٣٪ من الكمية التي تصل إلى مصر، وإذا زاد التحكم في مجرى النيل وقل الفاقد إلى نصف هذا المقدار السابق أمكن إضافة نحو ٢٠ مليار متر مكعب فيرتفع مقدار التصريف السنوي للنيل عند أسوان إلى ١١٢ مليار متر مكعب.

هذا ويمكن أيضا أن تستغل في مشروعات الري مياه الصرف التي تقدر بنحو ١٥ مليار متر مكعب سنويا والمياه الجوفية التي تقدر بنحو ١٠ مليار متر مكعب سنويا ومن هذا العرض يتضح أن مشكلة التوسع

<sup>١</sup> مصطفى الجبلي: مستقبل التوسع الزراعي في مصر - مجلة المهندسين - فبراير ١٩٥١ - ص ٤١-٤٣.

الزراعي في مصر ليست هي قلة المياه اللازمة ولكن هي توفير الأراضي الصالحة<sup>١</sup>.

وأمام هذا الفقد الكبير وبالإضافة إلى التقلبات الشديدة التي تحدثها حالات القحط والفيضان إذ خلال موسم الفيضان العالي يصل المنصرف من النهر عند أسوان إلى ١٢٠٠ مليون م<sup>٣</sup> يومياً، وقد لا يصل خلال موسم الفيضان المنخفض إلى ٤٥٠ مليون م<sup>٣</sup> يومياً، ولكي تحصل مصر على أكبر قدر ممكن من الفوائد من مصادر النهر الغنية، لذلك نشأت فكرة بناء سد عال على نهر النيل على بعد ٧ كم من سد أسوان وذلك لإستثمار موارد النهر<sup>٢</sup>.

وتكون المياه المحجوزة أمام السد العالي بحيرة صناعية كبيرة تعتبر ثاني بحيرة من صنع الإنسان في العالم وسيترتب على حجز مياه الفيضان ترسيب غالبية المواد العالقة بالماء في البحيرة إلا أنه روعي في تصميم المشروع أن يتسع حوض التخزين كميات كبيرة من المواد الرسوبية على مدى مئتين طويلة وتبلغ سعة حوض التخزين ١٥٧ مليار متر مكعب موزعة كالآتي:

- ٣٠ مليار متر مكعب لتجميع المواد الرسوبية على ٥٠٠ عام.
- ٣٧ مليار متر مكعب لإحتياطي للوقاية من الفيضانات العالية.

أما المسعة المتبقية فهي تضمن توفير المياه التي توزع بين جمهورية مصر العربية والسودان. مع الأخذ في الإعتبار المياه التي ستفقد عن طريق البحر.

قدرت النفقات الكلية لبناء السد العالي ومحطة توليد الطاقة وخطوط التحويل إلى القاهرة والتعويضات نظير المناطق التي تفرقها مياه

١ - المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي: للتوسع الزراعي - القاهرة ١٩٥٤ - ص ٤٣، ٣٤

ب - المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي: مشروعات الإنتاج الرئيسية ص ٢٤، ٣٠

ج - المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي: للسياسة المائية ص ١٣، ٣٠  
٢ - وزارة الإرشاد القومي: السد العالي ص ٣ ومعايها



الخزان... الخ بنحو ٢٤٥ مليون جنيه مصرى. وإذا أضفنا إلى ذلك تكاليف مشروعات الري وإستصلاح الأراضي وشق الطرق وبناء المنازل وغير ذلك من المرافق العامة، تصل النفقات الكلية للمشروع حوالي ٥١٤ مليون جنيه مصرى.

ويقدر الدخل القومي الناتج عن التوسع في المساحة المنزرعة والوفاء بإحتياجات الري وتحسين عمليات الصرف وتنظيم الملاحة وتوليد الطاقة... الخ بنحو ٢٣٤ مليون جنيه مصرى ومن ثم نجد أن الزيادة السنوية التي تطرأ على الدخل القومي نتيجة لإتمام المشروع تصل إلى ما يقرب من ٥٠٪ من اجمالي النفقات. وكان ذلك في الستينات. ثم تضاعف هذا الدخل بعد ذلك مع إرتفاع الأسعار.

وبإستطاعتنا أن نجمل المزايا الخاصة التي تعود على جمهورية مصر العربية لبناء السد العالي فيما يلي:

- ١- توسيع رقعة الأرض المنزرعة بنحو ١,٣ مليون فدان من الأراضي الجديدة التي يتم إستصلاحها.
- ٢- تحويل ري الحياض في مساحة قدرها ٧٠٠ ألف فدان إلى ري دائم ومن ثم تتضاعف إنتاجيتها.
- ٣- ضمان إحتياجات الأراضي المنزرعة حالياً والمستجدة حتى في السنوات التي يكون فيها منسوب المياه منخفضاً.
- ٤- وقاية البلاد من عوامل الفيضانات العالية.
- ٥- التوسع في محصول الأرز حتى يمكن تصديره.
- ٦- تحسين ظروف الملاحة على النيل.
- ٧- إنتاج طاقة كهربائية تقدر بنحو ١٠ مليار كيلووات في السنة أي حوالي خمسة أمثال الطاقة التي تتولد من محطة توليد الطاقة في خزان أسوان.

## ٥- السد العالي أنقذ مصر من كارثة الجفاف:

أكد الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء أن السد العالي أنقذ مصر من الجفاف ثماني سنوات من ٧٩ حتى ٨٦، حيث تم سحب ٩٠ مليار متر مكعب مياه من بحيرة السد العالي، وهو ما كان يعني عدم زراعة ١٣ مليون فدان خلال هذه الفترة خسائر بالمليارات بخلاف خسائر الطاقة والملاحة والسيلاحة، كما أكد الدكتور محمد عبدالهادي راضي وزير الأشغال العامة والموارد المائية أن السد العالي منع اهدار ٣٢ مليار متر مكعب من المياه سنويا، وتحولت إلى رصيد متجدد لمصر والسودان بعد أن كانت تلقى في البحر.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المستشار أحمد رضوان وزير شئون مجلس الوزراء في المؤتمر الدولي للسدود، أن مصر أحييت شبكة الري والصرف والمشروعات المقامة على النيل وبالممارسة الفعالة على الطبيعة وكان الفضل في ذلك للفكر الهندسي المصري المتطور لمشروع التحكم في الموارد المائية وتنميتها على نهر النيل عن طريق السد العالي.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته أن نهر النيل سيظل موضع الاهتمام الأكبر والأشمل ليظل منذ عهد الفراعنة متبعا للخيرات والنماء. وقال وزير الأشغال أن تاريخ لجنة السدود الكبرى الدولية حافل بالإنجازات العلمية والعملية الهائلة منذ عام ١٩٣٢، وقال أن السد العالي رمز لقوة الإرادة والصمود، وهو دليل على كفاءة المهندسين المصريين، وأكد أن كل ما قيل وما أثر حول السد العالي لم يكن له أي أساس علمي.

وأوضح الوزير أن السد العالي أنقذ مصر من الجفاف ولولا أننا سحبتنا من مياهه لكان علينا أن نستورد مزيدا من الغذاء بما يعادل نحو ٤ مليارات دولار بخلاف الطاقة التي قدرت بنحو ٢,٥ مليار دولار، أي أن السد العالي وفر لمصر في سنوات الجفاف نحو ٦,٥ مليار دولار بينما لم يتكلف أكثر من ٤٥٠ مليون دولار.

يضم المؤتمر ٣٦٩ عضواً في ٢٠ لجنة تناقش هندسة وتكنولوجيا السدود والخزانات الكبرى ومشروعات تنمية المياه بخلاف ندوة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والفنية لمشروع السد العالي بعد ٣٠ عاماً من تشغيله<sup>١</sup>.

وحصة مصر تكون ٥٥,٥ مليار م<sup>٢</sup> والسودان ١٨,٥ مليار م<sup>٢</sup> وأي زيادة عن هذين الرقمين تخزن في بحيرة السد العالي أو فيما يسمى "البنك المائي"، لأن الثقة التي صنعتها دورات الفيضانات على مدى سنوات التاريخ الحديث تؤكد أن هناك دورة للفيضانات العالية الوفيرة الإيراد المائي تليها دورة شحيحة للفيضان تخفض الإيراد وكل دورة تتراوح عدد سنواتها من ٧ إلى عشر سنوات<sup>٢</sup>.

#### ٦- زيادة رقعة الأراضي الزراعية:

أ- في الوادي: هذا، وبفضل مياه السد تمت توسعات في مياه الري أدت إلى زيادة في مساحات الأرض الزراعية سواء القديمة أو الجديدة تقدر بـ ١٦٠ ألف فدان هذا العام ليصبح الزمام الكلي للأراضي الزراعية عام ١٩٩٤/٩٣، ٧ ملايين و ٦٦٠ ألف فدان مقابل ٧ ملايين و ٥٠٠ ألف فدان عام ١٩٩٣/٩٢، أي بزيادة ١,٢٪ على العام الماضي. وأن المساحات المحصولية زادت بنسبة ١٪ أي ما يقدر بـ ١٣٥ ألف فدان حيث بلغت ١٩٩٤/٩٣، ١٤ مليوناً و ٢٦٢ ألف فدان مقابل ١٤ مليوناً و ١٢٧ ألف فدان في العام الماضي. إن الزيادة في المساحات بالنسبة للأراضي القديمة ترجع إلى عمليات تحسين الأراضي والحفاظ على قدرتها وإستغلال الأراضي البور المتخلفة للأراضي الزراعية والإهتمام بتحسين وسائل الري والصرف. ويتم إستصلاح الأراضي الجديدة بمستويات عالية من التكنولوجيا المناسبة للأراضي المصرية والإهتمام بنظم الري المتطور. وأنه بالنسبة للزيادة في المساحات المحصولية، فقد تمت بانتخاب اصناف جديدة من المحاصيل القصيرة العمر في الأرض مما

<sup>١</sup> جريدة الأهرام: ١٩٩٣/١١/٤ - ص ١٠.

<sup>٢</sup> جريدة الأهرام: ١٩٩٣/١٠/٧ - ص ٣.

يتيح زراعة أكثر من محصول على نفس الأرض، بالإضافة إلى إتباع نظام التسميل والتوسع فيه وادخال نظام الشتل في محصول الأرز<sup>١</sup>.

ب- التوسع في الأودية: التي تنتهي إلى بحيرة السد فتشكل في نهايتها مناطق مهمة للتوسع الزراعي الحديث. ويعتبر وادي العلاقي مثالا جيدا لهذه الظاهرة الجغرافية فالتربة خصبة من نوع جيد ومياه الري متوفرة من البحيرة ويقع وادي العلاقي على بعد ١٨٠ كليومترا من جنوب أسوان. في الجهة الشرقية من بحيرة السد. يبدأ الوادي من هضبة هي التي تفصل شاطئ البحر الأحمر عن وادي النيل. ويمتد وادي العلاقي حوالي ٢٧٥ كم في اتجاه جنوب شرق/شمال غرب ومتوسط عرضه ١ كم وهو ضيق في أعلاه ومتسع في نهايته عندما يقترب من البحيرة. وهو كمنطقة جافة صحراوية لا تسقط عليها الأمطار عادة. والأمطار تسقط على المنطقة بمتوسط كل خمس سنوات أقل من ١٠٠ مم. بعد بناء السد العالي وارتفاع المياه بالبحيرة دخلت المياه في خور العلاقي لمسافة حوالي ٨٠ كم إلى الداخل مما أغرق الأرض واستمرت المنطقة تحت الماء حتى بدأ منسوب المياه في الإرتفاع حيث ارتدت المياه حوالي ٤٠ كم تاركة وراءها أراضي خصبة تقدر بحوالي ١٥٠-٢٠٠ كم وصالحة للزراعة. وأن هناك جهدا عظيما يبذل حاليا لتشجيع نموذج و نمط ملائم ومتواصل للتنمية. فالمنطقة يمكن ترميمها زراعيًا وتعدينيًا وصناعيًا لتشجيع الحرف اليدوية البيئية بجانب ذلك فهي منطقة جذب للنوبيين للإقامة لاسيما فان الوصول إلى الوادي أصبح أكثر سهولة بعد إستكمال الطريق إلى محاجر الرخام القريبة من المنطقة. ولكن بجانب هذا كان لابد من المحافظة على الظواهر البيئية النادرة للوادي. وإعلان أنه مجمعة طبيعية لحفظ المصادر الوراثية للنباتات والحياة البرية وتجنب الإستخدام الجائر السريع للموارد الطبيعية وحماية التنمية على أسس بيئية وقد تم تسجيل ٩٢ نوعا من النباتات النادرة وحوالي ١٥ نوعا من الحيوانات الثديية كالغزال والضبع والقطة الرملية. ويوجد حوالي ١٦ نوعا من الطيور النادرة أما من الناحية التعدينية فإنه إبان العصر

<sup>١</sup> جريدة الأهرام: ١/٨/١٩٩٣ - ص ١٠

الفرعوني كان يعتبر وادي العلاقي مصدرا هاما لإستخراج الذهب، وتوجد الآن عدة مناجم بالمنطقة تستخدم اقتصاديا لإستخراج خامات النحاس، وتم العثور على الكروم واليورانيوم والتلك في مناطق مختلفة من الوادي. هذا بجانب مناجم الرخام الموجودة بالمنطقة والتي تقدر بحوالي ٣٠٠ مليون متر مكعب<sup>١</sup>.

٣- تلوث نهر النيل: نهر النيل العظيم يلث من الشكوى وإستمرار إهماله وتلوث مياهه، فإلى جانب المصانع التي تلقي بمخلفاتها في نهر النيل توجد ظاهرة أخطر وأسوأ من ذلك فهناك ١٨٢ باخرة سياحية عمل كفنادق عائمة تنقل السياح عبر مجرى نهر النيل من أسوان إلى القاهرة مروراً بمدينة الأقصر تنقل على متنها أكثر من ألفي سائح في كل أسبوع. والكارثة تتجسم في أن معظم هذه البواخر تلقي بالمخلفات الأدمية للسياح وطاقم الباخرة في نهر النيل. وفي إحصائية رسمية لوزارة الأشغال تفيد أن ١٤ باخرة فقط من بين ١٨٢ باخرة تلقي بمخلفاتها في نهر النيل دون معالجة. بقية الفنادق العائمة وعددها ١٦٨ باخرة كما تقول أوراقها مجهزة بأحواض المعالجة لتحويل المخلفات الأدمية الصلبة إلى مادة سائلة تعود إلى نهر النيل بعد إخضاعها لجهاز المعالجة والمواد الكيماوية القاتلة للبكتريا والجراثيم. وهذا الأمر يخضع لضمير مدير الباخرة الذي يخاف بشكل دائم على جهاز المعالجة غالي الثمن ويفضل عدم تشغيله إلا عند حضور لجان التفتيش والرقابة وإذا إستمر الجهاز عرضة للعطل نتيجة التشغيل مما يهدد بسحب ترخيصه إلى جانب إرتفاع ثمن المواد الكيماوية المعالجة. كل ذلك يؤدي إلى عدم تشغيل جهاز معالجة مياه الصرف الصحي بالبواخر. وشجعت محافظة أسوان القطاع الخاص على إنشاء شركة تتولى سحب المخلفات من الخزانات وتصرفها في المجاري العمومية للمدينة نظير اشتراك سنوي. إلا أن عشر شركات فقط رحبت وشاركت مع الشركة وحارب البعض الشركة لأنها تكلفهم أعباء مالية وجاء الحل الحاسم من الدكتور عاطف عبيد بوصفه المسئول عن حماية البيئة فأعتمد في عام ١٩٨٧ مبلغ ٣,٥ مليون جنيه من أجل إنشاء محطة ثانية لإستقبال مخلفات البواخر

<sup>١</sup> جريدة الأهرام: ١٩٩٣/٨/١ - ص ١٥

السياحية من صرف صحي أو مياه غسيل أو مخلفات تشغيل  
الماكينات بالمازوت وتقوم هذه المحطة بتزويد البواخر بإحتياجاتها من  
المواد التموينية والبترولية ومياه الشرب النقية كل ذلك نظير أجر  
رمزي وتقديرا للموقف أصدر وزير الإسكان والتعمير أمر تكليف  
يحمل رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٧ صادرا لإحدى شركات المقاولات الكبرى  
للبدأ فوراً في تنفيذ إنشاءات المحطة التي اختير لها موقع يبعد ١٥ كم  
شمال مدينة أسوان ورغم مرور ٦ سنوات على قرار وأمر التكليف  
ومع توافر الإعتماد المالي من جهاز شئون البيئة إلا أن سير العمل  
يسير بسرعة السلفاء وعام يلي عاما والمحطة لم يتم إنشاؤها  
ومستلثل تلوث نهر النيل مستمر<sup>١</sup>.

<sup>١</sup> جريدة الأهرام: ١١/٤/١٩٩٣ - ص ١٤



### خريطة: تضاريس سيناء.

- شبه جزيرة سيناء تعطي عرضاً جيداً لأنماط تربة حوض البحر المتوسط ممثلة في:
- ١- تربة الأودية الجافة.
  - ٢- تربة الدلتاوات المروحية.
  - ٣- التربة البركانية الجبلية بجنوب سيناء.
  - ٤- التربة الجيرية الرملية المفتتة محلياً بالوسط والشمال.
  - ٥- التربة الرسوبية الفيضية بإقليم قناة السويس.
  - ٦- التربة السبخية البحرية حول بحيرتي البردويل والمنزلة.
  - ٧- تربة الجزر الشاطئية البحرية<sup>١</sup>.

<sup>١</sup> أطلس الشرق الأوسط ص ٢٠.

## ٧- التربة الرسوبية الفيضية النهرية وظاهرة التلوث

### ١- تربة وادي النيل الأدنى وذلثاه:

إذ كون النيل سهله الرسوبي إلى الشمال فيبدأ من أسوان ضيقاً حتى إلى الجنوب من ثنية قنا وبعدها يتسع تدريجياً مع إختلاف في إتساع الوادي من جهة لأخرى. وإلى الشمال من القاهرة يتسع هذا السهل الرسوبي على شكل مثلث قاعدته ترتكز على البحر المتوسط ورأسه جنوب القاهرة. وتكونت الدلتا في خليج فسيح إنتشر فيه الرواسب إنتشاراً. وقد ساعدت كثرة الرواسب وقلة المد والجزر في مياه البحر المتوسط وضحولة هذا الخليج وحمايته من العواصف بشريط من الجزر الكثيبيبة إلى الشمال منه على سرعة تكوين الدلتا وهي دلتا ناضجة قليلة المستنقعات إذا قورنت بغيرها من دلتاوات البحر المتوسط. وتتحدّر إنحداراً تدريجياً من إرتفاع ٢٠ متراً قرب القاهرة إلى ساحل البحر المتوسط.

وعند أطرافها الشمالية يمتد شريط من البحيرات التي تشغل مساحة تبلغ نحو ٦٦٠,٠٠٠ فدان. ويفصلها عن البحر حاجز ساحلي من الرمل قليل الإرتفاع. وتتصل هذه البحيرات بالبحر بفتحات أو بواغيز ففي الشتاء ومع هبوب العواصف تغطي مياه البحر على هذه البحيرات. وأما عن سمك رواسب النيل الطينية فهي تتراوح ما بين ٨,٣ متراً في الوادي إلى ٩,٨ متراً في الدلتا. وهذه الرواسب غنية بعناصرها المعدنية والعضوية. ويلاحظ أن الخليج القديم الذي تكونت فيه الدلتا إمتاز بوجود بعض الجزر الجيرية الرملية المختلطة بفتحات قوقعية بحرية. ولما ظهرت الدلتا فوق صفحة الماء ظهرت معها الأجزاء العليا من هذه الجزر الخليجية.



وقديما كانت الدلتا مسرحا لتذبذب فروع النيل القديمة. وأفرع الدلتا في ذلك العهد كانت غير ما نعرفه الآن في توزيعها<sup>١</sup>. فقد ذكر إصطرابون ما لا يقل عن سبعة فروع مختلفة وقد ضعفت معظم هذه الفروع وأندثرت ولم يبق منها سوى فرعي رشيد ودمياط. ويرجح أن سبب إختفاء هذه الفروع يرجع لتقابل تيار الماء بنتوء عند أو الفرع الذي يسد تدريجيا حتى يضعف الفرع ويندثر. وقد حولت بقايا هذه الفروع القديمة إلى ترع حديثة للري في الدلتا. وتخلفت عن هذه الفروع القديمة المنتشرة أشرطة من تربة صفراء وهي خليط من الرمل والطين.

و فرع دمياط أطول الفرعين فيصل طوله من قناطر الدلتا القديمة هتى مصبه في البحر المتوسط نحو ٢٤٢ كم بينما فرع رشيد فطوله ٢٢٦ كم إلا أن فرع رشيد يمثل الفرع الرئيسي من حيث إتساع المجرى وما يحمل من مياه ورواسب بمتوسط يصل إلى ٥٠٠ متر يقابلها ٢٧٠ مترا في فرع دمياط. ومرجع ضمور فرع دمياط إلى كثرة الفروع التي كانت تأخذ منه. ولكن في ظل نظام الري الحديث وفقا للتقنين المائي الدقيق في الري مع تطهير المجرى من الرواسب الزائدة وضمها إلى الأراضي المجاورة فإن فرع دمياط إستعاد نشاطه القديم.

وإذا كانت تربة الوادي والدلتا ترجع في تكوينها إلى أصل واحد هو طمي النيل الذي حملته مياه النيل الأزرق من تفتتات صخور البازلت البركانية على هضبة الحبشة بفعل الأمطار الموسمية الصيفية الغزيرة، فإن هذه التربة تختلف في تركيبها ونسيجها من جهة إلى أخرى بسبب تباين الظروف الجغرافية المحلية كنظام الإرساب وذبذبة فروع الدلتا وشق ترع ومصارف حديثة ونقل الرياح لذرات من الجير والرمل من الصحاري المجاورة. فالتربة الصفراء التي تبلغ نسبة الصلصال فيها حوالي ٣٠٪ والباقي مواد رملية تظهر على جوانب الترع والمجاري القديمة نتيجة لطبيعة الإرساب. وهي تربة فقيرة في الفسفات ولذلك لا تصلح كثيرا لزراعة البرسيم والحبوب ولكن تجود بها زراعة الفواكه والمواالح

<sup>١</sup> - محمد عوض محمد: نهر النيل - ص ١٢٠، ١٢٤.

والخضراوات. وتندرج التربة الصفراء ببعدها عن المجاري المائية تدريجيا إلى التربة السوداء بمعدل أكثر من ٦٠٪ من الصلصال.

وتمثل التربة السوداء هذه معظم تربة الوادي والدلتا وتبلغ نسبة الصلصال فيها أكثر من ٦٠٪ وهي تربة معتدلة التماسك تحتفظ برطوبتها المتنوعة مما يؤكد أهمية حرثها عميقا. وهي غنية في عناصرها المعدنية والكيميائية ما عدا الآزوت وتعوض في النقص الآزوتي بإستخدام الدورات الزراعية المناسبة وبالأسمدة الآزوتية وبإطالة مدة إراحة التربة (الشرافي) فتقل رطوبة الأرض وتخلو من المزروعات وترتفع درجة حرارتها مما ينشط الكائنات الحية في التربة التي تقوم بعملية التآزت والتي يتحسن معها نمو النبات. وهذه التربة هي أنسب أنواع التربة لزراعة القطن والحبوب. ويطلق عليها في حوض البحر المتوسط بأنها تربة القطن الجيد.

وترتفع نسبة الأملاح في تربة أطراف الدلتا ومنخفض الفيوم لضعف إندادها وقربها من مسطحات مائية ملحية تتمثل في بحيرات شمال الدلتا وبحيرة قارون بشمال الفيوم. والتوسع في نظام الري الدائم منذ أواسط القرن الماضي مع ضعف شبكات الصرف قد ساعد على رفع مستوى الماء الباطني وضعف التربة ولاسيما في شمال الدلتا. وعلاجاً لهذا المشكل قد توسعت مصر في حفر شبكات الصرف كما أنشأت على نهايات المصارف الرئيسية طلمبات كهربائية لرفع مياه الصرف إلى البحيرات المجاورة. كما خضع منخفض الفيوم لنفس العلاج. مع العناية بغسل التربة والتوسع في زراعة الأرز التي تتطلب ريات متوالية مما يساعد التربة على التخلص من أملاحها.

وتظهر بقاع من التربة الرملية الجيرية التي تمثل تربة الجزر الخليجية القديمة ولاسيما في وسط وشرق الدلتا. وقد بدأ في إستثمار هذه الأراضي بنقل مياه النيل إليها وخطها بالتربة السوداء المجاورة وهي تصلح لزراعة الفواكه والموالح ولاسيما أشجار المانجو. أما التربة الرملية الكثيبية فهي تغطي نطاق الكثبان في شمال الدلتا التي تشكل حاجزا يفصل بين البحيرات والبحر المتوسط المجاور وتتكون من ذرات رملية جيرية حملتها الرياح من الصحراء ويحد هذا النطاق الكثيبي بالبحر المتوسط شمالا

والبحيرات جنوبا في مساحة تصل إلى نحو ٢٤٠,٠٠٠ فدان بينما تزيد مساحة البحيرات على ٦٦٠,٠٠٠ فدان. وتعتبر هذه الكثبان خزانا طبيعيا لتجميع مياه الأمطار. وهي تشكل نطاقا حديثا للتوسع الزراعي ولاسيما زراعة أشجار النخيل من النوع الجيد والحمضيات والفاكهة. هذا، وينحدر سطح الدلتا إنحدارا تدريجيا في اتجاه عام نحو الشمال من منسوب حوالي ١٧ مترا في أقصى جنوبها إلى منسوب سطح البحر في أقصى شمالها بمعدل إنحدار متر لكل عشرة كيلومترات<sup>١</sup>.

ويبدو أن نمو الدلتا في الوسط كان أسرع منه في جوانبها إذ أن مياه النيل في تكوينها للدلتا في الخليج القديم كانت روسيها أسرع وأكثر تقدما في الوسط عنها في الجانبين فلما تكونت فروع النيل بعد ذلك كانت فروع الوسط أبعد في تقدمها في البحر من الفروع الجانبية وكان تقدم الرواسب في الوسط أكثر منه في الجانبين. كما يبدو أيضا من خريطة الدلتا الكنتورية أن سطح الدلتا أكثر استواء في جنوبها بينما يتوجع توجعا ضعيفا في قسمها الشمالي وذلك لكثرة تشعبات فروع الدلتا القديمة في هذا القسم الشمالي مع إهماله زراعيًا منذ أواخر العصر الروماني حتى أوائل القرن التاسع عشر وإزدهار الزراعة في الجنوب مما ساعد على استواء سطحه. ومعظم هذا الجزء المتموج يمتد إلى الشمال من خط كنتور ٣ مشتملا على أراضي التربة السبخية المستنقعية حول البحيرات الشمالية. وهذه الظاهرة الطبيعية بدأت تضعف مع تقدم التوسع الزراعي وإستصلاح التربة الملحية على نطاق واسع<sup>٢</sup>. وأخيرا نشير أن خطوط الإرتفاعات المتساوية تبدو أكثر تقاربا في جنوب الدلتا منها في شمالها بمعنى أن درجة الإنحدار تبدو أسرع جنوبا منها شمالا. وهي تختلف من ١:٨٠٠ إلى ١:١٠٠٠ بالقرب من قمة الدلتا إلى ١:٣٠,٠٠٠ أو أكثر قرب البحيرات الشمالية. وتفسير ذلك طبيعيا مرجعه إلى إختلاف طبيعة الإرساب وحجم ذرات الرواسب في جنوب الدلتا عنه في شمالها علما بأن هذه الرواسب تبدو أخشن في الجنوب عنها في الشمال. والمعروف أنه كلما كانت الرواسب دقيقة كانت درجة الإنحدار أقل. ومن هذا العرض التحليلي لنمو الدلتا والوادي

<sup>١</sup> مصلحة المساحة المصرية: أطلس القطر المصري - ص ٩.

<sup>٢</sup> Willcocks, Craig: Egyptian Irrigation - Vol. I - P. 164.

نستخلص أنماط التربة الآتية وفقا لعوامل نشأتها جيومورفولوجيا وجغرافيا:

- أ- التربة السوداء الرسوبية: وهي تشكل النمط السائد في الدلتا والوادي من أصل بركاني ينتمي إلى صخور البازلت واللافا على هضبة الحبشة والتي فتنت بعوامل التعرية والأمطار الموسمية الضخيمة الغزيرة فنقلتها مياه النيل الأزرق إلى النيل الرئيسي ورسبت في الوادي والدلتا.
- ب- التربة البنية الصفراء: التي تخلفت بعد جفاف الفروع الضعيفة القديمة التي كانت تقطع الدلتا وحلت محلها كأشرطة من تربة رسوبية طينية رملية.
- ج- التربة الملحية السبخية: حول بحيرات شمال الدلتا وهي تشكل نطاق التوسع الزراعي الحديث بشمال الدلتا إذ تجفف تدريجيا وتغسل وترزح بالأرز كمحصول رئيسي يتطلب عدة ريات تساعد على غسيل التربة.
- د- التربة الكثيبية الرملية الجيرية: التي تغطي نطاق الكثبان الذي يشكل حاجزا يفصل بين البحيرات والبحر المتوسط والذي يمثل خزانات لتجميع مياه الأمطار الشتوية التي تستخدم مع مياه النيل في ري نطاق النخيل الضخم بشمال الدلتا وكذلك زراعة الحمضيات والفاكهة والخضراوات.
- هـ- تربة ظهور السلخاف: وهي تشكل الأجزاء العليا من الجزر التي كانت في الخليج القديم الذي تحول إلى دلتا بالإرساب النهري وهي تربة طفالية فوقية بنية فسميت بظهور السلخاف. وتخلط بالتربة السوداء لتصبح من أهم المناطق لزراعة الحمضيات وأشجار المانجو.
- و- تربة الجزر النهرية والبحيرية: وهي تنتشر في بحيرات شمال الدلتا وهي تربة طينية سوداء معتدلة التماسك غنية بعناصرها المعدنية العضوية. وانتشرت في هذه الجزر زراعة كثيفة للخضراوات بالإضافة إلى مزارع حديثة لتربية الأبقار والجاموس. وفي بحيرات شمال الدلتا خصصت الأجزاء العميقة قرب هذه الجزر كمزارع لتربية الأسماك.

ز- مشكلات البحيرات الثمانية وظاهرة التلوث<sup>١</sup>: بحيرة المنزلة تتطلب الإقذاذ العاجل، وتم نقل عدد من الحفارات التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية والبحيرات إلى شاطئ البحيرة علاوة على حفارات ملك الأهالي نستعين بها لسرعة توسيع وتطهير خمس فتحات توصل مياه البحر إلى البحيرة.

وإن الهيئة بادرت منذ إنشائها بالتحذير من مشكلتي الصرف الصحي والصناعي ببحيرة المنزلة، وهناك خطة تتضمن معالجة مخلفات الصرف الصحي والصناعي قبل إلقائها في البحيرة، وبدأ أيضا تنفيذ هذه الخطة بالفعل، وقد ساهمت محطة الصرف الصحي بالجليل الأصفر في التخفيف من حدة المشكلة. وهناك أعمال تتم في منطقة شمال شرق بحيرة المنزلة بإعتمادات ٣,٥ مليون جنيه من جهاز شئون البيئة وتم عمل التطهيرات اللازمة لبوغاز اشتوم الجميل الجديد وإعداد الدراسة الخاصة بتطهير البوغاز القديم والإنتهاء من شق تقاطع بدوي والتميمي.

أننا نعد لإنشاء ميناء للصيادين في بحيرة البرلس يتكلف ١٥ مليون جنيه علاوة على مليون جنيه لتميتها وميناء آخر في بحيرة اذكو يتكلف ١٥ مليون جنيه علاوة على مليون ونصف مليون جنيه لأعمال التنمية وبالنسبة لبحيرة مريوط فقد تم رفع منسوب المياه بها ٢٠سم وهذا يجعل الروح تدب فيها من جديد.

أما بحيرة البردويل فإنها حالة خاصة بحكم موقعها لأن مصادر التلوث بعيدة عنها وبالتالي نركز على أن تعطى أعلى إنتاجية لتعوض النقص في باقي البحيرات التي يجري علاجها ولذلك تم إعداد مشروع لأعمال بواعيز البردويل شمال سيناء.

ورغم كثرة الحديث عن المزارع السمكية فإن إحساس المستهلك بآنتاجها غير موجود فما هو السبب؟، والسبب هو أن المزارع السمكية تعتمد بالدرجة الأولى على إنتاج أسماك التصدير، مثل

<sup>١</sup> تقرير جريدة الأهرام بتاريخ ٢٥/٧/١٩٩٢ - ص ١٩.

القاروص والدنيس وذلك لتغطية الإنفاقات الباهظة التي تحتاجها وهذا ملموس في دمايط كنموذج حيث يوجد بها مزارع على مساحة ١٥ ألف فدان ولكن معظم الإنتاج يذهب للتصدير وعلى أية حال فهو يعود بفائدة عامة حيث يجلب العملات الصعبة. وبهذه المناسبة فإن الهيئة تعمل على تطوير بعض المزارع السمكية القائمة مثل مزرعة برسيق المقامة على مساحة ألفي فدان حيث يجري تطوير القطاعين السادس والسابع بها وكذلك غيرها من مزارع بحيرات شمال الدلتا.

١- ظاهرة التلوث بإقليم بحيرة المنزلة: بحيرة المنزلة مهددة بالتلوث والتجفيف وهي كبرى بحيرات شمال دلتا النيل، وفي البداية فإن أهمية بحيرة المنزلة ترجع إلى أنها من أكبر البحيرات في مصر وتقدم مصدرا رئيسيا لتوفير الغذاء السمكي لمخافظات الوجه البحري وميدانا لتوفير فرص العمل والرزق لمئات الآلاف من المواطنين ومجالا طبيعيا للسياحة الداخلية لم يستغل حتى الآن الإستغلال الأمثل ووصلت البحيرة إلى ما وصلت إليه اليوم من تدهور بيني نتيجة للصرف الصحي غير المعالج، والصرف الصناعي والصرف الزراعي الذي يصب فيها بصفة مستمرة هذا بجانب الإستغلال الجائر لمصادرها وجمع ٢٠٠ مليون زريعة واستمرار عمليات التجفيف التي تتعرض لها فقد كانت مساحتها عام ١٩٠٠ نحو ٧٥٠ ألف فدان وصلت في عام ١٩٩٤ إلى ١٩٠ ألف فدان، وبالتالي فإنها فقدت ٥٦٠ ألف فدان. كما تأثرت الثروة السمكية فقد انخفضت الطاقة الإنتاجية للبحيرة من ١٧٥ ألف طن سنويا من أفضل أنواع الأسماك إلى ٧٥ ألف طن معظمها من الأسماك الصغيرة والمعرضة للتلوث حتى أثر ذلك على العادات السلوكية الغذائية لأهل بورسعيد والمخافظات الأخرى المطلة على البحيرة نتيجة للنقص في الكميات والخوف من أكل أسماك معرضة للإصابة بالتلوث.

### أسباب المشكلة:

إن بحيرة المنزلة تتعرض للعديد من مصادر التلوث التي أدت إلى تغيير مكونات مياهها سواء الكيميائية أو البيولوجية أو العضوية وكذلك تغيير مكونات طينة قاع البحيرة، فالتلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة، يصل مداه في مصرف بحر البقر الذي يصل طوله إلى ١٩٠ كيلومترا ويمتد من جنوب القاهرة مارا بمحافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية ويصب في بحيرة المنزلة بكميات تقدر بحوالي ١,٧٥٠ مليون لتر مكعب يوميا.

إن بحيرة المنزلة كانت مصدر رزق لعدد كبير من الصيادين يتعدى ٥٠ ألف صياد من المحافظات المطلة عليها، وإن أهم أسباب تدهور البحيرة سياسة التجفيف، والتلوث، والتعديت وإقامة السدود وعدم تطهير البواغيز بالأسلوب الذي لا يؤدي إلى إطمائها مرة أخرى والصيد طول العام دون توقف. ويؤكد رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية أن خطة الإصلاح تشمل خطة عاجلة تتمثل في تطهير الفتحات الموجودة على الطريق الجديد بورسعيد - دمياط بالإضافة إلى تعميق وتطهير قناة الصقارة والرطمة وشق قنوات جديدة. والخطة الآجلة تتمثل في عمل بوغاز يصل ما بين البحر الأبيض المتوسط ومثلث الدببة بتكلفة قدرها ١,٥ مليون جنيه، كما قام البنك الدولي بعمل دراسة لمكافحة مياه بحر البقر التي تصب في بحيرة المنزلة وتم تحديد الموقع ويتم حاليا إتخاذ الإجراءات لهذا الغرض كذلك يتم حاليا إقامة مشروع معالجة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد الذي يصب في بحيرة المنزلة.

ويبقى السؤال هل تقوم هيئة الثروة السمكية بتنفيذ هذه الخطة وتتدخل وزارة الإسكان والمراقق بإقامة محطة معالجة بالقرب

من البحيرة أم تضاف توصيات المؤتمر إلى المؤتمرات السابقة التي لم تنفذ حتى الآن<sup>١</sup>.

ب- تثبيت أول سحارة تحت بحر البقر: تثبتت أول سحارة تحت بحر البقر لنقل ١٥ مليون متر مياه يومياً، بورسعيد تتحول إلى محافظة زراعية بإضافة ١٨٠ ألف فدان جديد. والسحارة هي قناة لنقل المياه العذبة من النيل تمر تحت مصرف بحر البقر المنتهي ببخيرة المنزلة ومدت فوق "مخدة" أو "وسادة" زلطية رملية تستطيع تحمل ثقل يزيد عن ٥ أطنان ونصف الطن خاصة أن رحلة المياه لترعة السلام التي تبدأ من دمياط وعلى مسافة ٨٧ كليومتراً سوف تصب في هذه السحارة وهي ضرورية لتوئمتها الأخرى سحارة قناة السويس للمرحلة الثانية لترعة السلام التي تنقل مياه الترعة إلى العريش بطول ١٥٥ كيلومتراً هي كل طول المرحلة الثانية للترعة. إذا كانت سحارة بحر البقر قد تكلفت ٢٠ مليون جنيه فإن سحارة قناة السويس ستصل تكاليفها وبطريقة هندسية عالية جديدة إلى ٢٠٠ مليون جنيه أي أكثر من ١٠ أضعاف. ويبلغ الطول الكلي لسحارة مصرف بحر البقر بالكامل ٢٢١٣ متراً، أي ما يزيد على ٢ كيلومتر وربع الكيلومتر ووزنها الضخم وحجمها الهائل كانا من العوامل التي أثارت الإعجاب من كيفية إخراج مثل هذا العمل الفني من الورش وبالأيدي المصرية.

توعم قناة السويس: إن هذه السحارة وتوئمتها سحارة قناة السويس التي بدأ العمل فيها تسهمان في زيادة المساحة المصرية من الأراضي الزراعية بنسبة تزيد عن ١٠٪ من المساحة الحالية لأنها تضيف نحو ما يزيد على ٦٠٠ ألف فدان مستصلحة وسوف تحول بورسعيد إلى محافظة خضراء لأن هناك نحو ١٨٠ ألف فدان جديدة سوف تكون قاعدة للمساحة الزراعية الخضراء للمحافظة وبالتالي لن تصبح بورسعيد مجرد



ميناء على البحر المتوسط ومدينة أو منطقة حرة فقط بل أيضا منطقة لزراعة إنتاج الخيرات لمواطنيها وبقية مواطني مصر<sup>١</sup>.

ج- مشكلة بحيرة قارون: وبحيرة قارون تقع شمال منخفض الفيوم الذي يقع بدوره جنوب غرب دلتا النيل. وهي الأخرى ضعف إنتاجها السمكي ضعفا شديدا علما بأن مساحتها تزيد على ٥٥ ألف فدان. أنها أصبحت خاوية من ثروتها السمكية فهي لا تعطي سوى طن واحد من الأسماك يوميا بمعدل كيلو عن كل ٥٥ فدان أي ١٨ جراما فقط عن الفدان الواحد. والمشكلة بدأت مع بداية الثمانينات أي منذ وقت قريب عندما بدأ إنتاج البحيرة في التدهور واختفاء بعض الأنواع مثل الجمبري والبلطي من الحجم الكبير مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وسريع على مدى هذه السنوات، فارتفع سعر البلطي من ٨٠ قرشا إلى ٦ جنيهات والبوروي من ١٢٠ قرشا إلى ١٣ جنيه في عام ١٩٩٣ والموسى من جنيهين إلى ١٤ جنيه. ولم تنفرد بحيرة قارون وحدها بهذه الظاهرة المؤسفة بل شاركتها بحيرات وادي الريان وهي تشغل مساحة ٤٥ ألف فدان أخرى غرب منخفض الفيوم، فاصبح أهالي الفيوم يحصلون على الأسماك من خارج محافظتهم. وكلية زراعة الفيوم قامت بدراسة أوضاع البحيرات وأكدت الدراسات أن أهم أسباب تدهور الإنتاج ترجع إلى:

- ١- قيام الصيادين بالصيد بطريقة الجر أو الصيد الجائر بشباك مما يجرفها إلى البر وهذا مما يؤدي إلى عدم تكاثر وتوالد معظم الأسماك.
- ٢- وجود عيوب فنية في عمليات نقل الزريعة والقائها بالبحيرات حيث تلقى في القالب في مكان واحد.
- ٣- ارتفاع نسبة الملوحة بالبحيرة والتي تصل إلى ٤٠٪.
- ٤- عدم تناسب مواعيد غلق وفتح البحيرة للصيد مع مواعيد تكاثر ونمو بعض الأسماك. مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وعدم كفاية

المعروض لقلة الإنتاج وإنخفاض مستوى الدخل النسبي للأسرة  
عموما.

وقد تم بالفعل تثبيت نسبة الملوحة بحيرة قارون عند ٣٦ جرام  
في اللتر وهي نسبة عالية تضر بحياة الأسماك وتقضي على  
أغلبها. مع العلم بأن هذه النسبة كانت متصل إلى أكثر من ٤٢  
جرام في اللتر إن لم ينفذ المشروع. وذلك بينما يوجد حول  
البحيرة نحو ٥٦ مزرعة سمكية خاصة مرتفعة الإنتاج بمعدل  
نحو خمسة أقدنة للمزرعة الواحدة ويعتني أصحابها بها وفقا  
لقوانين الصيد عناية كبيرة. وأن زيادة الإنتاج بالمزرعة ترجع  
إلى أن نسبة الملوحة لا تتعدى ٩ جرام/لتر مقارنة بأربعة  
أضعاف في مياه البحيرة وأن الفدان الواحد يعطي ما يقرب من  
نصف طن سنويا. كما يعتنى بنقل الزريعة واختيار أنواعها  
والعمل على نموها فهي تنمو في وقت أقل وأسرع من البحيرة  
فتزيد حجم السمكة أضعاف حجم أمثالها في بحيرة قارون  
أيضا<sup>١</sup>.


د- بحيرة قارون والتنمية البيئية: من منطلق البيئة والتنمية في  
ربوع مصر بدأت الدراسات العلمية تتجه إلى التنمية التي  
تساعد على تحسين الظروف البيئية. وقد كانت بحيرة قارون  
مثالا لذلك فقد بدأت الملوحة تزيد في البحيرة نتيجة البحر  
فالدراسة تقول: بحيرة قارون ذات الشهرة العالمية والعلمية  
تتعرض منذ بداية هذا القرن لتدهور بيئي حاد حيث زادت  
ملوحتها عدة مرات وتقلصت مساحتها إلى أقل من ربع هذه  
المساحة في العصور القديمة وتأثرت بذلك ثروتها السمكية  
وأحيائها بشكل عام. والبحيرة تقع تحت منسوب سطح البحر  
بحوالي ٤٥ مترا وتغطي مساحة حوالي ٢٠٠-٢٥٠ كم<sup>٢</sup>  
ويتراوح عمق المياه بها بين ٦:٥ أمتار تبلغ سعة البحيرة  
التخزينية حوالي ٦٥٠ مليون م<sup>٣</sup> وتغذى حاليا من مياه الصرف  
الزراعي ناتج عن ري اقليم الفيوم عن طريق بحر يوسف حيث  
تتلقى البحيرة سنويا حوالي ٣٦٥ مليون متر مكعب من المياه

<sup>١</sup> جريدة الأهرام: بتاريخ ١٢/٨/١٩٩٣ - ص. ١٧.

مقابل ٤٠٠ مليون متر مكعب تفقد بالتبخّر الأمر الذي أدى إلى زيادة ملوحة البحيرة بإطراد من ٦ جم/م<sup>٣</sup> إلى حوالي ٣٨ جم/م<sup>٣</sup> الآن. لقد بدأنا دراسة تحسين الظروف البيئية لبحيرة قارون لاستخراج الأملاح الزائدة في محاولة لإعادة مياه البحيرة إلى مستوى الملوحة الملائمة لنمو الثروة السمكية والأحياء البحرية الأخرى والاستفادة الاقتصادية بالأملاح المستخرجة وقد قدرت الدارسة المبدئية إمكانية إنتاج ١٠٠ ألف طن من أملاح كبريتات الصوديوم ٢٠٠ ألف طن من أملاح كلوريد الصوديوم و ٢٠ ألف طن من أملاح المغنسيوم. وقد أعدت أحواض ترسب الملح وشغلت مساحة ٥ ملايين م<sup>٢</sup> مجهزة طبقاً لأحدث النظم. كما تمت المرحلة الأولى من المشروع التي سرعان ما تلقتها السوق المحلية وحقت وفراً للعملة الصعبة قدره ٣٠ مليون جنيه سنوياً. وقد أنتج كبريتات الصوديوم بدرجة عالية مكنت من المنافسة الداخلية أمام الأملاح المستوردة من كل من تركيا وإسبانيا بل وفُتحت آفاقاً للتصدير لمعظم الدول المحيطة. وبهذا تعتبر هذه المشروعات والدراسات خطوة إيجابية وناجحة فإنتاج الأملاح من بحيرة قارون واحداً من أهم المشروعات البيئية العامة إذ أن تنفيذه لا يؤدي فقط إلى تحسين البيئة لمياه البحيرة، بل إن نفس هذه الصناعة تعتبر من الصناعات النظيفة التي لا تلوث ما حولها ولا ينتج عنها أي نفايات ضارة علاوة على أنها تخلق مجتمعاً صناعياً جديداً في منطقة البحيرة وتحقق فرص عمل للشباب<sup>١</sup>.

<sup>١</sup> جريدة الأهرام: ١٦/١٠/١٩٩٤ - ص ١٦.





مجموعة من القور تمتد في منخفض الكفرة .



بحيرة غيث وهي إحدى البحيرات الملحة في منخفض الكفرة وتظهر هذه  
البحيرات في المناطق المنخفضة من الواحات

والصورتان يمثلان ظاهريين في مرفولوجيه التربة

- ١- ظاهرة القور وهي تلال تمتد في المنخفضات الصحراوية كمنخفض الكفرة بالجنوب الليبي وأصلها السة متفرعة من جوانب المنخفض الصحراوي قطعت في أجزائها الضعيفه لعوامل التعرية وحولت إلى تلال تغطي بترية طفلية جيرية مفككة ضعيفة في سمك قطاعها تثبت عليها بعض الحشائش والأعشاب الصحراوية وترعاها الماعز
- ٢- ظاهرة البحيرات الحوضية التي تغذيها عيون جوفية كبخيرة غيث الموضحة في الصورة المرفقة بمنخفض الكفرة وهي من أهم الظاهرات الصحراوية. ودائما تحاط هذه البحيرات بترية سبخية ملحية فقيرة نميجهها شديد التماسك. وواحة سيوه بصحراء مصر الغربية تعطي مثلاً جيداً للبحيرات الحوضية وترتبطها السبخية الفقيرة. وقد تدفق فيها مياه العيون بمعدل ١٩٠ ألف متر مكعب يومياً مما أدى إلى تشبع التربة بالمياه والموت التدريجي لأشجار النخيل والزيتون. وقد بدأ أخيراً في العلاج التدريجي لضعف التربة بوسائل منها:

- ١- إيقاف حفر الآبار
- ٢- تعميق المصارف والترع لتخفيض مستوى الماء الجوفي حتى لا تختنق جذور النباتات.
- ٣- غسل التربة الملحية للتخلص من فائض أملاحها.
- ٤- تنظيم الري وفقاً لتقنين مائي حديث.
- ٥- استخدام دورات زراعية مع حرث عميق<sup>١</sup>



وهذه الخريطة تعطي مسحا مورفولوجيا لأنماط التربة في إقليم شبه جاف بالشمال الإفريقي ممثلا في غرب دلتا النيل وما يجاوره من هضبة قطعت بعدد من الأودية الجافة، وتتحدر الهضبة شمالا نحو البحر المتوسط وقد فصلت عنه بشرط من السهول الساحلية وقد امتد عليها أشرطة من الكثبان الرملية الجيرية الحديثة.

وأنماط التربة تتمثل في:

- ١- تربة الدلتا الرسوبية الفيضية السوداء.
- ٢- تربة الكثبان الجيرية الرملية.
- ٣- تربة الأودية الجافة الطفلية.
- ٤- تربة سبخية حول بحيرة مريوط.
- ٥- تربة الهضبة وهي مفتتة محليا من صخور جيرية.

ويعتمد للتوسع الزراعي في هذا الإقليم على مياه السد العالي المخزنة في بحيرة ناصر في الجزء الجنوبي من وادي النيل المصري (١٥٧ مليار متر مكعب). كما بدأ أخيرا في استثمار الأراضي حول البحيرة في مساحة ٣١ ألف فدان وإستغلال الثروة السمكية بمعدل ٤٥ ألف طن سنويا<sup>١</sup>.

---

<sup>١</sup> جريدة الأهرام (المصرية): بحيرة ناصر بالسد العالي - ص ١ - بتاريخ ١٩٩٣/٢/١.







## ٨- الدورة الزراعية والتربة:

## أ- الإرتباط وثيق بين الدورة الزراعية ومدى القدرة الإنتاجية للتربة:

فكلما طالت مدة الشراقي (وهي فترة إراحة التربة من الزراعة) في الدورة الزراعية كلما إستعادت التربة نشاطها مع إستخدام الأسمدة المناسبة ونظام دقيق لتتابع زراعة المحاصيل. وفي أنماط التربة الرسوبية وأيضاً في كل حوض البحر المتوسط يلاحظ أن نظام الري بالراحة توفيراً للمجهود البشري هو النظام السائد دون التوسع في نظام الصرف مما أدى إلى رفع مستوى الماء الباطني في التربة في كثير من المناطق ولاسيما في أطراف الدلتاوات حيث يكون الإنحدار ضعيفاً مع إرتفاع نسبة الملاح لقرب هذه الأراضي من مياه البحار والبحيرات. ولذلك تتجه السياسة الزراعية في كل حوض البحر المتوسط إلى:

- أ- أن تكون الترع عميقة بحيث يكون مستوى الأراضي الزراعية أعلى من مستوى المياه في الترع ولاسيما أثناء الفيضانات النهريّة بما لا يقل عن متر ونصف متر وهو عمق يسمح لنمو الغلات الزراعية بنجاح وفيه خير وقاية لخصوبة التربة. وهذا يشجع إستخدام آلات رافعة تعلم الزراعة الإقتصاد في إستهلاك المياه.
- ب- الإهتمام بتعميق المصارف الرئيسية إلى مترين ونصف متر عن سطح الأراضي المجاورة وكذلك تعميق المصارف الحقلية حتى ينخفض مستوى الماء الباطني. فتصلح الأراضي للزراعة ولاسيما في المناطق التي تأثرت كثيراً بالمياه الجوفية<sup>١</sup>.
- ج- تهتم السياسة الزراعية بتوفير مياه الري. ففي مصر مثلاً لوحظ أنها تفقد سنوياً من نصيبها من مياه النيل وهو ٥٨ مليار متر مكعب نحو ١٠ مليارات متر مكعب نتيجة لسوء نظام الري بالإضافة إلى إمكانية إعادة إستخدام مياه الصرف والتي تقدر بنحو ١٥ مليار متر مكعب بعد علاجها كيميائياً والإستفادة بالمياه الجوفية بنحو عشرة مليارات. فالتكثيف المائي الدقيق يمكن زيادة الأراضي الزراعية إلى

<sup>١</sup> محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط - الإسكندرية ١٩٨٩ - ص ١٧٥ وما بعدها.

نحو عشرين مليون فدان. ولذلك فإن السياسة الزراعية تهتم في كل حوض البحر المتوسط بتشجيع إتباع الدورة الثلاثية ويقصد بها أن المحصول الرئيسي كالقطن أو الأرز مثلاً يزرع في نفس قطعة الأرض مرة كل ثلاث سنوات زراعية مع العناية بمراقبة تتابع المحاصيل في الدورة الزراعية فالقطن كمحصول مجهود للتربة يسبقه محصول مخصب كالبرسيم ويليه أيضاً محصول مخصب كالخضراوات والبقوليات. وتتم هذه الدورة في ظل تقنين مائي دقيق مع صرف الفائض من المياه لحماية التربة من عملية ترسيب الأملاح. وقد طبقت هذه السياسة في معظم أراضي حوض البحر المتوسط، ومصر على سبيل المثال تهتم بتحقيق هذه السياسة الزراعية بهدف رفع رقعة الأراضي الزراعية بها من سبعة ملايين فدان إلى نحو عشرين مليون فدان. وذلك بالإضافة إلى التوسع في نفس الوقت بإتباع التقنية الحديثة لرفع القدرة الإنتاجية للتربة أي تحسين معدلات إنتاج الفدان.

#### ب- الدورة الزراعية وتتابع المحاصيل<sup>١</sup>


إذ يختلف تتابع المحاصيل في الدورة الزراعية وفقاً لعدة عوامل جغرافية من أهمها مدى تدخل الإنسان فنياً وفقاً لما يأتي:

- ١- استخدام دورات زراعية مناسبة.
- ٢- تنوع استخدام الأسمدة.
- ٣- الحرث العميق.
- ٤- التقنين المائي وفقاً لأنواع المحاصيل.
- ٥- شبكات الري وشبكات الصرف.
- ٦- تحويل المنحدرات إلى مدرجات ونقل التربة إليها. كما تخلط التربة بتربة أخرى عند الضرورة مثل خلط التربة الجيرية القوقعية بكتوينات طينية لرفع القدرة الإنتاجية.
- ٧- جمع النباتات المتطفلة على المحصول ومكافحة أمراض النباتات فنياً.

<sup>١</sup> محمد إبراهيم حسن: التكامل الاقتصادي بين المسلمين - كلية الدعوة الإسلامية - مجلة عدد خاص - طرابلس، ليبيا - ١٩٨٦ - ص ١٥٨ وما بعدها.


هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى منها:

- أ- تنوع الإشتقاق الصخري بتنوع الصخور ومنها الصخور الجيرية والرملية والنايرية والبركانية كالجرانيت واللافا والبازلت وكلها تساهم في تكوين أنماط التربة. وتختلف المحاصيل وفقا لهذا التفتت الصخري في الدورة الزراعية.
- ب- إنتشار الأودية النهرية والجافة وما تكونه من تربة رسوبية تختلف من إقليم لآخر.
- ج- إنتشار السبخات والبحيرات الشاطئية والداخلية وما يترتب عنها من خلق أنواع من التربة السبخية الملحية تجفف تدريجيا وتستصلح كمناطق للتوسع الزراعي ولاسيما زراعة الأرز.
- د- تباين توزيع الأمطار وتذبذب سقوطها كظاهرة عامة في حوض البحر المتوسط بسبب تحركات الأعاصير سنويا فمثلا الأمطار تتفاوت في كميتها ما بين ١٠٠٠ مم على النطاق الأطلسي الشمالي إلى أقل من ١٠٠ مم على خليج سرت. كما تتذبذب الأمطار في الإقليم الواحد من سنة إلى أخرى.
- هـ- التباين في التوزيع الحراري وفقا للموقع الجغرافي ومدى الإرتفاع التضاريسي وأثر ذلك على مدى نشاط بكتيريا التربة التي تمتص الأزوت وتحوله إلى مادة فعالة في التربة ويضعف نشاطها مع الإرتخفاض الحراري.



خريطة: الصحراء الشرقية والصحراء الغربية.

توضح هذه الخريطة المجموعة الضخمة من الأودية الجافة في شبه جزيرة سيناء وصحراء مصر الشرقية. وكانت تشكل أنهارا في العصر المطير بالزمن الرابع تكونت على طول الخواثق الإنكسارية كرد فعل لنمو الأخدود الإفريقي الآسيوي. ثم تحولت إلى أودية جافة مع عودة مظاهر الصحراء في الإقليم. فهي غنية بالمياه الجوفية وبتربة طفيلية جيدة ولذلك فهي من مناطق التوسع الزراعي الحديث، ولاسيما هذه التي تتساق نحو وادي النيل مثل وادي طرفة ووادي أسيوط وتحمل مياه السيول والرواسب التي تختلط بتربة الوادي النهري للنيل الأدنى في مصر.



خريطة: بحيرات شمال الدلتا.

توضح الخريطة منخفضات مصر الشمالية حيث التربة الرسوبية الطفلية مع وفرة في المياه الجوفية. فهي مناطق التوسع الزراعي الحديث.



توضح هذه الخريطة المظاهر الطبوغرافية لنطاق البحيرات بشمال دلتا النيل، وهي تبرز المظاهر الآتية من زاوية أنماط التربة:

- ١- إنتشار التربة السبخية البحرية الملحية حول جوانب البحيرات وهي تخضع إلى عمليات التجفيف التدريجي وغسيل التربة تمهيدا للتوسع الزراعي الحديث ممثلا للنطاق الرئيسي للآرز في مصر. وهو أنسب المحاصيل لهذا النوع من التربة لما يتطلبه من عدة ربات تعمل على غسل التربة وتخليصها من الأملاح.
- ٢- ويلاحظ أن هذه البحيرات على إتصال مباشر بالبحر المتوسط عن طريق فتحات أو بواغيز وقد تحولت الأجزاء العميقة منها إلى مزارع سمكية تساهم في تغطية النقص في الثروة الحيوانية. أما الجزر البحرية بتربتها الطفالية فهي تشكل مزارع لتربية الثروة الحيوانية وزراعة البطيخ والشمام والحمضيات.
- ٣- يفصل البحيرات عن البحر المتوسط نطاق من الكثبان الرملية الجيرية وهي تشكل خزانات لتخزين مياه الأمطار. وقد غطيت هذه الكثبان بتربة جيرية رملية عميقة إستثمرت في زراعة غابات من النخيل الجيد.
- ٤- تتحدر الدلتا في شمالها إتحدارا ضعيفا كما يبدو من توزيع خطوط الإرتفاعات المتساوية مع تموج خفيف في السطح مما يتطلب حرثا عميقا للتربة وغسلها بين وقت وآخر للتخلص من الأملاح الزائدة. ومن زاوية القدرة الإنتاجية للتربة فهي أراضي من الدرجة الثالثة مقارنة بأراضي وسط وجنوب الدلتا وتربة وادي النيل الأدنى.



خريطة: الجزر الرملية بوسط دلتا النيل<sup>١</sup>

<sup>١</sup> محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط ص ٣١٩.

هذه البحيرة خير البويع الجعرا في للجرر الرملية في وسط الدلتا وهي تنتمي إلى الخليج القديم الذي تحول إلى دلتا بالإرساب النهري منذ الزمن الرابع الجيولوجي ولم تظهرت الدلتا على صفحة الماء ظهرت معها هذه الجرر الرملية في اجرائها العليا التي يصل معدل إرتفاعها إلى أكثر من عشرين متراً في جزيرة رمال العرقى. ويقل الإرتفاع عن ذلك في جرر رمال منشأة صبري ورمال مقلد والرمالي.

٢- تنتشر التربة السوداء الفيضية حول هذه الجزر وقد سويت أجزاء منها بمستوى سطح الأراضي المجاورة ونقلت إليها التربة السوداء التي خلطت بالتربة الرملية الجيرية القوقعية لهذه الجزر. كما تمتد بجوار هذه الجرر تررع رئيسية مثل ترعة الساحل وترعة الخضراوية ومدت منها قنوات إلى الأراضي التي سويت من سطح هذه الجرر


٣- هذه الجزر تشكل مناطق للتوسع الزراعي الحديث وسط الدلتا وقد اشتهرت برراعة أشجار الحمضيات والفواكه ولاسيما أشجار المانجو التي نجحت رراعتها نجاحا كبيرا لأن تربة هذه الجزر هي أنسب أنماط التربة لهذا النوع من الإنتاج الزراعي في كل حوض البحر المتوسط ولذلك فإن مصر تعتبر من أهم مصدري هذا المحصول في كل حوض البحر المتوسط وذلك منذ أواسط هذا القرن.




١- توضح هذه الخريطة التوزيع الجغرافي للجزائر الرملية التي كانت في الخليج القديم الذي تحول إلى دلتا تدرجيا بالتكامل بين عوامل جغرافية ثلاث:

- أ- ضحولة المياه في هذا الخليج.
- ب- ضخامة حجم الرواسب التي نقلها النيل إلى الخليج سنويا ولأسيما أثناء فيضانه الصيفي بسبب هطول الأمطار الموسمية الصيفية الغزيرة على هضبة الحبشة فتفتت صخور البازلت البركانية التي تنقل بمياه النيل الأزرق إلى النيل الرئيسي وهو ينقلها ويرسيها في الخليج الذي تحول بعد ذلك إلى دلتا هي أكبر وأهم دلتاوات البحر المتوسط.
- ج- ضعف حركة المد والجزر وقلة العواصف الشديدة في البحر المتوسط مع وجود بعض الاضطرابات الجزرية التي حمت الخليج.

- ٢- يلاحظ أن هذه الجزر تتركز في القسم الجنوبي من الخليج القديم الأكثر ضيقا وكانت تشكل السنة من الصخور الجيرية الرملية على جانبي الخليج قطعت وحولت إلى جزر بفعل التعرية البحرية. ولما ظهرت الدلتا ظهرت معها الأجزاء العليا من هذه الجزر. وهي تخضع لعمليات التسوية تدريجيا بالأراضي السوداء المجاورة.
- ٣- لاحظ ظاهرة المنخفضات بصحراء مصر الغربية. وقد غطيت بترربة رسوبية خصبة وتعتمد واحاتها على المياه الجوفية المحلية المتوفرة.
- ٤- تبدو المرتفعات الأخدودية مطلة على البحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس. وقد قطعت بشبكات من الأودية الجافة بتربتها الطفالية وهي مناطق التوسع الزراعي الحديث لتوفر المياه الجوفية.





خريطة: الري والصرف بدلنا النيل<sup>١</sup>.

<sup>١</sup> أطلس الشرق الأوسط: ص ٢٣.

- ١- توضح الخريطة قنوات الري المتشعبة في كل دلتا النيل بحيث أصبحت هذه الدلتا أشهر وأهم دلتاوات حوض البحر المتوسط في كثافة الإنتاج الزراعي. مع ملاحظة أن معظم هذه الترع تشكل أجزاء من فروع النيل القديمة. ويفضل هذه الشبكة الضخمة من القنوات يسود الدلتا نظام الري الدائم وفقا لتقنين مائي دقيق حفاظا على التربة من احتمال زيادة الأملاح بها.
- ٢- كما تبدو أيضا شبكات المصارف على عمق أربعة أمتار لسحب فائض المياه إلى بحيرات شمال الدلتا بمساعدة طلمبات كهربائية.
- ٣- إقليم قناة السويس أصبح من أهم مناطق التوسع الزراعي الحديث في مصر ويمتد هذا التوسع الزراعي أيضا في غرب وشمال سيناء بفضل التربة الرسوبية الجيدة ونقل مياه النيل بترعة الإسماعيلية وفروعها.





## ٩- الدورة الزراعية وأثرها في التنمية الزراعية

١- مقدمة.

٢- مصادر المياه والدورة الزراعية.

٣- مساحات أراضي الري في الوطن العربي.

٤- الدورة الزراعية في بعض البلاد العربية.

٥- أنواع الدورة الزراعية:

أ- الدورة الثنائية.

ب- الدورة الثلاثية.

٦- السياسة المائية:

أ- تعميق الترع والمصارف.

ب- دقة الإشراف على المقننات المائية.

ج- تشجيع استخدام الدورة الثلاثية للتوسع في زراعة حاصلات الحبوب وحاصلات العلف.

٧- الدورة الزراعية تؤثر في:

أ- نظام التسميد وأرتباطه بمتوسط إنتاج الفدان.

ب- تتابع المحاصيل.

ج- أنواع التربة وأرتباطها بالدورة الزراعية.

## الدورة الزراعية وأثرها في التنمية الزراعية:

### مقدمة:

يمتد الوطن العربي بين دائرتي عرض ٣٧،٤ شمالاً ومن ثم فإن جزءاً كبيراً من أراضيه يقع داخل المنطقة المدارية، ولهذا فإنه باستثناء المناطق الجبلية العالية التي تتمثل في جبال الأطلس بالمغرب وجبال لبنان والعراق في المشرق، فإن متوسط درجة الحرارة في كل جهات الوطن العربي أعلى من الحد الأدنى الذي يتطلبه النبات وهو ٤٢ ف (٥٠،٥م) حتى في فصل الشتاء، ولا تنخفض الحرارة إلى هذا الحد إلا في أعالي جبال الأطلس.

وفضلاً عن هذا فإن الحرارة في جهات الوطن العربي ليس من صفاتها التذبذب الواضح الذي تعرفه جهات أوروبا وأمريكا الشمالية مثلاً. ولهذا كان العصر المناخي الأكثر أهمية في الزراعة العربية هو عنصر المطر وليس الحرارة.

والمطر في الوطن العربي قليل في جملته (٢٥٠م.م) ولا يستثنى من ذلك إلا السواحل التي تظاهرها الجبال كما هي الحال في بلاد الشام وسواحل تونس والجزائر والمملكة المغربية وكذلك جنوب السودان. وهو مطر شتوي في كل الأراضي العربية باستثناء النصف الجنوبي من جمهورية السودان والطرف الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية فأقطارها صيفية.

ويسقط المطر في أيام معدودة من فصل التساقط. وكثيراً ما يكون على شكل رخات عنيفة ثم تنتهي بسرعة.

ومعظم المناطق يندبذ مطرها من عام إلى عام، ويختلف موعد سقوطه إختلافاً بينا من سنة إلى أخرى، وهي أمور تضرر بالإنتاج

الزراعي، ودراسة سريعة لإنتاج الجمهورية العربية السورية أو المملكة الأردنية الهاشمية من القمح خلال عشر سنوات متعاقبة تعطي البرهان الواضح على هذه الحقيقة. ولهذا فإن مشكلة الوطن العربي في الجزء الأكبر من أراضيه هي السيطرة على موارد المياه فالحاجة ماسة إلى تخزين مياه الأمطار في الجهات التي تسقط فيها بانتظام وبكمية مناسبة. والري وتخزين مياه الأنهار وحسن ضبطها ضرورة ملحة في الجهات التي يقل فيها المطر عن الحد المناسب.

وتعتمد معظم الزراعة في الوطن العربي على المطر رغم قلته، ويضاعف من حدة المشكلة ما يتصف به من تذبذب فقد يسقط غزيراً أكثر مما يجب في بعض الأحيان فيتلغف الزراعة، وقد ينحبس طويلاً فيهدد بالقحط، ثم هو حتى ولو كان منتظماً لا يصلح لزراعة كثير من الغلات التي تتطلب زراعتها الماء بحساب خاص.

ويمكن أن نستخلص من الجدول الآتي عدة حقائق منها:

إن المطر لا يزال هو عماد الزراعة العربية إذ لا تزيد المساحة التي تعتمد على المياه الجارية على ٢٠,٨٪ من جملة المساحة المزروعة.

وأن جمهورية مصر العربية هي الدولة العربية الوحيدة التي تعتمد اعتماداً تاماً على المياه الجارية في زراعتها، وأن اعتمادها على المصادر الأخرى طفيف بحيث لا يؤثر في الوضع العام، وإن يكن له بلا شك أثره المحلي على بعض الجهات.

وأن جمهورية العراق تكاد تنوزع أراضيها مناصفة بين زراعة السيج وزراعة الديم كما يقول أهل العراق.

وأن السودان قد اتسعت زراعة الري فيه فأصبحت تشغل نحو ثلث المساحة المزروعة، وكان كل اعتماده على المطر منذ نصف قرن.

المساحات المزروعة في الوطن العربي (بآلاف الهكتارات)

الدولة	المساحة المزروعة	مساحة أراضي الري	
		المساحة	%
المملكة المغربية	٨٢٢٨	٢٢٠	٢,٧
الجزائر	٧٠٧٦	٢٤٥	٣,٥
تونس	٤٩١٢	٣٠	٠,٦
الجمهورية العربية الليبية	٢٩٠٨	٧٥	٢,٥
جمهورية مصر العربية	٢٦١٠	٢٦١٠	١٠٠,٠
جمهورية السودان	٧١٠٠	٢٤٠٩	٣٤,٠
فلسطين المحتلة	٢٩٢	١٠٠	٣٤,٠
الجمهورية اللبنانية	٢٧٨	٤٨	١٧,٢
الجمهورية العربية السورية	٤٥٩٠	٥٩١	١١,٣
المملكة الأردنية الهاشمية	٨٩٣	٧٦	٨,٦
جمهورية العراق	٥٤٥٧	٢٩١٢	٥٣,٣
المملكة العربية السعودية	٢١٠	؟	؟
المجموع	٤٤٨٥٤	٩٣٢٤	٢٠,٨

وأن زراعة الري تحتل مكانا لا بأس به في الإقتصاد الزراعي في كل من فلسطين المحتلة والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية.

وأن أكثر الدول العربية اعتمادا على المطر في زراعتها هي المملكة العربية السعودية والجزائر والمملكة المغربية والجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقد تغيرت هذه الصورة ولاسيما في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة مع التوسع الزراعي الحديث كما يبدو من الدراسة التحليلية في الفصل الخاص ببيئة الصحراء.

ومصر من أكثر البلاد العربية اهتماما بالدورة الزراعية، فالنيل، ذلك النهر الذي خلق للوادي وكون في قاعه هذا السهل الخصيب واقتطع من البحر تلك الدال الفسيحة يحمل لها وللوادي في كل عام الطمي الموسمي الذي يجدد خصب التربة، هذا فضلا عن الماء الوفير الذي يزيد في قدرة البلاد على الإنتاج. ذلك هو النيل الذي خلق الدورة الزراعية الأولى في مصر منذ أقدم العصور.

فالنيل كان فيفيض في أواخر الصيف وأوائل الخريف فيغذي التربة بالماء والغرين ثم ينحسر عنها في وقت ملائم لزراعة المحاصيل الشتوية من قمح وشعير، ثم يسقط مطر الشتاء فيغذيها حتى نهاية موسم نموها وحلول فصل الحصاد في أواخر الربيع، وعندما يتوقف الفلاح عن الزراعة في الصيف في وقت لم يعرف فيه نظام الري الدائم تشقق أشعة الشمس الحارة سطح التربة فتسمح بنفاذ الهواء إليها وتغذيها بعناصرها المفيدة وتطهيرها من الآفات. وهكذا يتجلى مبلغ تعاون عناصر البيئة المختلفة من تربة خصبة ونظام جريان المياه والمناخ. وهكذا ظهرت الدورة الزراعية الأولى.

واعتمدت هذه الدورة على نظام الري الحوضي وكان نظاما سائدا في الوادي قبل ادخال نظام الري الدائم. فكانت الأرض مقسمة إلى أحواض تتراوح مساحة الواحد منها بين ٥٠٠ فدان و ٣٠٠٠ فدان. وقد كانت هذه الأحواض محاطة بجسور عريضة استخدمت كطرق زراعية وفي وقت الفيضان تملأ الأحواض بالمياه ثم تنحسر عنها بعد أن تترك عليها طبقة من طمي النيل الخصب<sup>١</sup>. ولنظام الري الحوضي مزايا كثيرة منها راحة

<sup>١</sup> ب. س. جزار: الأحوال الزراعية في القطر المصري في أثناء حملة نابليون بونابرت. قام بتعريب هذا الجزء من كتاب وصف مصر كل من يوسف نحاس وخليل مطران تحت اشراف الجمعية الزراعية المصرية وقد نشر ١٩٤٢ - ص ١٠٦-١٠٧.

الأرض مدة الشراقي<sup>١</sup>، فيبعد أن يجمع المحصول في إبريل أو مايو تترك الأرض بدون زراعة حتى تغمرها مياه الفيضان من جديد. وأثناء فترة الشراقي التي تسبق الفيضان تجف الأرض فتتشقق وتتسرب إلى باطنها أشعة الشمس مما يؤدي إلى إرتفاع الأملاح إلى السطح بفعل الجاذبية الشعرية حتى إذا ما جاء الفيضان التالي غسل هذه الأملاح وجدد خصوبة التربة وهكذا كانت الأرض دائمة الخصوبة قليلة الأملاح<sup>٢</sup>. كما أن نظام ري الحياض أعطى فرصة لنوع من الهجرة الداخلية إلى مناطق الري الدائم قرب مجرى النهر وذلك لتطهير الترع وتجفيف المستنقعات وجبي المحصول والعمل في البناء والصناعة وغير ذلك. وقد كانت الأراضي العالية تررع أثناء الفيضانات العالية فقط، أما الأراضي المجاورة للترع فكانت تررع على مدار السنة.

ومنذ أوائل القرن التاسع عشر ظهرت غلات جديدة كالقطن وقصب السكر مما أدى إلى تنفيذ سياسة مائية جديدة استمر العمل بها حتى الوقت الحاضر. وترمي هذه السياسة إلى ضبط ماء النيل وادخال نظام الري الدائم ليحل محل نظام ري الحياض الذي عرفته مصر منذ أن عرفت الزراعة. وقد أمر محمد علي في ذلك الوقت بحفر ترع السرساوية والبالجورية والنعاينة وتطهير بحر شبين في وسط الدلتا، ثم انتشرت الترع بعد ذلك في معظم جهات الدلتا الأخرى<sup>٣</sup>. وكانت تعمق الترع في وقت التحاريق إلى منسوب يسمح بدخول المياه المنخفضة، أما عملية تطهير هذه الترع فكانت تتم وفقا لنظام السخرة. ولاشك أن ادخال زراعة القطن والمحصولات الجديدة الصيفية الأخرى ابرز شدة الحاجة إلى تطهير الترع وتعميقها مما أدى إلى إستخدام آلاف من العمال وتكليف

<sup>١</sup> محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي - من منشورات الجامعة الليبية - بنغازي - الطبعة الأولى ١٩٧٢ - ص ١٥٨ وما بعدها.

<sup>٢</sup> ماكينزي تيلور وشلي بيرنز: النشرة الفنية رقم ٢٥ عن أساس الفلاحة المصرية وعلاقته بنقص متوسط محصول القطن من القطر - وزارة الزراعة - تعريب عبدالعزيز نصار - ص ١٥٦.

<sup>٣</sup> أ- الياس الأيوبي: تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل المجلد الأول ص ٧٠ وما بعدها.

ب- خريطة ترع الدلتا كما وضعها لينان دي بلقور سنة ١٨٥٨ من محفوظات الجمعية الجغرافية بالقاهرة. النسخة الفرنسية

الخزانة نفقات كثيرة. لذلك اتجه التفكير إلى إنشاء القناطر الخيرية التي تعتبر النواة الأولى لمشروعات الري المختلفة في مصر<sup>١</sup>.

ويظهر هذه المحصولات الجديدة حدث هذا الإنقلاب الكبير في نظام الري كما ظهرت الدورة الزراعية الثنائية. وكانت تنتشر في الدلتا والوادي هذه الدورة الثنائية التي من أبرز عيوبها أن فترة الشراقي قصيرة قلما تعطى الأرض الفرصة المناسبة للراحة وتجديد خصوبتها. كما أن هذه الفترة القصيرة من الشراقي لا تظهر إلا في السنة الثانية من الدورة كما يبدو ذلك من التوزيع الآتي:

نوع المحصول	المدة
قطن	من فبراير إلى أكتوبر
قمح أو برسيم	من نوفمبر إلى مايو
شراقي <sup>٢</sup>	من مايو إلى يوليو
زرة	من أغسطس إلى نوفمبر
برسيم	من نوفمبر إلى ديسمبر

وهكذا مهدت عوامل أسامية مختلفة منها إنتشار الدورة الزراعية الثنائية ونظام الري بالراحة تخفيفاً للمجهود البشري مع عدم اتباع نظام دقيق للصرف إلى رفع مستوى الماء الباطني في كثير من المناطق ولاسيما النطاق الشمالي للدلتا الذي يعرف بالأراضي الخنفة. ولقد ساعدت هذه المياه الباطنية على تخفيض درجة حرارة باطن الأرض والحاق الضرر بكثير من الغلات ولاسيما القطن.

وإزاء هذه المشكلات إتجهت السياسة المائية والزراعية الحديثة إلى خلق نوع من التوازن بين نظامي الري والصرف، مع العناية بتشجيع الدورة الزراعية الثلاثية، لما لها من مزايا عديدة في التنمية الزراعية. ويمكن أن نلخص الأهداف الرئيسية لهذه السياسة على النحو الآتي:

<sup>١</sup> Linant de Bellefonds: Principaux Travaux d'utilite Publique en

Egypte. Paris 1873, P. 341-381.

<sup>٢</sup> الفترة التي تترك فيها الأرض بدون زراعة للراحة.

يراعى في مشروعات الري المستقبلية أن تكون الترع عميقة بحيث يكون مستوى الأراضي الزراعية أعلى من مستوى الماء في الترع بما لا يقل عن متر ونصف متر في زمن الفيضان. وأن هذا المبدأ سيؤدي إلى تخفيض مستوى الماء الأرضي<sup>١</sup> إلى عمق متر ونصف على الأقل، وهو عمق يسمح بنمو معظم الغلات الزراعية بنجاح، كما أن فيه خير وقاية لخصوبة التربة. ويشجع مثل هذا المشروع الإهتمام باستخدام الآلات الرافعة التي ستعلم الزراع الإقتصاد في إستهلاك المياه، وأنه من الصعب تغيير نظام الترع الحالية المرتفعة المنسوب إذ أن هذا العمل يتطلب خفض القناطر الحالية. غير أنه لوقاية الأراضي الواقعة على جانبي هذه الترع، ويمكن أن تحفر مصارف موازية لها، يتراوح عمقها بين مترين ومترين ونصف على طول إمتداد الأراضي التي لحقها الضرر. ويؤدي هذا إلى خفض مستوى الماء الباطني تدريجيا.

ولقد تأثرت بعض أراضي جنوب الدلتا بارتفاع مستوى المياه الباطني، مما أدى إلى ظهور بعض بقاع ملحية وشدة تماسك ذرات التربة، ومثل هذه الأراضي في حاجة ماسة إلى إصلاح سريع حتى يعود إليها ما أشتهرت به من خصب قديم.

هذا ويتجه الإهتمام أيضا إلى تعميق المصارف الرئيسية إلى مترين ونصف متر عن سطح الأرض المجاورة، وكذلك تعمق المصارف المحلية، وذلك حتى ينخفض مستوى الماء الباطني بحيث يصبح الأرض صالحة للزراعة ولا سيما في المناطق التي تأثرت كثيرا بالمياه الأرضية.

وتهتم هذه السياسة أيضا بدقة الإشراف على المقننات المائية، فال معروف أن النيل يمثل المصدر الرئيسي للري في الوادي المصري ودلتاه، ويبلغ المتوسط السنوي للتصريف النهري في مصر في نصف القرن الماضي ٩٢ مليار متر مكعب في السنة.



وتستغل مصر من هذا المقدار نحو ٥٨ مليار متر مكعب، أما الباقي وهو ٣٤ مليار متر مكعب فيضيع في البحر المتوسط أثناء الفيضان وذلك قبل مشروع السد العالي. وخلاصة القول أن كميات كبيرة من المياه تفقد سنويا دون أن يستفاد بها في أغراض الزراعة. ويوضح الجدول الآتي الكميات<sup>١</sup>:

٣٤ مليار متر مكعب	أولا: يفقد من مياه الفيضان
٢٠ مليار متر مكعب	ثانيا: يفقد من مياه حوض النيل الأعلى
١٠ مليارات متر مكعب	ثالثا: يفقد من مياه المقننات المائية
١٥ مليار متر مكعب	رابعا: يفقد من مياه الصرف
١٠ مليارات متر مكعب	خامسا: يفقد من المياه الجوفية
٨٩ مليار متر مكعب	المجموع

وإذا وفرت هذه الكمية الكبيرة من المياه، وذلك بطرق المحافظة والمشاريع المختلفة، أمكن زراعة ١٢ مليون فدان تضاف إلى المساحة المزروعة حاليا، وهي نحو ستة ملايين من الأفدنة، فيصل مجموع المساحة المزروعة إلى ١٨ مليون فدان.

ثانيا:

تشجيع استخدام دورة ثلاثية ويمثلها الجدول الآتي:

السنة	المحصول	العمدة
السنة الأولى	من نوفمبر إلى مارس من مارس إلى أكتوبر	برسيم قطن
السنة الثانية	من نوفمبر إلى يونيو من يوليو إلى سبتمبر	خضر شراقي

<sup>١</sup> مصطفى الجبلي: مستقبل التوسع الزراعي في مصر - مجلة المهندسين - فبراير ١٩٥١ ص ٤٣.

السنة	المحصول	المدة
السنة الثالثة	من أكتوبر إلى مايو من مايو إلى يونيو من يونيو إلى أكتوبر	حبوب شتوية شرافي ذرة

ولهذه الدورة الثلاثية مزايا عديدة يمكن أن نلخصها على النحو الآتي:

- ١- تبلغ مساحة الحاصلات البقولية في الدورة الثلاثية نحو ثلث المساحة الإجمالية بينما تبلغ الربع أو أقل في الدورة الثنائية ولا شك أن الحاصلات البقولية أثرا كبيرا في زيادة الأزوت في التربة، وزيادة مساحتها في الدورة الثلاثية معناه زيادة خصب التربة من هذا العنصر الهام الذي تفقر اليه.
- ٢- وإذا كانت تربة الوادي والدلتا ترجع في تكوينها إلى أصل واحد هو طمي النيل، غير أنها تختلف في نظام تركيبها من جهة لأخرى بسبب أثر الظروف المحلية كنظام الإرساب وذبذبة فروع الدلتا وظهور بعض الترع الحديثة وإنتشار نظام الري الدائم. فالترية الصفراء التي تبلغ نسبة الصلصال فيها حوالي ٣٠٪ والباقي مواد رملية، تظهر على جوانب الترع والمجاري القديمة نتيجة لطبيعة الإرساب. وتمثل التربة السوداء معظم تربة الوادي والدلتا. وتبلغ نسبة الصلصال فيها أكثر من ٦٠٪، وهي تربة متماسكة وتحفظ برطوبتها مدة طويلة. وهذه التربة بأقسامها المختلفة فقيرة في عناصرها العضوية ولاسيما كما يبدو من الجدول الآتي:

٠,٥٣	حامض الكربونيك	٠,٧٣	بوتاسا
٠,٥٧	أكسيد المنجنيز	٠,٢٥	صودا
٣,٠٧	أكسيد الحديد	٢٥,٥٦	جير
٢,٦٨	مواد عضوية	٨,٨٢	مغنيسيا
٠,٢٥	مواد غير ذائبة	٥٧,٥٤	جامض الفسفوريك
	ورمال		
١٠٠			المجموع =

وهكذا تبدو أهمية الدورة الثلاثية في تعويض هذا النقص في المواد العضوية عن طريق التوسع في زراعة الحاصلات البقولية.

٣- تخلو الأراضي عادة من الحاصلات الشتوية في شهر مايو وتبقى خالية من الزرع بعض الوقت ونظرا لشدة الحرارة في هذا الوقت يحدث بالتربة شقوق متسعة تعيد كثيرا في تهوية التربة. ولا شك أن هذه الحرارة التي تتخلل التربة تعيد إليها نشاطها. ولما كانت مساحة الحاصلات الشتوية في الدورة الثلاثية أكبر منها في الدورة الثنائية فإن مساحة الشراقي تكون في الدورة الثلاثية أكبر تبعا لذلك فتعظم الفائدة.

٤- يلاحظ أن كلا من القطن والأرز يحتاج إلى تكرار الري في شهور الصيف الحارة. ولا شك أن زيادة مساحته في الدورة الثنائية تكون من أسباب عجز الماء صيفا مما يؤثر على الأخص في الزراعات الواقعة عند نهايات الترعة.

٥- تؤثر الريات المتوالية في ارتفاع منسوب الماء الباطني مما يؤثر في نمو النبات. ولا شك أن اطالة فترات الشراقي كما هو الحال في الدورة الثلاثية تساعد على تخفيض مستوى الماء الباطني وسهولة الصرف. هذا وتهتم الهيئات المسؤولة في الوقت الحاضر بالعمل على تخفيض مستوى الماء الباطني وذلك بالتوسع في حفر شبكة المصارف ومحطات الصرف.

وتبدو مشكلة ارتفاع مستوى الماء الباطني أكثر وضوحا في النطاق الشمالي من الدلتا حيث الأراضي الغدقة ذات التربة الرسوبية التي ارتفعت فيها نسبة الأملاح. ويظهر أحيانا غطاء نباتي من الحشائش والأعشاب المحلية. ويحدد نوع النبات الأملاح الموجودة<sup>١</sup>. هذا وقد ارتفعت نسبة الأملاح في هذه الأراضي لعوامل منها قرب هذه الأراضي من البحيرات المجاورة؛ وضعف الإحتدار مما يسهل إنتشار المستنقعات في وقت الفيضان، وإنتشار الدورة الثنائية في بعض

١- مصطفى الجبلي: الزراعة والأراضي والري في شبه جزيرة سيناء - الموسم الثقافي لجامعة الإسكندرية - ١٩٥٧ - ص ٢٠.

ب- محمد إبراهيم حسن: دراسة في تغير فروع النيل في الدلتا - مجلة البحوث الزراعية بجامعة الإسكندرية - المجلد السابع ١٩٥٩ - ص ٢٧ وما بعدها.

جهاتها. هذا فضلا عن عامل الهبوط الذي حدث في العصور التاريخية والذي ساهم في زيادة مساحة البحيرات والمستنقعات وتجلت هذه الظاهرة خاصة في بحيرة المنزلة بكثرة جزرها وآثار البلاد التي كانت مزدهرة قديما وأصبحت الآن داخل حدود البحيرة أو ما حولها من المستنقعات.

وهذه الظاهرة نذكرنا بأهوار جنوب العراق ومستنقعات جنوب السودان.

٦- تمتاز الدورة الثلاثية بزيادة مساحة ما يزرع من حاصلات العلف مما يساعد على نمو الثروة الحيوانية وما يتبعه من زيادة في كميات الأسمدة التي تسهم في زيادة خصوبة التربة وارتفاع متوسط إنتاج القدان.

وتهدف السياسة الحيوانية الحديثة إلى تشجيع إنتشار الدورة الثلاثية لما يترتب على إنتشارها من زيادة كبيرة في حاصلات العلف ونمو الثروة الحيوانية، إذ إن القطر فقير في ثروته الحوانية مما أدى إلى إستيراد كميات كبيرة من الماشية واللحوم المحفوظة والألبان المحفوظة وغيرها من مواد الصناعات الحيوانية.

ويبدو من دراسة الجداول الخاصة بالواردات من الحيوانات الحية ومنتجاتها أن البلاد تستورد قدرا كبيرا من الحيوانات والمنتجات الحيوانية. ومن الأفضل أن توفر هذه المبالغ بدلا من إنفاقها في شراء مواد إستهلاكية يمكن أن يعوض معظمها محليا. وتشجيع الثروة الحيوانية سيؤدي بطبيعة الحال إلى تغطية الإستهلاك المحلي من ناحية ووجود فائض للتصدير إلى الخارج ولاسيما إلى بعض أجزاء الوطن العربي الكبير من ناحية أخرى.

وترتفع نسبة الأملاح في تربة الأطراف الشمالية من الدلتا ومنخفض القيوم لضعف انحدارها ولقربها من مسطحات ملحية تتمثل في البحيرات الشمالية وبحيرة قارون وما حولها من مستنقعات. وبعد أن تجف هذه المستنقعات تترك خلفها بقايا ملحية تضر التربة وتقلل من خصبها، ولذلك تغسل هذه التربة جيدا قبل أن تستغل في الزراعة. وتتركز في هذه الأراضي زراعة الأرز الذي يمثل غلة رئيسية في الدورة الزراعية.

هذا، والإرتباط وثيق بين التسميد ومتوسط إنتاج الفدان في الدورة الزراعية كما يبدو من الجدول الآتي:

الغلة	متوسط إنتاج الفدان				
	١٩٣٩	١٩٤٥	١٩٤٧	٦٠/٥٤	٩٣/٩٢
القمح (بالأردب)	٦,١٥	٤,٧٩	٤,٢٧	٦,٤٢	١٤,٧٢
الذرة الشامي (بالأردب)	٧,٠٣	٦,٤٦	٦,٢١	٦,٤٥	١٨,٤٢
الأرز (بالضريبة)	١,٧٤	١,٤٥	١,٧٤	١,٩٧	٣,٤ طن

ومن هذا الجدول يتضح أن متوسط إنتاج الفدان قد هبط كثيرا أثناء فترة الحرب الثانية لصعوبة إستيراد الأسمدة، ثم بدأ متوسط الإنتاج يتحسن بعد ذلك نتيجة للتوسع في إنتاج الأسمدة محليا وإستيرادها من الخارج. فضلا عن التوسع في التقنية الحديثة.

والإرتباط وثيق أيضا بين متوسط إنتاج الفدان وتتابع المحاصيل في الدورة الزراعية. فالقمح يزرع عقب بور بعد شتوي أو بعد قطن وفي الحالة الأولى تقل حاجة القمح للتسميد ومعظم المساحة القمحية تزرع بعد القطن. وبإقي المساحة تزرع بعد ذرة رفيعة صيفية أو ذرة شامية نيلية أو رفيعة ويوجد القمح بعد الأولى عن الثانية كما قد يزرع جزء منه بعد الحشرا<sup>١</sup> وأقل محصول من القمح ينتج من زراعته بعد ذرة نيلية لعدة أسباب منها:

- ١- التأخير في الزراعة إذ تكون عادة في أوائل ديسمبر.
- ٢- ضيق الوقت مما يؤدي إلى عدم إتقان تجهيز الأرض رغم تماسكها وكثرة الحشائش بها.

<sup>١</sup> أحمد إسماعيل عبدالرؤف: القمح في مصر . من أبحاث تحسين أصنافه وزيادة إنتاجه . وزارة الزراعة - الصحيفة الزراعية الشهرية . أكتوبر ١٩٥٣ . ص ٦٠٥.

### ٣- فقر التربة في الغذاء الأزوتي بعد الذرة النيلية.

كما يلاحظ أيضا أن الزراعة المتأخرة للمح في شمال الدلتا كثيرا ما تتعرض للإصابة الشديدة بمرض الصدأ.

ووفقا لبرنامج التوسع الزراعي في شمال الدلتا ومديرية التحرير فسيتم استثمار ٣٧٥ ألف فدان في مناطق مختلفة منها أراضي رملية وأراضي طينية ملحية ووضعت الدورات الزراعية بحيث لوحظ جيدا نوع التربة وتتابع المحاصيل.

وليست كل الأراضي في الدلتا والوادي تمثل تربة طينية خصبة، إذ تظهر بها بقاع من التربة الرملية الفقيرة فتوجد جزيرتان رمليتان بين قليوب وبينها وواحدة جنوب قاقوس، وخمس في جنوب السنبلوين، وأربع حول قويسنا بالمنوفية وتتكون هذه الجزر من الرمال والحصى وبعض المواد الجيرية المفتتة، وتمثل الأجزاء الصلبة المتماسكة البارزة من الرواسب الرملية التي تنتشر أسفل رواسب الدلتا الطينية. ويمكن استثمار هذه الجهات إذا توفرت مياه النيل اللازمة وإذا جلب بعض الطمي الخصب من الجهات المجاورة لمزجه بالطبقة الرملية السطحية وتستخدم في هذه الجهات دورة زراعية ثلاثية من أهم حاصلاتها الخضراوات وبعض الفاكهة وكذلك الموالح وأشجار المانجو. ولا شك أن أي توسع زراعي في هذه الجهات سيعتمد على توفير مياه الري النيلية.

والخلاصة أن النيل هو الذي خلق الدورة الزراعية الأولى في هذه البلاد فكان ولا يزال فيفيض في أواخر الصيف وأوائل الخريف فيغذي التربة بالماء والغرين، ثم ينحسر عنها في وقت ملائم لزراعة المحاصيل الشتوية من قمح وشعير ثم يسقط مطر الشتاء فيغذيها حتى نهاية موسم نموها وحلول فصل الحصاد في أواخر الربيع. وعندما يتوقف الفلاح عن الزراعة في الصيف في وقت لم يعرف فيه نظام الري الدائم تشقق أشعة

١ خريطة الجزر الرملية المرفقة بهذا البحث: محمد إبراهيم حسن: الزراعة والتوسع الزراعي في الجمهورية العربية المتحدة - من مطبوعات جامعة الدول العربية - معهد الدراسات العربية العالية - ١٩٦٢ - امام ص ٥٠.

الشمس الحارة سطح التربة فتسمح بنفاذ الهواء إليها وتغذيتها بعناصرها المفيدة وتطهرها من الآفات. وهكذا يتجلى مبلغ تعاون عناصر البيئة المختلفة من تربة خصبة ونظام جريان الماء والمناخ. وهكذا ظهرت الدورة الزراعية الأولى منذ أقدم العصور واستمرت حتى أواسط القرن الماضي حيث ظهرت غلات جديدة كالقطن وقصب السكر مما أدى إلى ادخال نظام الري الدائم ليحل محل ري الحياض الذي عرفته مصر منذ أن عرفت الزراعة.

ويظهر هذه المحصولات الجديدة حدث هذا الإقلاّب الكبير في نظام الري، كما ظهرت الدورة الزراعية الثلاثية التي من أبرز عيوبها أن فترة الشراقي قصيرة قلما تعطى الأرض الفرصة المناسبة للراحة وتجديد خصوبتها كما أن هذه الفترة القصيرة من الشراقي لا تظهر إلا في السنة الثانية من الدورة وترتب على ذلك رفع مستوى الماء الباطني وضعف التربة في كثير من المناطق.

ولإزاء هذه المشكلات إتجهت السياسة المائية والزراعية الحديثة إلى خلق نوع من التوازن بين نظامي الري والصرف، مع العناية بتشجيع الدورة الزراعية الثلاثية، لما لها من مزايا عديدة في التنمية الزراعية ومن أهم مزاياها:

- ١- اتساع مساحة الحاصلات البقولية في الدورة الثلاثية، مما يؤدي إلى زيادة الآزوت في التربة التي تغتفر إلى هذا العنصر الهام.
- ٢- فترة الشراقي في الدورة الثلاثية تبدو طويلة، وهي الفترة التي تترك فيها الأرض بدون زراعة للراحة فيعود إليها نشاطها وخصبها. هذا فضلا عن هبوط مستوى الماء الباطني ومهولة الصرف.
- ٣- تمتاز الدورة الثلاثية بزيادة مساحة ما يزرع من حاصلات العلف مما يساعد على نمو الثروة الحيوانية وما يتبعه من زيادة في كميات الأسمدة التي تسهم في زيادة خصوبة التربة وإرتفاع متوسط إنتاج القدان.

هذا، وهناك علاقة قوية بين أنواع التربة وأنواع المحاصيل في الدورة الزراعية. فالتربة الصفراء تجود بها غلات كثيرة من حبوب وخضراوات وفاكهة وموالمح، والتربة السوداء هي أنسب أنواع التربة لزراعة القطن والحبوب. وترتفع نسبة الأملاح في تربة الأطراف الشمالية من الدلتا ومنخفض الفيوم لضعف انحدارها ولقربها من مسطحات ملحية تتمثل في البحيرات المجاورة، ولذلك تغسل هذه التربة جيدا قبل أن تستغل في زراعة الأرز بنوع خاص.

والإرتباط وثيق أيضا بين متوسط إنتاج القدان وتتابع المحاصيل في الدورة الزراعية، فتجود زراعة القمح مثلاً بعد بور أو قطن. وأقل محصول من القمح ينتج من زراعته بعد ذرة نيلية لأسباب منها: التأخير في الزراعة، وفقر التربة من الغذاء الأزوتي بعد الذرة النيلية.

وليست كل الأراضي في الدلتا والوادي تمثل تربة طينية خصبة، إذ تظهر بقاع من التربة الرملية الفقيرة، كما هو الحال في الجزر الرملية التي تنتشر في دلتا النيل. ويمكن استثمار هذه الجهات إذا توفرت مياه النيل اللازمة وإذا نقل إليها بعض الطمي الخصب من الجهات المجاورة لمزجه بالطبقة الرملية السطحية.

**التوسع الزراعي وحرية اختيار المحاصيل في الدورة الزراعية:**

وفي مصر فإن المزارع أصبح حراً في زراعة المحاصيل وفقاً للسعر وأن الدراسات التي قام بها قطاع الشؤون الاقتصادية بالوزارة في شأن تحديد مساحات التركيب المحصولي "للتأشير" للسنة الزراعية ١٩٦٣/١٤ توضح أن هناك زيادة في الزمام الكلي مقدارها ١٦٠ ألف فدان بنسبة ٢٠,١٪ وزيادة في المساحة المحصولية مقدارها ١٣٥ ألف فدان بنسبة ١٪، وعن قضية التركيب المحصولي والآثار الناجمة عن جعله اختيارياً على إنتاج المحاصيل الأساسية كالأرز والذرة والبقول وبنجر السكر والفاكهة والخضراوات وكذلك أثر ذلك على مصلحة المزارع والدولة. فإن التركيب المحصولي كان في الماضي إجبارياً، يتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره، أما الآن ومنذ أكثر من خمس سنوات فقد توقف ذلك، وتقوم



وزارة الزراعة بإصدار التركيب المحصولي التأشيري وهو توجيهي وغير ملزم، وترسله إلى كافة المحافظات حتى يسترشد به المزارعون، حيث أن العامل الأساسي لدى المزارع والمحدد لنوعية التركيب المحصولي هو السعر. ويعلم عنه مسبقاً.

وعلى سبيل المثال، ففي العام الحالي ٩٤/٩٣ لا توجد مشكلة في زراعة الأرز، بل إن غالبية المزارعين أتموا زراعة المشاتل، والزراعة في المكان المستديم، في المواعيد المناسبة، والسبب لأن الأرز كان ثمنه مجزياً، ولأن حرية التجارة أدت إلى تشجيع المزارعين على استمرار زراعته، بالإضافة إلى تصدير ما يزيد على ١٢٠ ألف طن أرز إلى الخارج.

أما الأذرة فإن زراعتها في العام الحالي جاءت متأخرة بعض الشيء، وذلك لأن الدولة لم تتسلم الأذرة من المزارعين بسعر ٧٠ جنيهاً للأردب فكان أن انخفض سعره إلى ٤٠ جنيهاً في أوائل الموسم مما أثر على زراعته.

بيان التركيب المحصولي التأشيري ١٩٩٤/٩٣	
المحصول	المساحة "فدان"
١ - مجموعة الحبوب:	
أ -	
الزروع الشتوية:	
القمح	١٩٠٠,٠٠٠
الشعير	٨٠,٠٠٠
ب -	
الزروع الصيفية:	
ذرة شامية صيفي ونيلي	٢١٠٠,٠٠٠
ذرة رفيعة صيفي ونيلي	٢٢٠,٠٠٠
أرز صيفي ونيلي	١٠٠٠,٠٠٠
ذرة صفراء	٣٠,٠٠٠
جملة	٥,٣٣٠,٠٠٠

بيان التركيب المحصولي التأشيرى ١٩٩٤/٩٣	
المساحة "قدان"	المحصول
	٢ - مجموعة البقوليات:
٣٥٠,٠٠٠	فول بلدى
٢٠,٠٠٠	عدس
١٥,٠٠٠	حمص
٨,٠٠٠	ترمس
١٥,٠٠٠	حلبة
٤٠٨,٠٠٠	جملة
	٣ - مجموعة الألياف:
٩٠٠,٠٠٠	قطن
٣٠,٠٠٠	كتان
٩٣٠,٠٠٠	جملة
	٤ - مجموعة البذور الزيتية:
٣٠,٠٠٠	فول سودانى
٨٠,٠٠٠	فول صويا
٥٠,٠٠٠	سمسم
٨٠,٠٠٠	عباد الشمس
٢٤٠,٠٠٠	جملة
	٥ - مجموعة المحاصيل السكرية:
٢٧٠,٠٠٠	قصب السكر
٤٠,٠٠٠	بنجر السكر
٣١٠,٠٠٠	جملة

بيان التركيب المحصولي التائيري ١٩٩٤/٩٣	
المساحة "فدان"	المحصول
	٦ - مجموعة الخضر:
٣٢٥,٠٠٠	خضر شتوية
٤٨٠,٠٠٠	خضر صيفية
١٥٠,٠٠٠	خضر نيلية
١٥٠,٠٠٠	بطاطس نيلي
١١٥٠,٠٠٠	جملة
	٧ - مجموعة الأعلاف:
١٦٩٥,٠٠٠	برسيم مستقيم
٨٠٠,٠٠٠	برسيم تحريش
٢٤٩٥,٠٠٠	جملة
٥٠,٠٠٠	٨ - البصل
٢٠,٠٠٠	٩ - الثوم
٥٦٣,٠٠٠	١٠ - الحدائق
٤٩٦,٠٠٠	١١ - محاصيل أخرى
١١٩٤٧,٠٠٠	إجمالي المساحة المحصولية

التركيب المحصولي التأشيرى	٩٤/٩٣	٩٣/٩٢
فدان	فدان	فدان
أولاً: الزمام المستهدف:		
الزمام المستهدف في الأراضي القديمة	٦,٢٦٥,٠٠٠	٦,١٥٠,٠٠٠
الزمام المستهدف في الأراضي الجديدة	١,٣٩٥,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠
الزمام الكلى	٧,٦٦٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠
ثانياً: المساحة المحصولية:		
المساحة المحصولية بالأراضي القديمة	١١,٩٤٧,٠٠٠	١١,٧٦٢,٠٠٠
المساحة المحصولية بالأراضي الجديدة	٢,١١٥,٠٠٠	٢,١٦٥,٠٠٠
قمح بالساحل الشمالى وسيناء	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
إجمالى المساحة المحصولية	١٤,٢٦٢,٠٠٠	١٤,١٢٧,٠٠٠
مما سبق يتضح أن هناك زيادة في الزمام الكلى مقدارها ١٦٠,٠٠٠ فدان (٢,١٪) وزيادة في المساحة المحصولية مقدارها ١٣٥,٠٠٠ فدان (١٪)		

جريدة الأهرام: بتاريخ ١٠/٧/١٩٩٣ ص ٢٠

**الفصل الرابع**  
**تنوع مصادر المياه بالشمال الإفريقي**  
**دراسة تحليلية**

## تنوع مصادر المياه بالشمال الافريقى

### دراسة تحليلية

#### المحتويات

(١) تنوع مصادر المياه بالشمال الليبي .

- مصادر المياه بأقليم الجبل الحضر واقليم سهل الجفارة.

- مقدمه عن مشروعات الانتاج الزراعى والرعى.

١ - مشروع سهل بنغازى الساحلى .

٢- مشروع الجبل الاخضر.

٣- مشروع ساحل درنه - طبرق.

٤- مشروع الغابات والمراعى .

(٢) مصادر المياه

أولا : مصادر المياه بأنواعها المختلفة.

ثانيا : تقسيم الاراضى تبعا لقدرتها الانتاجية.

ثالثا : مقاومة الانجراف وحفظ التربة والمياه

١ - درجة وطول الانحدار.

٢- كثافة وكمية الامطار.

٣- صفات التربة الطبيعية.

٤- طريقة الزراعة ونوع المحصول المنزوع.

(٣) مشروع النهر الليبي واقليم الجبل الاخضر

أ - استثمار مياه المشروع

ب - حقائق عن مشروع النهر العظيم

التممية الزراعية باقليم سهل الجفارة شمال غرب ليبيا

دراسة مقارنة لتنوع مصادر المياه وانماط التربة :

المياه :

١ - المياه السطحية .

٢ - المياه الجوفية.

التربة :

المشاكل الرئيسية التى تواجه الاقليم.

(٤) دراسة فى تغير فروع النيل فى الدلتا.

أهم فرع النيل فى الدلتا.

تذبذب قمم الدلتا.

(٥) الشرق الاوسط ومشكلة المياه

أولا : فى مصر.

ثانيا : فى اسرائيل وحوض الخليج العربى .

ثالثا : مستقبل الشرق الاوسط بالتعاون الاقليمى لحل مشكلة المياه.

رابعا: التلوث البحرى فى البحر المتوسط

خامساً: نظام التصرف فى جنوب السودان أثره على مصر مائياً.

## مصادر المياه بإقليم الجبل الأخضر بالشمال الليبي دراسة مقارنة مع إقليم سهل الجفارة بشمال غرب ليبيا

### مقدمة تلخص المشروعات الرئيسية للإنتاج الزراعي والرعي:

يعتبر إقليم الجبل الأخضر بالشمال الليبي من أهم الأقاليم الجغرافية في ليبيا. وتتمثل أقسامه الرئيسية في سهل بنغازي وسهل المرج وإقليم البيضاء - شحات وكذلك الإقليم الخلفي أو الداخلي. وقد تعرضت منطقة الجبل الأخضر منذ الحرب العالمية الثانية إلى تدهور مستمر في القدرة الإنتاجية فأهمل بعض المزارعين أراضيهم وهاجر البعض الآخر إلى المدن الكبيرة بحثاً عن أعمال أخرى كمصدر رئيسي للعيش مع جعل الزراعة في المرتبة الثانية من الأهمية. وكانت المزرعة القديمة لا تمثل الوحدة الاقتصادية التي تكفي لتوفير المعيشة الكريمة للأسرة.

ولقد إهتمت الثورة بالتنمية الاقتصادية للبلاد وأولت إقليم الجبل الأخضر عناية كبيرة فأسست الهيئة التنفيذية لمنطقة الجبل الأخضر والتي تضم بدورها أربعة مشروعات رئيسية:

#### ١ - مشروع سهل بنغازي الساحلي:

وينحصر هذا السهل بين الأطراف الغربية للجبل الأخضر والساحل الشرقي لخليج سرت. ويبدو في شكل مثلث رأسه في الشمال عند توكرة وقاعدته في الجنوب بين بلدي الزويتينة على الساحل وأنيتلات في الداخل. ويضيق السهل في الشمال لإقتراب الحافة الخارجية للجبل الأخضر من الساحل. ويتسع في اتجاه جنوبي إذ تبعد الحافة عن الساحل بالتدريج. وأقصى إتساع للسهل يصل إلى ٥٠ كم. والسهل يتداخل في الجنوب مع سهول خليج سرت. وتبلغ المساحة المخصصة للتنمية بنحو ٥٨ ألف هكتار.



## ٢- مشروع الجبل الأخضر:

يتمثل الجبل الأخضر في هضبة عظيمة الإتساع تبرز نحو الشمال مطلة على البحر المتوسط وهي تتكون من صخور جيرية. وتمتاز بمدرجين كبيرين. أما المدج الأول فمتوسط ارتفاعه ٣٢٠ م فوق سطح البحر وهنا يظهر سهل المرج بمساحة تصل إلى ٢٥,٠٠٠ هكتار منها ١٠,٠٠٠ هكتار هي مساحة المشروع الزراعي الذي يشمل على نحو ٢٠٠ مزرعة. والأرض هنا رسوبية عميقة ولكنها فقيرة في العناصر العضوية والنيتروجينية والفوسفورية<sup>١</sup>.

وأما المدرج الثاني فيبدأ على بعد بضعة كيلومترات جنوب المرج على ارتفاع ٥٠٠ م فوق سطح البحر وأقصى ارتفاع له يصل إلى ٨٧٦ م عند سيدي محمد الحمري إلى الشرق من سلنطة. وهنا تمتد المزارع الحديثة بين منطقتي مسه والقبه في مساحة تصل إلى ٣٩٥٣١ هكتار يصلح منها للمزارع الحديثة ١٨٨٥٠ هـ وعدد المزارع الجديدة يصل إلى ٢٧٦ مزرعة<sup>٢</sup>.

## ٣- مشروع ساحل درنة - طبرق:

ويهدف إلى إقامة مشروع زراعي متكامل يساهم في زيادة الإنتاج الوطني إلى جانب توفير الحياة الكريمة لعدد من المواطنين بالمنطقة باستصلاح نحو ١٤٨٠ هكتار وذلك باقامة سدود لحجز المياه وتغذية الخزان الجوفي مع تغذية العيون الموجودة حالياً. هذا بالإضافة إلى حماية مدينة درنة من خطر الفيضانات التي تتعرض لها بين وقت وآخر. ويقع حوض وادي درنة في شمال شرق الجمهورية. تبلغ مساحته نحو ٥٥٧ كم مربع. ويبلغ معدل سقوط الأمطار حوالي ٣٥٠ مم سنوياً يتبخر معظمها<sup>٣</sup>

<sup>١</sup> مشروع الجبل الأخضر الزراعي: منطقة مزارع - سهل المرج - ص ١ وما بعدها.

<sup>٢</sup> مشروع الخطة المتكاملة للتنمية الزراعية بمناطق الجبل الأخضر وسهل بنغازي وشرق درنة الباب الأول - ص ١ وما بعدها.

<sup>٣</sup> د. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي - من منشورات جامعة بنغازي - الطبعة الثانية - بنغازي ١٩٧٦ - ص ٣٢٤ وما بعدها.

بينما يتسرب جزء قليل إلى باطن الأرض على شكل عيون مثل الدبوسية وبو منصور وعين البلاد. ويجري جزء بسيط من مياه الأمطار مباشرة عقب سقوط الأمطار إلى مجرى وادي درنة حيث يجد طريقه إلى البحر بمعدل ٢,٢ مليون متر مكعب سنوياً. ويتضمن المشروع زراعة ١٤٨٠ هكتار مقسمة إلى ٢٧٠ مزرعة مساحة كل منها نحو ٥ هكتار.

#### ٤- مشروع الغابات والمراعي:

ويقع إلى الجنوب من المشاريع الثلاثة السابقة ويحد جنوباً بخط عرض ٣٠° وشرقاً بالحدود المصرية وغرباً بغوط سيدي يوسف وتبلغ جملة المساحة نحو مليوني هكتار يتم استثمار ٧٥,٠٠٠ هكتار منها في المرحلة الأولى مقسمة إلى ٣٠ ألف هكتار بمنطقة الخروبة وأم الغزلان، ٤٠ ألف هكتار بمنطقة المخيلي، ٥ آلاف هكتار بمنطقة غوط يوسف. ويهدف هذا المشروع إلى تنمية المراعي لتوفير المرعى الجيد طوال السنة لخلق مجتمع مستقر.

#### مصادر المياه:

أما المقومات الرئيسية للإنتاج الزراعي والرعوي في إقليم الجبل الأخضر بأقسامه المختلفة المشار إليها فتتمثل في مصادر المياه بأنواعها وكذلك درجات الأرض من حيث الخصوبة ونوع التربة.

المقومات الرئيسية للإنتاج الزراعي والرعوي  
ممثلة في مصادر المياه ودرجات الأراضي:  
أولاً: مصادر المياه بأنواعها المختلفة:  
١- سهل بنغازي:

يتضمن سهل بنغازي الذي يمتد من سلوق جنوباً إلى بنغازي غرباً ثم توكره في الشمال الشرقي وينتهي بالجبل شرقاً، يتضمن هذا السهل ثلاثة مصادر للمياه:

- أ- الخزان الرئيسي: ويقع في المثلث الذي يحده الجبل شرقا والبحر شمالا وغربا وخط يمتد عرضا من الجبل إلى بتغازي جنوبا، هذا الخزان يتكون من تجاويف وشقوق تكونت في العصر الميوسيني، وهذا الخزان يمكن أن يعطي من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ لتر/ثانية ولكن يجب اختيار مواقع الآبار بعيدا عن البحر لمنع تداخل مياه البحر. وتبلغ سمك الطبقات الحاملة للمياه من ٥٠ إلى ٦٠ مترا وعمق المياه بها من ٢٠ إلى ١٠٠ متر تحت سطح الأرض.
- ب- منطقة النواقيع / سلوق: تقع هذه المنطقة جنوب الخزان الرئيسي وإحتمالات المياه الجوفية بها ضئيلة.
- ج- الكتبان الرملية الساحلية: توجد تجمعات مائية داخل الكتبان الرملية الواقعة على الساحل بكميات محدودة جدا ولا يعول عليها. وتمتد الكتبان كاشرطة متوازية أمام الساحل. وتتكون من صخور جيرية ورملية متماسكة وقطعت بالأودية الجافة.

## ٢- سهل المرج:

ويتميز سهل المرج تبعا لتركيبه الجيولوجي بوجود ثلاث طبقات حاملة للمياه:

- أ- الطبقة الأولى: وهي الترسبات الطينية والطينية التابعة للزمن الرابع (قاع السهل) وهي قليلة العمق والمياه توجد بها بكميات قليلة ونسبة الأملاح بها مرتفعة (تبلغ ٨٠٠٠) جزء في المليون ولذلك لا ينصح باستغلالها.
- ب- الطبقة الثانية: وهي ترسيبات العصر البليوسيني (أواخر الزمن الثالث) (طفل / زلط / رمل) ويتراوح عمق هذه الطبقة من ٢٥ إلى ٩٠ متر وكمية المياه بهذه الطبقة محدودة كما أن نسبة الملوحة بها مرتفعة نسبيا تتراوح من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جزء في المليون. وهي طبقة معتدلة التماسك وبها شقوق وتجاويف داخلية.
- ج- الطبقة الثالثة: وتمتد إلى عمق ٢٠٠ إلى ٥٠٠ متر وهي من ترسيبات الحجر الجيري الطباشيري من العصر الأيوسيني وهي الطبقة الأساسية الحاملة للمياه ويتراوح سمكها من ٢٠٠ إلى ٢٥٠

وملوحة المياه لا تزيد عن ١٠٠٠ جزء في المليون ويتراوح عمق المياه بها من ١٠٠ إلى ٢٢٠ متر في انحدار معتدل.

ويقدر المخزون المائي في الطبقة الثانية والثالثة المحتمل الحصول عليه من ١٥٠ إلى ٣٠٠ لتر/ثانية إلا أنه قد لوحظ أن مستوى الماء الأرضي في الخزان الثاني يتناقص مما يحتم ضرورة تنظيم الضخ والتحكم في الكميات التي تسحب على مستوى المنطقة كلها لإمكان الإستمرار في إستغلال هذا الخزان بأمان.

### ٣- سهل الأبيار:

توجد المياه في هذا السهل في طبقتين متميزتين من ترسيبات الأوليجوسين والميوسين.

- أ- الطبقة الأولى: عمق المياه بهذه الطبقة يتراوح بين ٨٠، ١٢٠ متراً وهذه الطبقة تتميز بوفرة ما بها من ماء وبقلة تكلفة الضخ نظراً لقرب الماء من سطح الأرض وتعتبر المنطقة الواقعة شرقي طريق الرجمة / الأبيار أنسب الأماكن لضخ المياه من هذه الطبقة.
- ب- الطبقة الثانية: من ترسيب العصر الأيوسيني وعمق المياه بهذه الطبقة يتراوح من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ متر ويقدر المخزون المائي في هاتين الطبقتين بحوالي ٢٠٠ إلى ٥٠٠ لتر في الثانية. ومن المعتقد أن هناك علاقة بين المياه الجوفية في كل من سهل بنغازي وسهلي المرج والأبيار ولذلك أعطيت هذه التقديرات بحرص حتى لا يتأثر الخزان المائي في سهل بنغازي في حالة ما إذا توسعنا في ضخ مياه سهل الأبيار.

### ٤- منطقة الهضبة الوسطى في الجبل الأخضر:

هذه المنطقة تشمل الهضبة الوسطى والشريط الساحلي بما في ذلك مناطق الوسيطة والحنية حتى رأس الهلال. وهي منطقة وعرة معقدة

تضاريسيا إذ تبدو المنحدرات شديدة الإتحدار في مدرجات ضيقة على طول الشقوق والإتكسارات.

وتوجد المياه في طبقات العصر الأيوسيني على أعماق تتراوح ما بين ١٥٠ إلى ٢٥٠ متر والدراسات توحي بإحتمالات أكبر للمياه الجوفية خاصة في هضبة الوسيطة والمياه ليست مالحة ويقدر المخزون في هذه الطبقات الذي يمكن سحبه بحوالي من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ لتر/ثانية. أما في باقي مناطق الجبل وحتى درنة فيوجد في طبقات الإليجوسين مجموعة من العيون التي سنتناولها بالتفصيل فيما بعد.

وللوصول إلى مصادر المياه الجوفية يلزم الحفر إلى أعماق كبيرة من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ متر ولا يتوقع الحصول إلا على كميات ضئيلة من المياه.

#### ٥- المنطقة من درنة إلى عين الغزالة:

في الشريط الساحلي وحتى جنوب مرتوية إحتمالات وجود المياه بكميات ضئيلة وحدث تداخل مياه البحر قائم دائما.

أما في الجزء العلوي من وادي درنة ووادي الملق فإن طبقات الإليجوسين والميوسين توجد بها كميات مشجعة من المياه وفي بعض المناطق تبدو طبقات الأيوسين كمصدر آخر للمياه الجوفية ولكن المياه في هذه المنطقة عموما توجد على أعماق كبيرة من ١٥٠ إلى ٣٠٠ متر ويقدر المخزون في هذه الطبقات بحوالي من ٣٠٠ إلى ١٠٠٠ لتر/ث.

#### ٦- مياه العيون بمنطقة الجبل وينغاري:

بعض تجمعات المياه الجوفية تجد طريقها إلى سطح الأرض خلال الكهوف أو الكسور فتخرج على هيئة عيون وتوجد في المنطقة مجموعة كبيرة من العيون تتباين في طبيعتها وفي كمية المياه التي تنتجها.

## أ- سهل بنغازي:

يوجد به عين رئيسية تصب في البحر وهي عين زيانة وعين كهف الكوفية. ومن المعتقد طبقاً للدراسات الحديثة أن هناك مجرى مائي جوفي كبير ربما له أكثر من فرع في تلك المنطقة وهذا المجرى المائي هو الذي يغذي عين زيانة وعين الكوفية وهو مصدر المياه في الفويهات وسيدي منصور. وهذا المجرى المائي يتبع التشققات التي تنتشر في شبكة كبيرة بالإقليم. وهذه التشققات جاءت كرد فعل لحركة الرفع التدريجي التي أصابت الإقليم بفعل تحرك النظام الألباني في حوض البحر المتوسط منذ عصر الأيوسين بأوائل الزمن الثالث.

وتضخ حالياً كمية مياه من مصدر بنينة تبلغ حوالي ٢٠٠ لتر/ث لتغذية مدينة بنغازي بمياه الشرب وقد لوحظ أن نسبة الملوحة بها تتزايد باستمرار السحب ويجري حالياً تنفيذ مشروع ضخ المياه من سيدي منصور لتغذية مدينة بنغازي وقد قامت شركة جيغلي بقياس تصرف عين زيانة وقدرت هذا التصرف بحوالي ١,٢م مكعب/ثانية في شهر مارس ويرتفع إلى حوالي ٥م مكعب/ث في شهر أغسطس ونوعية المياه مالحة من ١٢,٠٠٠ إلى ١٥,٠٠٠ جزء في المليون عند المصب في البحر. ويعتقد أن تصرف العين يزداد في الصيف حين تصل مياه الأمطار المغذية للمجرى المائي التي تسقط في مناطق بعيدة في موسم الشتاء.

## ب- الجبل الأخضر:

توجد عدة عيون يمكن تفصيلها كما يلي:

١- عين الدبوسية: وتعطي التغذية الرئيسية لخط مياه الشرب لمدينة البيضاء والمرج وبعض المدن الصغيرة وصمم الخط على أساس أن تصرف العين ٢٢٠ لتر/ث. وبالنظر إلى تناقص تصرف العين يرجح أن هذا النقص يرجع بصفة أساسية إلى وجود فاقد في داخل العين وليس فقط بسبب هبوط المتوسط العام لسقوط الأمطار في المنطقة في

السنين الأخيرة. كما أنه لوحظ حالياً أن المياه لا تكفي لإحتياجات الشرب في مدينة البيضاء والمرج وهذا يرجع إلى عدة أسباب منها:

- ١- أن كميات من المياه تقدر بحوالي من ٢٥ إلى ٣٠ لتر/ث تسحب من الخط في بدايته مما يسبب نقص التصريف وهبوط الضغط اللازم على الخزانات.
- ٢- وقد تكون هناك زيادة في الإستهلاك لري الحدائق حول المنازل أو لإستعمالها في أغراض أخرى.
- ٣- وقد تكون ساعات تشغيل الطلمبات غير كافية.

وترى جيفلي أنه يمكن زيادة تصرف العين بمقدار من ٢٥ إلى ٥٠٪ من تصرفها الحالي وتحدد كمية الضخ ويحدد المكان المناسب لتكوين الطلمبات الإضافية لسحب هذه المياه وفقاً للدراسات. ويقدر تصرف العين في هذه الحالة بحوالي ٣٠٠ لتر/ث بفرض زيادته ٥٠٪.

- ٢- عين ستيوه: تصرفها يقدر بحوالي ٢٣ لتر/ث وهي غير مستغلة حالياً الإستغلال اللازم.
- ٣- عين مسه: يقدر تصرفها بحوالي ٢٠ لتر/ث تستغل جزء بسيط منها في الزراعة.
- ٤- مجموعة عيون في هضبة الوسيطة: وعددها (٧٢) عينا متناثرة ما بين مسه شرقاً وعين ستيوه غرباً منها (٤٠) عين تصب طوال السنة ومجموع تصرفها ٢٢ لتر/ث والباقي يجف في فترة الصيف والعيون الدائمة غير مستغلة إستغلالاً تاماً حالياً.
- ٥- عين رأس الهلال: تصرفها ٩ لترات/ث وموقعها بعيد ويجري إستغلالها في زراعة مساحات صغيرة بالموقع.
- ٦- عين مارة: تصرفها ٤٥ لتر/ث يستغل منها ٢٠ لتر/ث في أغراض الري.
- ٧- عين يومنصور وعين البلاد ووادي درنة: قدرت شركة هيدروبروجكت تصرفها بحوالي ٥٨٠ لتر/ث يستغل منها حوالي ١٥٠ لتر/ث لأغراض الشرب في مدينتي درنة وطبرق وكذلك لري

بعض المساحات المجاورة وهناك دراسة قدمتها هيدروبروجكت لإستغلال المياه الفائضة في مشروع زراعي تحت الري بمنطقة الفتايح. ومشروع الفتايح ضمن الإصلاح الزراعي وقد تم مسح شامل لعيون وادي درنة وروافده وفقا للخريطة المرفقة.

#### ٧- التوزيع الجغرافي للمياه الجارية السطحية:

تقدر مساحة تجمع الأمطار بمنطقة الجبل الأخضر وسهل بنغازي بحوالي ٩٠٠٠ كم<sup>٢</sup> ويبلغ متوسط ما يسقط من الأمطار على هذه المساحة طول السنة حوالي ٣,٥ مليار م<sup>٣</sup>. يتبخر بعضها ويتسرب منها جزء في باطن الأرض وتستهلك النباتات جزءا آخر أما الجزء الذي لا يتسرب إلى باطن الأرض فيجري في الوديان الكثيرة وقد يجد طريقه إلى البحر. ويمكن حجز بعض هذه المياه في الوديان التي لها مناطق تجمع كبيرة وذلك باقامة سدود عليها للإستفادة من تلك المياه سواء بإستغلالها في إعادة تغذية الخزان الجوفي بدلا من ضياعها في البحر أو في إستغلالها في أعمال الري التكميلي فضلا عن حماية المدن الرئيسية التي كثيرا ما تتعرض لخطر تجمع هذه المياه الجارية عقب العواصف المطرية الشديدة وذلك لوقوعها بالقرب من مصبات هذه الوديان في البحر.

ومشروع وادي القطارة يمثل في إقامة مجموعة من السدود بغرض حماية مدينة بنغازي من الفيضانات وإعادة تغذية الخزان الجوفي. وإستخدام المياه المحجوزة خلف السد في مشروع زراعي لري حوالي ٥٠٠٠ هكتار بالمنطقة<sup>١</sup>. ومشروع وادي درنة يشمل إقامة سدين رئيسيين كما يشمل إقامة مجموعة من السدود على روافده الرئيسية. فضلا عن إقامة مشروع زراعي بمنطقة الفتايح لري ١٥٠٠ هكتار بإستغلال مياه السدود بالإضافة إلى المياه الجوفية ومياه العيون ومياه محطة مجاري درنة في أعمال الري. والمشروع يوفر الحماية لمدينة درنة من أخطار

<sup>١</sup> تقدر مساحة حوض وادي القطارة بنحو ١٣٥٠ كم<sup>٢</sup>. ويهدف المشروع إلى حجز نحو ٢٠ مليون متر مكعب سنويا بفضل سدين رئيسيين وسبعة سدود فرعية. هذا بالإضافة إلى تثبيت التربة وتقليل إنجرافها - (ص ٢٠ من كتاب معرض طرابلس الدولي مارس ١٩٧٤).



الفيضان. كما درست هيدرولوجية الوديان في المنطقة وإقترح إقامة مجموعة من السدود الصغيرة في ثلاثة مواقع من بين عشرة مواقع أجريت بها الدراسة وهذه المواقع الثلاث هي وادي زازو ووادي الخوط قرب المرج ووادي الخليج قرب درنة. وهذه السدود تخزن كمية من المياه في حدود من نصف إلى مليون م<sup>٣</sup> في السنة والتي يمكن استخدامها في الري الجزئي لمساحات صغيرة من الأرض تتراوح ما بين ١٠٠ إلى ٣٠٠ هكتار. هذا المسح الهيدرولوجي لا يزال مستمرا في باقي شبكات الأودية الجافة التي تنتشعب في كل الإقليم في اتجاهات مختلفة<sup>١</sup>.

١ - د. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط - الإسكندرية ١٩٨٩ - ص ٣٣٠ وما بعدها.  
ب- ليبيا: الأطلس التعليمي - طرابلس - ١٩٨٥ ص ٣٧، ٣٦

جدول (١) متوسط كمية الأمطار في توكره بالمليمترات

المجموع	شهور لخرى	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	ابريل	مارس	فبراير	يناير	السنة
٢٧٦,٤	٤,٩	٧٢,١	٣٣,٩	٢١,٣	٨,١	٢٣,٦	٤٠,٠	٧٢,٥	متوسط ٢٠ سنة (غير محدودة)



والأمطار توضح توزيعها الجداول السابقة التي تبرز ثلاث حقائق هامة:

- أ- منطقة شحات - البيضاء هي أغزر المناطق مطرا بمعدل يزيد على ٦٥٠ مم سنويا.
- ب- تقل الأمطار بسرعة في المناطق الخلفية بحيث يصل معدل جردس العبيد إلى أقل من ٢٥٠ مم سنويا.
- ج- أي توسع زراعي لابد أن يعتمد على استثمار الخزان الجوفي.

### ثانيا: تقسيم الأراضي تبعا لقدرتها الإنتاجية ومدى ارتباطها بتسرب المياه

من نتائج الدراسات البيدولوجية أمكن تقسيم المساحات المدروسة طبقا للعوامل التي تؤثر على الإستصلاح والإستزراع وفقا لما يلي:

#### أراضي الدرجة الأولى:

وهي الأراضي الرسوبية التي تمتاز بأنها عميقة القطاع جدا عمقا أكثر من ١٢٠ سم وطبقة سطح التربة قوامها غالبا طمي طيني رملي ناعم كتلية البناء ومتوسطة التماسك - وهي تربة غنية طينية خفيفة بناؤها عمودي واضح وتمتاز بأن قطاع تربتها ذو مسامية جيدة ومسامها متصلة وهي خالية من القطع الصخرية أو تجمعات الأملاح الضارة (نسبة كربونات الكالسيوم بها غالبا أقل من ١,٥ %) ولا توجد بها أية تجمعات جيوية هشة أو صلبة فتسرب المياه يبدو معتدلا.

#### أراضي الدرجة الثانية:

وهي أراضي رسوبية ذات تكونات مختلطة ومتوسطة العمق إذ لوحظ أن عمقها يختلف من ٨٠ إلى ١٢٠ سم وطبقة سطح التربة بها طينية بناؤها كتلي. وهي متوسطة التماسك وتتركز فوق تربة طينية، بناؤها عمودي متماسكة وذات مسامية جيدة. وقطاع تربتها مكوناته غالبا غير متناسقة تبعا لطبيعة الترسيب.

وهي تحتوي في قطاع تربتها على عامل أو أكثر من العوامل التالية التي تؤثر على قدرتها الإنتاجية:

- ١- نسبة قليلة من القطع الصخرية على سطح الأرض وكذلك بقطاع التربة.
- ٢- وجود نسبة من كربونات الكالسيوم ليست مرتفعة - غالبا ما تحتوي على التجمعات الجيرية الهشة والصلبة صغيرة ومتوسطة الحجم.
- ٣- طبقة تحت التربة شديدة التماسك متلاحمة نتيجة لإعادة ترسيب أكاسيد الحديد أو الطين أو كربونات الكالسيوم مما يؤدي إلى تجمع مائي يتطلب عمق الحرث.
- ٤- طبوغرافيتها أما مستوية أو مستوية تقريبا أي بسيطة الإتحدار.

#### أراضي الدرجة الثالثة:

وهي سهلية رسوبية متوسطة العمق وغالبا ما يظهر بها الحجر الجيري على أعماق تختلف من ٨٠-٥٠ سم وطبقة سطح التربة طميية أو طميية طينية متوسطة التماسك بناؤها كثلي ضعيف وهي تمتد فوق تربة طميية متماسكة أو شديدة التماسك متلاحمة.

ويحتوي قطاع تربتها على عامل أو أكثر من العوامل التالية التي تؤثر على قدرتها الإنتاجية:

- ١- يوجد على السطح وبقطاع تربتها نسبة متوسطة إلى مرتفعة من القطع الصخرية تصل إلى ٢٠٪.
- ٢- أراضي جيرية نسبة كربونات الكالسيوم بها مرتفعة نوعا وتحتوي على تجمعات جيرية هشة وصلبة مختلفة الأحجام بنسبة من ١٠-٢٠٪.
- ٣- طبوغرافيتها مختلفة تختلف من المناطق المستوية تقريبا إلى بسيطة التموج. وهي من بسيطة إلى متوسطة الإتحدار. وعادة لا تزيد درجة الإتحدار بها عن ٥٪ وهي متوسطة التعرية.

وقدرة التربة على الإحتفاظ بالماء ضعيفة بالنظر لقلة عمق قطاع التربة وإلى محتواها الجيري بالإضافة إلى وجود الطبقات المتلاحمة التحتية قليلة النفاذية.

وتحتاج أراضي الدرجة الثالثة إلى تكاليف مرتفعة لرفع الإنتاجية والمحافظة عليها من الإجتفاف وذلك بإجراء الحرث الكنتوري وإقامة المصاطب مع ضرورة رفع الأحجار الموجودة على سطح التربة. وهي أراضي متوسطة الصلاحية للزراعة وأنسب المحاصيل لزراعتها إما محاصيل المراعي أو أشجار التين والزيتون.

#### أراضي الدرجة الرابعة:

وهي الأراضي الضحلة جدا بسمك يقل عن ٥٠ سم وغالبا ما يظهر الحجر الجيري على السطح وتتخللها بعض المساحات الصغيرة المتوسطة العمق. وهي أراضي يصعب إستغلالها إقتصاديا. ومنها مناطق المصاطب الجيرية العادية أو المغطاة بطبقة رقيقة من التربة وكذلك الهضاب الحجرية الشديدة التمزج والإحدار وبها الكثير من المناطق المنجرفة أو شديدة الإجتفاف ولا تصلح للإستغلال الزراعي. ولذلك تصلح أراضيها لتنمية المراعي وتبلغ جملة المساحات التي يمكن إستغلالها في الوديان بحوالي ٦٠,٠٠٠ هكتار<sup>١</sup>.

#### ٣-١- مقاومة الإجتفاف وحفظ التربة والمياه:

تعرض أراضي الجبل الأخضر للتعرية بدرجات متفاوتة تبعا للنفاذ التالية:

- ١- درجة وطول الإحدار.
- ٢- كثافة وكمية الأمطار.
- ٣- صفات التربة الطبيعية.

<sup>١</sup> مختار بورو: أطلس الجمهورية العربية الليبية ص ١٧.

#### ٤- طريقة الزراعة ونوع المحصول المنزرع.

وتعريف التربة تؤدي إلى النقاط التالية:

- ١- فقد في طبقة سطح التربة وهي الطبقة الخصبة بها مما يقلل خصوبة التربة.
- ٢- فقد في المياه عن طريق الجريان السطحي.
- ٣- عدم تغذية الخزان الجوفي بالمياه كنتيجة لسرعة جريان الماء السطحي.
- ٤- غرق الوديان مما يتلف ما بها من زراعة أو مما يعطل زراعتها أصلاً حتى تتحسر المياه.
- ٥- إعاقة نظام الصرف الجوفي الموجود عن طريق غلق الشقوق بحبيبات التربة الدقيقة.

ولمقاومة الإبحراف يلزم إتباع الخطوات التالية لصيانة الأراضي والمياه بالجبل الأخضر:

- ١- الزراعة الكنتورية التي تزيد من قدرة التربة على تسرب المياه فيقل الجريان السطحي وتزيد تغذية الخزان الجوفي.
- ٢- إصلاح السدود والحواجز الرومانية القديمة وإنشاء سدود جديدة.
- ٣- فرض وإتباع دورة زراعية سليمة لا تسمح بترك الأراضي دون غطاء نباتي في موسم الأمطار.
- ٤- إقامة عمل المصاطب في الإبحادات الكبيرة.
- ٥- إتباع دورة حراثة عميقة للأراضي الزراعية.
- ٦- عمل قنوات تجميعية وتحويلية بالمنطقة وتثبيت هذه المجاري هندسياً.

وكما زادت درجة انحدار التربة كلما زاد تعرضها للإبحراف وبالتالي زيادة الجهد والتكاليف اللازمة لإقامة المصاطب. ويمكن إقامة المصاطب المستوية بنجاح في المناطق التي تصل أعلى درجة للانحدار بها إلى ١٢٪ والتي لها القدرة على تسرب كميات كبيرة من الأمطار المتساقطة عليها وذات مسامية جيدة.

## مشروع النهر الليبي وإقليم الجبل الأخضر

### أ- استثمار مياه المشروع:

إن التوسع الاقتصادي وتزايد عدد السكان خصوصاً على طول الشريط الساحلي الخصيب أدى إلى زيادة الطلب على المياه للأغراض الزراعية والصناعية والإستهلاك البشري داخل المدن والقرى، في الوقت الذي أخذ فيه المخزون المائي التقليدي ينضب عاماً بعد عام بسبب الضخ المتزايد لمد حاجة الإستهلاك. وينضوب المخزون المائي التقليدي بدأت مياه البحر تتسرب إلى الطبقات الصخرية الحاملة للماء مما أدى إلى تعكير مياه الشرب وزيادة نسبة الأملاح فيها. ومثل هذه الظاهرة تؤدي إلى تحويل الأراضي الزراعية إلى أراض مالحة سبخية لا تصلح للزراعة، وبإستمرارها تتعدم الزراعة كلياً في تلك الأراضي.

لذلك فإن مشروع النهر الصناعي العظيم خلق مصدراً جديداً وإقتصادياً للمياه العذبة ويخفف من وطأة الضخ المتزايد على الطبقات الحاملة للمياه بالمناطق الساحلية. ويتنفيذ هذا المشروع لن يظل الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية معتمداً على الآبار التقليدية بل أنها تستفيد من مياه المشروع خصوصاً وأن تكلفة نقل المياه الجوفية من الصحراء تعتبر أكثر إقتصاداً من أي مصدر آخر للمياه، إذ تتراوح تكلفة المتر المكعب من مياه المشروع ما بين ٧٠ درهماً إلى ١٦٠ درهماً بينما تتراوح نفس الكمية من مياه تحلية البحر ما بين ٣٢٠ درهماً إلى ٦٢٠ درهماً، ويمثل الفرق بين الحدين الأعلى والأدنى لكل منهما العائد الإستثماري المستعمل في إحتساب التكلفة<sup>١</sup>.

كما يساعد هذا المشروع على توفير المياه اللازمة لبعض الصناعات الهامة الواقعة على مساره خصوصاً تلك المجمعات الصناعية الكبيرة في

<sup>١</sup> إدارة مشروع النهر الليبي العظيم: تقرير عن المشروع - طرابلس ١٩٩٢ - ص ١ وما بعدها.



مدينتي البريقة ورأس لانوف، فضلا عن توفير مياه الشرب للمدن والقرى التي يمر بها.

وقد روعي أن يتم استثمار أكثر من ٨٦٪ من حجم مياه المشروع في الأغراض الزراعية حتى تتمكن البلاد من قطع شوط كبير على طريق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية، والحد من استيراد هذه المنتجات، وتحقيق أكبر قدر من الحرية الاقتصادية والأمن الغذائي. وتم التركيز في الدرجة الأولى على إنتاج الحبوب كالقمح والشعير والذرة وعلف الحيوان الذي بدوره ينمي الثروة الحيوانية المتمثلة في المواشي والأغنام وبذلك يمكن الإقلال إلى حد كبير من استيراد اللحوم والألبان ومنتجاتها التي تعتبر من العناصر الأساسية لغذاء الإنسان.

ولضمان استثمار أكبر قدر ممكن من الأراضي الزراعية لتحقيق معدلات إنتاج وصولاً إلى هذا الهدف المنشود، فقد تم وضع سياسة للتخزين الإستراتيجي للمياه باعتماد معدل ضخ ثابت طوال السنة من حقول الأبار وفقاً لما يأتي كما يبدو من خريطة المشروع المرفقة:

فقد دلت الدراسات الهيدروجيولوجية عن وجود خزانات جوفية بمناطق متناثرة أشير إليها في الخريطة المرفقة مثل مناطق الكفرة والسريـر وتازربو ووادي الشاطئ وجبل الحسانة. ولما أن إمكانيات مياه الطبقات الساحلية تبدو محدودة وقد تدهورت نوعيتها فقد اتجه الإهتمام نحو نقل المياه الجوفية من وسط وجنوب الأراضي الليبية نحو الشمال حيث تتوفر التربة الجيدة والكثافة السكانية المرتفعة وشبكات الطرق وسوق الاستهلاك وموانئ التصدير وبذلك تم التفكير في مشروع النهر الصناعي العظيم فتم نقل ٢ مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً من خزانات منخفض الكفرة والأراضي المجاورة وفقاً للمرحلة الأولى من المشروع لدعم المشروعات الصناعية والزراعية وحاجة السكان بالنطاق الشمالي. على أن ترتفع هذه الكمية إلى حوالي ٥,٥ مليون متر مكعب يومياً وفقاً لمرحلة التنفيذ الأخرى كما يبدو من أنابيب نقل المياه الموضحة بالخريطة. ووصلت هذه المياه إلى منطقتي سرت وبنغازي حيث يتكلف المتر المكعب

حوالي ١٧ سنت بالمقارنة بتكاليف المتر المكعب من مياه البحر المحلاة والتي تصل إلى نحو ٢ دولار<sup>١</sup>.

ويدل هذا الكشف المائي الجوفي على إمكانيات مائية ضخمة فحوض الكفرة والسرير وواحة تازربو في مساحة ٢٥٠ ألف كم<sup>٢</sup> تقدر مياهها بالمياه المتدفقة من نهر النيل لمدة مائتي عام. وفي الحوض الثاني بمساحة ٧٢٠ ألف كم<sup>٢</sup> (حوض مرزق) وما حوله ما يشابه الحوض الأول من المخزون المائي. ويستمر المشروع لنقل مياه الجنوب إلى إقليم طرابلس وخليج سرت ومد قناة عبر إقليم الجبل الأخضر ما بين البريقة وميناء طبرق.

تبلغ مساحة حوض الكفرة، السرير وتازربو قرابة ٢٥٠ ألف كم<sup>٢</sup> إذ ينتظر أن يحفر بها ستمائة بئر سيستعمل جزء من مياهها لتوفير المياه اللازمة للصناعة والشرب في منطقة الشريط الساحلي، أما الباقي فسيخصص لأغراض الزراعة إذ ينتظر إنتاج مليون طن من الحبوب كل سنة مع تربية وإنتاج ثلاثة ملايين رأس من الماشية<sup>٢</sup>.

وتدل الدراسات بإمكانية إستغلال ٢ مليون م<sup>٣</sup> أخرى من حقلي السرير وتازربو بالإضافة إلى ما يستغل حاليا وينتظر أن يكون الهبوط ١٠٠ متر من المستوى الحالي خلال خمسين عاما ليصبح عمق المياه ١٨٠ مترا من سطح الأرض مما يجعل ضخ المياه بتكلفة مرتفعة وقد روعي ذلك عند تقييم المشروع.

#### ب- تحقيق عن مشروع النهر العظيم<sup>٣</sup>:

في إطار الدراسات القائمة حول خزانات المياه الجوفية في صحور الحجر الرملي والمعروفة باسم الحجر الرملي النوبي توجد عدة حقائق يمكن التركيز عليها فيما يختص بمشروع النهر الصناعي العظيم:

<sup>١</sup> جمال الشرقاوي: نهر الأنابيب - القاهرة ١٩٩٠ - ص ١٢٢-١٢٥ وما بعدها.

<sup>٢</sup> مشروع النهر الصناعي العظيم: المصدر - ليبيا: الأطلس التعليمي - ص ٤٧

<sup>٣</sup> جمال الشرقاوي: نهر الأنابيب - القاهرة ١٩٩٠ - ص ١٢٢-١٢٥ وما بعدها.

### الحقيقة الأولى.

وهي أن الجزء الشرقي من ليبيا حيث توجد المناطق الجغرافية المعروفة بإسم برقة في الشمال والسرير والكفرة في الشرق يعتبر إمتدادا طبيعيا للأوضاع الجيولوجية السائدة في الصحراء الغربية في مصر، معنى هذا أن الصخور الرملية القديمة التي تنتشر في مصر كاحدى التكوينات الجيولوجية تمتد عبر الحدود في ليبيا.

### الحقيقة الثانية:

إن الحوض المائي الجوفي الذي ينسب إلى واحة الكفرة في جنوب شرق ليبيا يتبع نظاما مشابها لخزانات المياه الجوفية في الصحراء الغربية رغم وجود الكثير من التعقيدات الجيولوجية ومنها انتشار شبكات الشقوق والإتكسارات وتموج الطبقات وإحتمال وجود بعض السدود البركانية.

### الحقيقة الثالثة:

وهي أن الإستغلال غير المنظم للمياه الجوفية في الصخور الرملية القديمة في صحراء الوادي الجديد ترتب عليه حدوث هبوط حاد في مناسيب المياه الجوفية من الآبار المتدفقة (أكثر من ٢٠ متر خلال عشرين سنة) وهذا الهبوط مازال مستمرا وقد يصل إلى ١٠٠ متر مع نهاية القرن الحالي، والصورة الهيدرولوجية السائدة هي تكون مخروطات هابطة (بعضها معروف في مصر وفي ليبيا ومن المتوقع حدوث المزيد منها مع قيام الإستنزاف المتوقع في إطار مشروع النهر الصناعي العظيم في ليبيا بمعدل مليوني متر مكعب يوميا في المرحلة الأولى).

### الحقيقة الرابعة:

إن الذي يحكم إمكانيات إستغلال هذه الخزانات الجوفية سواء في مصر أو في ليبيا هو السياسات المائية السليمة في تخطيط مشروعات الإستغلال حيث يعتمد ذلك بالدرجة الأولى على إدارة وتنمية تلك الخزانات، كما

تتوقف كميات المياه المستخرجة على العائد الإقتصادي منها بالمقارنة بتكاليف الطاقة المستخدمة في الرفع، كما أن مصادر المياه الجوفية المتجددة في بعض المناطق لا يناسب كمية التعويض المطلوبة، وبالتالي فإن العوامل التي تحكم المحافظة على الخزانات الجوفية في الصحراء الغربية هي بالدرجة الأولى الإدارة السليمة لهذه الخزانات.

### الحقيقة الخامسة:

بالنسبة لحوض الكفرة والسرير وتازربو والذي تقع أجزاء منه في مصر والسودان وفي المنطقة غرب العوينات لا يوجد إتصال بالخزان الجوفي بمصر إلا عن طريق الطبقات السطحية العلوية في خزان الكفرة ومنطقة القطرون بالسودان وشرق جبل العوينات.

### الخلاصة:

- ١- يشغل حوض الكفرة مساحة كبيرة بليبيا ٢٥٠ ألف كم<sup>٢</sup> ويمتد داخل الأراضي المصرية عند حدود مصر الغربية. وصخور القاعدة الموجودة بمنطقة العوينات وإمتدادها شمالا تحت سطح الأرض تحد من الإتصال الهيدروليكي بين أحواض المياه الجوفية بالصحراء الغربية المصرية وحوض الكفرة.
- ٢- يتضح أن الإستغلال غير المنظم للمياه الجوفية في الصخور الرملية القديمة يترتب عليه حدوث هبوط حاد في مناسيب المياه الجوفية على شكل مخروط تحت حقل الإستغلال يتسع تدريجيا مع الإستغلال المستمر.
- ٣- يمكن التنبؤ بتأثير الإنخفاض في مناسيب المياه الجوفية نتيجة للسحب من حوض مائي على المناطق المجاورة - كما أنه يمكن معرفة فاعلية الحواجز تحت السطحية على مدى الإتصال بين الأحواض المختلفة.
- ٤- يتضح مما سبق أهمية الدراسات الإقليمية للخزانات الجوفية والتي تمتد في أكثر من دولة (السودان - ليبيا - تشاد) وذلك لإمكان المحافظة على هذه الخزانات وإستغلالها على المدى البعيد.

## التنمية الزراعية بإقليم سهل الجفارة شمال غرب ليبيا: دراسة مقارنة لتنوع مصادر المياه وأنماط التربة:

تشمل منطقة الجفارة كلا من سهل الجفارة وجبل نفوسة وذلك للترابط الجغرافي بينهما. ولسكان الجبل ملكيات في سهل الجفارة يزاوون فيها الزراعة البعلية. وتبلغ مساحة منطقة الجفارة حوالي ٢٧,٦٤٠ كم<sup>٢</sup> وهي تحوي ٦٠٪ تقريباً من مجموع سكان الجماهيرية، كما تتميز بأهميتها الزراعية والصناعية إذ تساهم بما لا يقل عن ٧٠٪ من إجمالي النشاط الزراعي والصناعي بالجماهيرية. وتضم منطقة الجفارة إضافة لبلدتي طرابلس والزاوية معظم مستوطنات بلدتي الخمس وغريان. ويمتد سهل الجفارة ما بين ساحل البحر الأبيض المتوسط في الشمال، ونطاق جبل نفوسة في الجنوب وذلك بشكل مثلث يقع رأسه قرب رأس المسن إلى الغرب من الخمس وتتمشى قاعدته مع الحدود التونسية ويتدرج سهل الجفارة في الارتفاع كلما إتجهنا نحو الجنوب.

فبينما نجد أن ساحله الشمالي يقع في مستوى سطح البحر تقريباً أو يرتفع عنه بضعة أمتار فقط نجد أن ارتفاعه يصل إلى ٥٠م على بعد ١٥ كم في الداخل ثم يصل إلى ٣٨٠م عند قاعدة نطاق الجبل. ويتميز فيه قسمان:

أ- الشريط الساحلي الممتد من رأس المسن شرقاً حتى إقليم زوارة غرباً ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً حتى قرية العزيزية جنوباً، وتبلغ مساحة هذا الجزء من السهل حوالي ٢,٣٢ كم<sup>٢</sup>، حيث تتركز فيه الزراعة الكثيفة التي تعتمد على الأمطار والمياه الجوفية الكامنة في الطبقات العليا. ويبلغ معدل سقوط الأمطار في هذا الشريط الساحلي من ٢٠٠مم عند منطقة زوارة إلى ٣٥٠مم عند منطقة طرابلس والقره بولي، كما أن مياه السيول المنحدرة في الوديان من جبل نفوسة تحدث عونا للمياه الجوفية الغير عميقة بالمنطقة. ويتركز في هذا الجزء من السهل عدد كبير من المصانع والمعامل فبلدية طرابلس وحدها تضم ٦٤,٥٪ من إجمالي المنشآت بسهل الجفارة، وهو ما يعادل ٤٥,٦٪ من إجمالي النشاط الصناعي في

الجماهيرية. ومن الصناعات تعليب السمك ومعاصر الزيت والمطاحن ومقاطع الحجر ومصانع البلاط. وهناك ظاهرة إنتشار الصناعات الصغيرة التي لا يزيد عدد العمال في الكثير منها على خمسة مثل ورش الميكانيكا والنجارة. وطرق المواصلات في هذا السهل تلعب دورا مهما في الإقتصاد الإقليمي<sup>١</sup> إذ قد ساعد الطريق الساحلي والشبكة المتصلة به على إزدهار نسبي لمستوطنات الساحل بالإضافة لتمييز شبكة المواصلات في مدينة طرابلس حيث تتجمع فيها خطوط إقليمية من مختلف الإتجاهات. كما يتميز هذا الجزء بكثافة سكانية عالية نسبيا تتركز في مدن كطرابلس والزاوية وفي مجموعة كبيرة من المستوطنات الزراعية في هذه المساحة الممتدة حتى الحدود الغربية للإقليم.

ب- الجزء الجنوبي لسهل الجفارة والذي يمتد من الحدود التونسية غربا حتى مرتفعات الخمس شرقا وقاعدة جبل نفوسة جنوبا. وتبلغ مساحته حوالي ١٤١٢٢ كم<sup>٢</sup>. ويتميز هذا الجزء بوجود القطع الزراعية الصغيرة المبعثرة خاصة حول المستوطنات وعلى جانبي الطريق المعبدة وأكتاف الوديان وهناك مساحات شاسعة تربتها صالحة وقابلة للإصلاح والتعمير والتي تعتمد على الزراعة البعلية والمروية أحيانا. وكذلك بعض الوديان الهامة التي تنحدر من الجبل وتموت في النهاية الشمالية منه دون أن تصل إلى البحر، بإستثناء عدد بسيط منها مثل وادي الرمل ووادي ترغت ووادي المسيد ووادي جبارة، المنحجرة من جبل ترهونة. كما يتميز أيضا بوجود مناطق رعوية هامة ويصل معدل سقوط الأمطار بهذا الجزء من ١٠٠ سم عند الحدود التونسية إلى ١٥٠ سم عند منطقة بئر الغنم و ٢٥٠ سم عند النهاية الشرقية له. ويختلف غالبا في تكويناته الجيولوجية عن الجزء الشمالي.

وتتوزع مستوطنات هذا الجزء في السهل وعند قاعدة الجبل، وتتسم بقلة الكثافة السكانية، فتشمل مستوطنات كالعسة والوطية وتجي وبئر الغنم إلخ... ويمتد نطاق الجبل من الحدود التونسية في الغرب إلى الخمس في

<sup>١</sup> الجمهورية العربية الليبية: اللجنة للرعاية للتنمية الزراعية لمنطقة الجفارة - التقرير النهائي ١٩٧٢ - ص ٣ وما بعدها.

الشرق وتبلغ مساحته حوالي ١٣٠٦ كم<sup>٢</sup> ويصل إرتفاع بعض اجزاء الجبال خاصة إلى الجنوب من غريان إلى أكثر من ٧٥٠م فوق سطح البحر ويتناقص إرتفاع الجبل تدريجيا نحو الشرق والغرب فيصل إلى ٤٠٠م في منطقة ترهونة و ٣٠٠م في منطقة مسلاته، ثم يستمر في تناقصه التدريجي حتى ينتهي عند ساحل البحر في منطقة الخمس وأما إلى جهة الغرب فإن التناقص أقل وضوحا فيبلغ في يفرن ٧٣٠م ويقل عن ذلك مثلا عند الحدود التونسية.

وتنتشر فوق سطح الجبال وعلى جوانبها شبكة كبيرة من مجاري الوديان التي تتحدر في اتجاهات مختلفة على حسب إنحدار سطح الأرض حيث أن قسما كبيرا من أمطار الجبال تنصرف في أودية عديدة ينتهي أغلبها في سهل الجفارة دون وصوله إلى البحر وتمارس مستوطنات منطقة الجبل الزراعة البعلية حيث يصل معدل سقوط الأمطار من ١٥٠م عند نالوت إلى ٢٥٠م عند منطقة يفرن و ٣٥٠م في منطقة غريان وترهونة. ويتميز الإستيطان على الجبال بالتفرق والإنتشار حيث يعتمد الأهالي على الإقتصاد الرعاعي البعلي والرعوي. وتضم بلدية غريان ١٢,٧٪ من إجمالي المنشآت الصناعية في منطقة الجفارة. وتحيط بالجبل حلقة من الطرق فتربط بالجزء الساحلي للجفارة بأربعة خطوط مواصلات تقطع سهل الجفارة فتصل رواراة بالجوش (طريق غير معبد) والزاوية ببئر غلاف وطرابلس ببئر غلاف وبغريان وطرابلس بترهونة.

#### المياه:

##### ١- المياه السطحية:

ينحدر العديد من الوديان في سهل الجفارة وهناك بعض الوديان الهامة التي يمكن أن تنشأ عليها السدود والمساطب والقنوات للاستفادة بالمياه المتجمعة منها في الأغراض الزراعية ولحماية التربة من الإبحراف. ومن بين هذه الوديان وادي الحسيان ببالوت ووادي الرجبان بمنطقة جادو ووادي أبو ر غوة بكاباو ووادي الأكوام والأصابعة ووادي أبو شيبية ووادي غار ووادي الهيرة ووادي الديفة ووادي الرمن ووادي ترغث

وادي الخروع ووادي المسيد ووادي الربيع بالمنطقة من العزيرية حتى قصر خيار.

## ٢- المياه الجوفية:

أ- تتميز غالبية الشريط الساحلي من سهل الجفارة بوجود طبقة حاملة للمياه غير العميقة والتي يصل سمكها إلى حوالي ٨٠م تقريبا. ويلاحظ تأثر منسوب المياه بالهبوط في أماكن عديدة نتيجة لإزدياد استغلال مياه هذه الطبقة وكثرة الضخ منها بمقدار يفوق كمية الاستعاضة السنوية من مياه الأمطار بالإضافة إلى المياه التي تتدفق خلال الطبقات الأرضية إلى البحر. وقد تسبب إزدياد السحب من الخزان المائي الجوفي العلوي ليس فقط في انخفاض منسوب المياه بل في إزدياد الملوحة في بعض المناطق. وتعتبر تكوينات الزمن الرابع بمنطقة الجفارة من أهم الطبقات الحاملة للمياه بهذه المنطقة، وذلك من حيث جودة ونوعية المياه. وتقع تحت التكوينات المشار إليها تكوينات العصر الميوسيني التي تتراوح سمكها من ٨٨م إلى ٥٦٠م حسب إختلاف المناطق وتعتبر طبقات الحجر الجيري بهذه التكوينات ذات أهمية بالغة من حيث إحتوائها على خزان جوفي لم يستغل بعد وتحتوي مياهها الإرتوازية أو شبه الإرتوازية على نسبة من الأملاح ومنها الكبريتات نظرا لوجود طبقات الجبس فيها إلا أنها مياه صالحة للزراعة.

ب- الجزء الجنوبي من سهل الجفارة، وأهم التكوينات الحاملة للمياه بهذه المنطقة هي تكوينات العصر الترياسي والمسماة إقليميا بتكوينات (أبو شيبه) وتظهر هذه التكوينات على سطح الأرض في المنطقة الواقعة بين بئر الغنم وأبو غيلان وكذلك عند قاعدة جبل ترهونة في الشمال الغربي منه. ويتراوح سمك هذه الطبقات الحاملة للمياه بين ١١٠م إلى ١٦٥م تقريبا، وتحتوي كميات كافية من المياه التي تحتوي على بعض الملوحة إلا أنها صالحة للاستعمال الزراعي.

ج- يتكون جبل نفوسة من عدة تكوينات جيولوجية، تسمى إقليميا بتكوينات مزدة تقع تحتها تكوينات تغرنة فتكوينات يفرن وعين طلي فتكوينات جادو ثم تكوينات ككله فكاباو فشكشوك وهكذا وتقع



المصادر الرئيسية للمياه في تكوينات عين طيبي وغريان وتكوينات ككلية، إلا أن الأخيرة تعتبر أهم مصدر مائي في هذه المنطقة، ويتراوح سمكها من حوالي ٦٥م تقريباً عند منطقة غريان إلى ٨٠م عند منطقة نالوث، كما يختلف عمق هذه التكوينات باختلاف المناطق ويتراوح بين ٣٠٠م و٦٥٠م تقريباً.

### التربة:

تعتبر التربة في منطقة سهل الجفارة جيدة وهي صالحة للزراعة وتوجد ممثلة في الأنواع الآتية:

- أ- التربة الرملية وتغطي أغلب منطقة سهل الجفارة وهي تربة غير متماسكة ومعرضة للتعرية بفعل الرياح لعدم وجود حماية غابية لها.
- ب- تربة الوديان الجافة بسهل الجفارة مثل وادي الهيرتو وادي المجنين ووادي الرمل وغيرها ونشير أساساً إلى تربة الدلتاوات الأرضية والتي تمتاز بعمقها وخصوبتها.
- ج- التربة الطميية التي تكونت نتيجة لإنبهار التكوينات الطميية والكربونية والرملية بفعل السيول وترسبها في بعض المناطق. ويوجد هذا النوع من التربة خاصة في المنطقة الشرقية لسهل الجفارة.
- د- التربة الطفالية الرملية وهي تغطي جزءاً من المنطقة مثل بعض المناطق في وادي الأثل ووادي الهيرة.

### المشاكل الرئيسية التي تواجه الإقليم:


- ١- ظاهرة إستمرار هبوط منسوب المياه وتسرب الملوحة إلى بعض الآبار القريبة من البحر كما في صبراتة والقره بوللي مثلاً.
- ٢- نزوح السكان إلى المناطق الساحلية من سهل الجفارة مما زاد في حفر الآبار بالمنطقة وفي إستغلال مياه الخزان الجوفي الغير عميق على أسس غير منظمة وغير علمية وقد إهتمت الدولة بهذه المشكلة إهتماماً كبيراً.

- ٣- وجود مناطق غير مشجرة أو مثبثة الأمر الذي يؤثر تأثيراً مباشراً على أية تنمية تقام في السهل قبل نمو مصدات الرياح وتثبيت الرمال بأشجار تتحمل الجفاف في مناطق مروية.
- ٤- قلة إهتمام المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة مثل إستعمال السماد والميكنة الزراعية وتربية النحل وإتباع الدورة الزراعية التي تساعد على زيادة الإنتاج وتنويعه.
- ٥- عدم وجود برنامج لمكافحة الطيور التي تقضي على ٣٠٪ من إنتاج الحبوب.
- ٦- وجود بعض المزارع مملوكة من قبل أشخاص لا يعتنون بها، مما يؤدي إلى إهمالها، وخاصة وأن بعض هذه المزارع كبيرة المساحة وأصحابها لا يتمكنون من إستغلالها كما توجد على النقيض من ذلك كثير من الملكيات الصغيرة الغير إقتصادية.
- ٧- نقص الأيدي العاملة في المجال الزراعي وقد خفف من حدة هذه المشكلة التسهيلات التي قدمتها الحكومة لدخول العمال الزراعيين العرب.
- ٨- ضعف الإنتاج الحيواني ممثلاً في:

- أ- بدائية طرق التربية والتغذية للأبقار والأغنام والدواجن.
- ب- عدم تغطية كافة المناطق بأعمال العلاج والمحافظة على الصحة الحيوانية.
- ج- عدم إنتشار السلالات الممتازة في إنتاجها وكثرة وجود السلالات المحلية ذات الكفاءة الإنتاجية المنخفضة.
- د- تعرض المراعي الطبيعية في كثير من السنين للجفاف وسوء إستغلالها مما أدى إلى قلة الأعلاف الخضراء.
- هـ- قلة مصادر الشرب للحيوانات في أماكن تجمعها في المراعي الطبيعية وخاصة الإبل والأغنام.
- و- في حالة الجفاف لا يستطيع الفلاحون والرعاة نقل حيواناتهم إلى أماكن أخرى تتوفر فيها المراعي، مما يؤدي إلى القضاء على نسبة كبيرة من الحيوانات.

٩- إن نحو ٣٠٪ من الإنتاج الزراعي تضيع سنويا بفعل تأثير الحشرات والأمراض الفطرية وهذا ناتج عن قلة الكفاءات الفنية المتخصصة في وقاية النباتات وعدم إلمام المزارع بطرق ومواعيد مكافحة، وعدم وجود العدد الكافي من مراكز وقاية النباتات.

وهذه هي المشاكل الرئيسية للإقليم وتهتم الدولة إهتماما كبيرا بإيجاد الحلول المناسبة لها.



خريطة: مشروع النهر الصناعي العظيم.


## دراسة في تغير فروع النيل في الدلتا

لما بدأ عصر البلايستوسين كانت أرض الدلتا مازالت مغمورة بمياه البحر، وليكنها التحليل في الظهور هو من صحبة المياه شيئاً فشيئاً بسبب استمرار انخفاض البحر وبفضل ما كان يلقيه النيل من راسب الحصباء والرمال (Ball) وبدأ نموها من الجنوب. وكان نمو الدلتا أسرع في الوسط منه في الجوانب، إذ أن مياه النيل عند ما أخذت في تكوين الدلتا في الخليج القديم كانت أسرع وأكثر تقدماً في الوسط عنها في الجانبين. فلما أحدث فروع النيل في التكوين بعد ذلك كانت القروع الوسطى في الدلتا أبعد في تقدمها في البحر من القروع الجانبية. وكذلك كان تقدم الرواسب في الوسط أكثر منه في الجانبين.

وكانت الدلتا في تطور بطيء ولكنه مستمر. وقد حدثنا بعض الجغرافيين القدامى أمثال اضطرابون وبطليموس أن أفرع الدلتا في ذلك العهد كانت غير ما نعرفه الآن. وقد ذكر اضطرابون الذي عاش في القرن الأول للميلاد (٦٣ ق. م - ٢٤ ب. م) سبعة مصبات لأفرع النيل في الدلتا وهي من الشرق إلى الغرب: (محمد عوض (١) - (Ball, Murray a)

١ - البيلوزى Pelusiac نسبة إلى بلدة بيلزيوم (الفرما) ومجرها قد يكون مطابقاً قليلاً لبعض مجرى ترعة للشرقاوية وادي الاخضر وعمر فاقوس.

٢ - التنيسى Tanitic نسبة إلى بلدة تنيس التي كانت قديماً بلدة عامرة ومركزاً تجارياً هاماً في الركن الشرقي لبحيرة المنزلة. وبعض



الفرع السبعة للأنهار كما ذكرها المسلمون

Ball : Egypt in the Classical Geographers P. 69.

هذا الفرع يطابق لبعض مجرى بحر موسى

٣ - المنديزى Mendesian : ويدلوا أن المجرى الأدنى للبحر الصغير مطابق لجزء من مجرى هذا الفرع .

٤ - الفرع الاوسط ( الفاي ) Phatmetic ومصب هذا الفرع مطابق لمصب دمياط .

٥ - المصب السيني Sebennetic نسبة الى البلدة التي تسمى اليوم بمنود . ومجرى بحر تيره يتبع مجرى هذا الفرع الى حد كبير .

٦ - المصب البوليتي Bolbitic وهو مطابق لمصب رشيد .

٧ - المصب الكانوبي Canopic وبعض مجراه يجري فيه الآن بحر دياب .

تلك هي المصببات القديمة كما ذكرها اصطرابون وقد أضاف إليها بطليموس الذي عاش في القرن الثاني للميلاد (٩٠ م. - ١٦٨ م. ب.) فروعاً أخرى مثل الفرع الترموتي الذي كان يجري في وسط الدلتا ويأخذ من الفرع الكانوبي ويصب في الفرع السيني (١).

وقد تغيرت الحال بعد ذلك في عصر العرب وما بعده فزال كثير من تلك المصببات ، كما يبدو من خريطة الدلتا لابن سيراويون الذي عاش في القرن التاسع الميلادي حيث زال الفرع الثاني في شرق الدلتا والفرع الترموتي في وسط الدلتا (٢) . وانخفضت بعض الفروع تدريجياً كما يبدو من خريطة الدلتا أثناء الحملة الفرنسية على مصر في أوائل القرن التاسع عشر حيث ظهر فرعاً رشيد ودمياط كفرعين رئيسيين (٣).


(١) Omar Toussoun : Anciennes Branches du Nil, époque ancienne 1922.

(أ) القوحة الرابعة - فروع النيل في الدلتا كما ذكرها اصطرابون .

(ب) القوحة الحادية عشرة - فروع النيل في الدلتا كما ذكرها بطليموس .

(٢) Omar Toussoun : Anciennes Branches du Nil, époque Arabe. (Ibn Sirapiou P. 81-86) 1922.

(٣) راجع خريطة فروع الدلتا في عهد الحملة الفرنسية على مصر - حسين سري : أرى في مصر (١٩٣٧) .





ويعلل اختفاء بعض هذه الفروع بطبيعة الأرساب في سهل منبسطة  
كذلك النيل يسهل فيه تحول المخارى المائية من جهة إلى أخرى . وبما  
يساعد على ضعف الفروع وانخفاضه أن يتقابل تيار الماء بقوة عند أول  
الفرع ، فيضعف التيار ويلقى ما به من رواسب عند مخرج الفرع ،  
وهكذا يسد بالتدرج فيضعف الفرع ويندر ، فهذه الفروع القديمة قد  
طمرتها رواسب النهر إلى أن أعيد حفر أجزاء منها في القرن الماضي  
وأصبحت تجري فيها ترع الرى الحالية<sup>(١)</sup>.

وكان من الممكن أن تمتد فروع النيل في الدلتا كثيرا نحو الشمال  
لو أن النهر في مجراه الأدنى كان يخترق منطقة ممطرة وليست صحراوية .  
إذ أن ظروف الجفاف في مصر تؤدي بطبيعة الحال إلى تناقص كمية  
المياه التي يحملها النهر تناقصا تدريجيا كلما قرب النهر من البحر مما يؤدي  
إلى ضعف تيار الماء والقاء معظم الرواسب بالقرب من فم الدلتا ولذا  
كان نحو الدلتا نحو الشمال محدودا نوعا ما رغم ضعف التيارات البحرية  
وقلة أهميتها في البحر المتوسط .

### أهم فروع النيل في الدلتا :

يعتبر الفرع البيلوزى من أهم فروع النيل في شرق الدلتا . وكان يخرج  
من النيل عند بولاق ويتبع الرعة البولاكية ثم الرعة الشراوية مارا  
بشبين القناطر . وينحرف بعد ذلك مشرقا ومتخذًا مجرى البحر الشبيني  
الحالي ثم مجرى بحر فاقوس . ويواصل اتجاهه نحو الشمال الشرقي ممتدا  
في أراضي المستنقعات المجاورة لبحيرة المنزلة . وأخيرا يخترق سهل الطينة  
الحالي حتى ينتهى في البحر المتوسط بالقرب من بلوز<sup>(٢)</sup> (Daressy) .

(١) راجع خريطة ترع الدلتا في عهد محمد علي .

Barois - Les Irrigations en Egypte (1911).

(٢) بلوز : بلدة قديمة تقع إطلالها على مسافة ٣٥ كم تقريبا جنوب شرق بورسعيد وعلى

بعد ثلاثة كيلو مترات من الساحل

وفي عرب الدلتا يمثل البحر الأبيض المتوسط البحر الأبيض المتوسط وكان يبدأ من رأس الدلتا القديم في الغرب ويتجه نحو الشرق إلى البحر الأحمر أو حسب كان يبدأ بتفصيل القول إلى فرعيه الرئيسيين الفرع البيلورى والفرع الكانونى (Ball, Murray (h) . وينبع بعد ذلك الشريان الحالى لفرع رشيد إلى قرية زبونة البحر التابعة لمركز كوم حمادة وبعدها يتجه صوب الشمال الغربي متقبعا ترعة إلى ديارب إلى قرب نهايتها ثم يعبر الفرع اتجاهه صوب دمنهور حيث يتبع جزءا من مجرى رعة دمنهور القديمة ويأخذ الفرع بعد ذلك اتجاهها شماليا غربيا حتى قرية الكريون وبعدها يقلب اتجاهه صوب الشمال مارا على الجسر الذى يفصل بين عرته اذكو وبحيرة ابي قير القديمة وقد ثبت أن مصب الفرع الكانونى كان يمتد نحو سطح مياه خليج ابي قير لمسافة ثمانية كيلو مترات ويصب إلى الجنوب من جره بسبب يتجه ثلاثة كيلو مترات فلقد استطاع إماره البحر الانجليزى بعد أن قامت بقياس الأعماق في خليج ابي قير أن يحدد الشريان الأدنى للفرع الكانونى القديم (١)

وضعف الفرعان واندثرا تدريجيا للأسباب التى أشير إليها أما فرع رشيد ودمياط فظلا يمثلان الفرع الرئيسيين للبحر في الدلتا وتتبع الفروع القديمة في الدلتا مخضع لأربعة عوامل

(أ) دراسة الانحناءات في الترع الحالية فكلما كثرت الانحناءات في الرعة أوحى ذلك بأنها تمثل جزءا من فرع قديم كما هو الحال مثلا في البحر الصغير إذ أن مجراه الأدنى مطابق لجزء من مجرى الفرع المندبى

(ب) دراسة مواقع المدد القديمة في الدلتا فأغلبها كان يقع على مجارى القروى القديمة فالفرع الكانونى مثلا كان يمر بكونج جعيف أو قراطيس ودمهور وكنه عطاس والكريون وغيرها من مراكز العمران القديمة



(ج) دراسة الانحناءات في خطوط الارتفاعات المتساوية (خطوط الكنتور) . وهذه الانحناءات تمثل خبر موشد لتتابع المجرى القديم للفرع .

(د) ولا شك أن دراسة أنواع التربة في الدلتا وتوزيعها في خريطة تفصيلية تمهد كثيرا لتتبع القروغ القديمة فمن المعروف أن نسبة الرمال ترتفع على جوانب المخارى المائية وفي قيعانها . وتقل نسبة الرمال في التربة كلما بعدنا عن المخارى المائية . والدراسة الحديثة للتربة في الدلتا توضح أن التربة الصفراء التي تبلغ نسبة الصلصال فيها حوالى ٣٠ ٪ والباقي مواد رملية تظهر على جوانب الترع والمخارى المائية نتيجة لطبيعة الارساب . وفي التربة الصفراء تزايد نسبة الصلصال كلما بعدنا عن مصدر الماء . فبينما نجد أن هذه النسبة تتراوح بين ٢٠ ٪ ، ٣٠ ٪ على جوانب المخارى المائية اذا ما ترتفع تدريجيا بحيث تصل الى أكثر من ٦٠ ٪ في حالة التربة السوداء .

وفرعا دمياط ورشيد هما الفرعان الرئيسيان للنهر في الدلتا . وفرع دمياط أطول الفرعين اذ يبلغ طوله من قناطر الدلتا القديمة حتى يصب في البحر الأبيض المتوسط نحو ٢٤٢ كيلو متر على حين أن طول فرع رشيد هو ٢٣٦ كيلو متر . غير أن فرع رشيد يعتبر أهم الفرعين من حيث اتساع المجرى ومقدار ما يحمل من الماء ذلك لأن متوسط اتساع فرع رشيد يبلغ ٥٠٠ متر يقابلها ٢٧٠ مترا في حالة فرع دمياط (محمد عوض «ب» ) . ويلوح أن ضمو فرع دمياط جاء نتيجة طبيعية للفروع الكثيرة التي كانت تأخذ منه مثل التربة القرونية التي كانت تأخذ نحو ثلث مياهه وتذف بها في فرع رشيد (حسن سرى) . هذا فضلا عن الترع الكثيرة التي كانت تأخذ من فرع دمياط دون حساب أو احتياط مثل بحر موسى والترعة البوئية والترعة الباجورية والترعة الخضراوية وبحر شبن . ولهذا كله كان فرع رشيد يحتفظ بمياهه للدرجة عظيمة وهذه بدورها تعمل في نحت

جوانب المخرى بينما كانت مياه فرع دمياط القليلة البطيئة تساعد على كثرة الارساب على الجوانب وفي القاع ( Willcocks ٠ ) . وعلى ذلك أخذ المخرى في الضيق وازدادت ضوئته . ويلاحظ أن الفرعين يكادان يتساويان في الطول وإسهما يبدآن من مسوب واحد ويتجهان عند مستوى سطح البحر مما يجعلنا نستبعد إمكان انخفاض جوانب فرع رشيد عن فرع دمياط . وهذا الفرع الأخير قد بدأ بستر جمع بعض مظاهر نشاطه القديم بعد ادخال نظام الري الحديث وما يتبعه من العناية بحسوره وتعميق مجراه .

ويبدو واضحا أن مصب رشيد ودمياط يبرزان كثيرا نحو الشمال كنتيجة لازمة لتقدم رواسب النهر وأمام الدلتا تكثر هذه الرواسب التي يقذفها النيل في البحر كل عام فتتراكم في قاع البحر وتعلو فتكون سببا في قلة عمقه . لذلك نلاحظ أن خط عمق ١٠٠٠ متر يبتعد عن مرسى مطروح بمقدار ١٤ كيلو مترا بينما يبعد عن الاسكندرية بمقدار ٦٤ كيلو مترا وعن بورسعيد بمقدار ١٢٠ كيلو مترا (١) .

ويمتاز الفرعان بكثرة الجزائر الهيرية وكثرة الالتواءات (٢) . وهذه الجزائر تتوسط عادة الانحناءات الهيرية وتدين بوجودها الى أثر التيار النهري الذي بتصادمه في الانحناء يرجع ويضعف فيرسب بعض ما يحمل من الرواسب في قاع النهر . ولما كان وسط التيار أسرع في العادة من جانبيه وأكثر غنى من حيث كمية الرواسب التي تحملها مياهه فان درجة تأثر وسط التيار بنتائج التصادم والاحتكاك عند الانحناءات تكون أعظم منها في حالة جانبيه . وعلى ذلك يكون الارساب في وسط القاع أعظم منه في حالة جانبيه . وعلى مر السنين ترتفع هذه الرواسب تدريجيا حتى تظهر على سطح الماء كجزيرة نهريّة طينية تأتي أكلها أضعافا اذا ما زرعت .

(١) راجع خريطة مصر الطبيعية مقياس ١ : ٢٠٠٠٠٠٠٠ على مصلحة المساحة المصرية.

(٢) راجع : اطلس الوجه البحري Egypt Atlas .

( ١ : ٥٠٠٠٠ ) : اللوحات ٨٦ ، ٨٧ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٦٢ ، ٦٣ ، وهذه اللوحات

تبين فرعى النيل في جنوب الدلتا وما هما من انحتمات وجزر طينية



وقد تغطها مياه الفيضان فتكسبها خصوبة وتمنحها فترة من الراحة التي بعدها تستأنف العمل في الانتاج الزراعى بنشاط عظيم . ومن خير الامثلة جزائر كفر على وميت برة ووردان وغيرها كثير . (Victor Mossert)

### تذبذب قمة الدلتا :

تغيرت قمة الدلتا في مواضع مختلفة منذ تكوينها حتى الوقت الحاضر . واقليم القاهرة يمثل أنسب مكان لتكوين القمة الأولى للدلتا . فالهضبة الشرقية تحتضن النيل في هذه المنطقة وتشرف عليه من حافة تمثل في جبال حوف وطره والمقطم . ولم تسمح حافة الهضبة الشرقية بتكوين سهل فيضى كما لم تسمح للنهر بالتفرع في الاتجاه الشرقى في المنطقة بين حلوان والقاهرة . ولما تراجع الهضبة الى الشمال من القاهرة فتسع المجال نحو الدلتا وللنهر ان يمد له ذراعاً نحو الشمال الشرقى .

وفي اقليم القاهرة والى الغرب من النهر تبعد الهضبة الغربية عن المجرى تدريجياً كلما اتجهنا شمالاً فينمو السهل الفيضى ويتسع نحو الشمال حتى يتصل بالدلتا . وهنا أيضاً تطل الهضبة على السهل الفيضى بحافة تتحدّر تدريجياً نحو الشرق وقد قطعت بعدد كبير من الأودية الجافة مثل وادى التقله في الجنوب عند البدرشين ووادى الطالون الذى ينتهى الى السهل في منطقة الجيزة ووادى القرن الذى يبدأ من جبل أبورواش والمعيجة وينتهى شرقاً الى السهل الفيضى عند كرداسة . ويقابل هذه الأودية في الهضبة الشرقية وادى حوف في الجنوب قرب حلوان ووادى الدجلة الذى ينتهى عند المعادى ووادى اللبابة الذى ينتهى الى الدلتا قرب الجبل الأحمر الى الشمال الشرقى من القاهرة (١)

وبخلاصة القول أن اقليم القاهرة يمثل الموقع الجغرافى الطبيعى لنمو رأس الدلتا اذ تشرف التلال على الوادى من الشرق والغرب . ثم تأخذ هذه التلال في الابتعاد عن النهر كلما اتجهنا شمالاً حتى يتغير المنظر الطبيعى الى سهول فسيحة تعلن ظهور الدلتا ( M. C lerget ) .

ومنذ أن تكونت قبة الدلتا في منطقة منفيس في عصر البلايستوسين ، أخذت تتقدم نحو الشمال . ففي أوائل العصر الفرعوني كانت قبة الدلتا عند إقليم منفيس حيث يبدو أن النهر استطاع أن يمد له ذراعا نحو الشمال الغربي يخرج منه . عند منفيس التي جعلها الفراعنة حاضرة القسم الإداري الأول من أقسام مصر السفلى واعتبروها الفاصل بين الدلتا والصعيد . وكان قلب منفيس وحيها الرئيسي في موضع قرية ميت رهينة الحالية أي جنوب رأس الدلتا الحالي بحوالي ثلاثين كيلو مترا . وعلى ذلك يمكن القول أن رأس الدلتا كان في بدأ الحكم الملكي المصري أو قبله بقليل في منطقة منفيس وأن تفرع النيل كان يبدأ من هذا المكان . (إبراهيم رزقانه) - ١٩١٥

وفي أوائل القرن الأول الميلادي يشير اصطرلابون في وضوح أن قبة الدلتا كانت عند الطرف الجنوبي لجزيرة الوراق الحالية حيث كان يتفرع النهر الى فرعيه الرئيسيين الفرع البيلوزي نحو الشمال الشرق والفرع الكانوي نحو الشمال الغربي . ومعنى هذا أن قبة الدلتا تقدمت نحو الشمال من إقليم منفيس الى جزيرة الوراق بعد أن أندثر الفرع الذي كان يخرج من النيل عند منفيس بسبب تراكم الرواسب عند مخرجه . ومن الطبيعي أن يكون رأس الدلتا في هذه الفترة عند الطرف الجنوبي لجزيرة الوراق الحالية . فهذه الجزيرة تقع عند الطرف الجنوبي للدلتا حيث تأخذ المصببتان في الإبتعاد شرقا وغربا وحيث يبدأ النيل في التفرع الى فروعه الرئيسية في الدلتا . (إبراهيم رزقانه ب) - (Ball, Murray (C.


وفي أوائل العصر العربي تقدمت قبة الدلتا قليلا نحو الشمال فكان التفرع الرئيسي للنيل يبدأ عند الطرف الشمالي لجزيرة الوراق . فوصف ابن عبد الحكم المتوفى سنة ٢٥٧ هـ (٨٧١ م) فروع الدلتا في عصره (١) . ويبدو من دراسته أن فرع سرديوس كان أبعدا جنوبا . وكان يخرج من النيل عند سرديوس بجوار بأسوس الحالية وقرب الطرف الشمالي لجزيرة الوراق حيث يخرج

(١) ١ - ابن عبد الحكم : فروع مصر وأخبارها ص ٦ - ٧ - ليدن ١٩٢٠ .

ب - إبراهيم رزقانه : المرجع السابق ص ٢٩ .

ج - Omar Toussoun · Anciennes Branches Du Nil, époque Arabe - P. 72-76.





تذبذب قسمة دلتا النيل

من النيل في الوقت الحالي رعة أبو المنجا التي تمثل جزءاً من مجرى فرع  
سردوس القديم. وكانت تخرج من النيل شمال هذه البلدة سائر فروع البلهنا  
في العصر للعربي كدمياط وبخا ورشيد ؛ ومعنى هذا أن جنوب جزيرة الوراق  
وتجزئها يمثلان قمة الدلتا القديمة في عصرين مختلفين . فالقمة الأولى ظهرت  
في القرون الأولى من الميلاد والقمة الثانية سادت في القرون الأولى من الهجرة

ولقد أكد أن سيراينون (٩٠٠ م) ما وصفه الكاتب الأول عن قمة  
سردوس (Toussoun. O. "a") وبعد قرن من الزمن كتب ابن حوقل عن قمة  
شطونف (Toussoun "b") ومعنى هذا أن قمة سردوس تضاهل شأنها لتراكم  
الرواسب في فرع سردوس . وأدى ذلك الى حفر قناة أبي المنجا في جزء  
من هذا الفرع لتحسين الري في شرق الدلتا (القلقشندي) وتقدمت قمة الدلتا  
شمالاً الى أقليم شطونف كما وصفها القلقشندي (١٤١٨ م) . وهكذا يبدو  
من كتابات العرب بين القرنين العاشر والخامس عشر الميلاديين ان قمة الدلتا  
كانت عند شطونف التي تقع شمال القمة الحالية بنحو عشرة كيلومترات .  
ثم أخذت قمة الدلتا تتراجع نحو الجنوب منذ القرن الخامس عشر حتى الوقت  
الحاضر . وتفسير ذلك أن تصادم تيار النهر برأس شبه جزيرة شطونف أدى  
الى ضعف التيار فتخلص من بعض رواسبه الى الجنوب من شبه الجزيرة .  
ونمت هذه الرواسب تدريجياً حتى وصلت بين شبه جزيرة شطونف وجزيرة  
الشعر التي أصبحت بدورها شبه جزيرة . وهكذا تراجعت القمة الى الجنوب  
وبدأ تنفر النهر الى فرعيه الرئيسيين عند الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الشعر .

وقياساً على هذا التفسير سيمتلاً - مع مضي الزمن - الفاصل المائي بين  
شبه جزيرة الشعر من ناحية وبين جزيرة القراطين من ناحية أخرى وتراجع  
قمة الدلتا الى جنوب شبه جزيرة القراطين وعلا ذلك الفاصل المائي بين جزيرة  
أبي القيط والاقليم المحاور لشدة ضيق أخرى وضلولة . وتصبح هذه الجزيرة  
جزءاً من الدلتا . ولايُحتمل أن تتراجع (١) القمة الى أبعد من ذلك لإتساع  
المجرى وبعد المسافة بين جزيرتي القراطين والوراق

(١) خريطة القاهرة وضواحيها مقياس الرسم ١ : ٧٥٠٠٠ (مصلحة المساحة المصرية)  
وتبين هذه الخريطة قمة الدلتا في الوقت الحاضر والحزب التي انشأها

و خلاصة القول أن قمة الدلتا قد مرت في دورين رئيسيين : أما الدور الأول ففيه تقدمت قمة الدلتا نحو الشمال . وقد بدأ هذا الدور منذ تكونت القمة في منطقة منفيس في عصر البلايستوسين : واستمر هذا التقدم خلال العصور الحنجرية والتاريخية حتى انتهى في القرن الخامس عشر الميلادي حيث كانت قمة الدلتا عند إقليم شطآنوف . وأما الدور الثاني فهو تراجع القمة نحو الجنوب منذ القرن الخامس عشر الميلادي حتى الوقت الحاضر حيث تقع قمة الدلتا عند الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الشعير . ومرحلة التقهقر صوب الجنوب لا تزال مستمرة تدريجيا حتى الوقت الحالي .

## المراجع

### المراجع العربية :

ابراهيم رزقانة (١٩٤٨) - ا ب : قفة دلتا النيل (مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية - المجلد الرابع ١٩٤٨) ص : ٢٤ - ٢٥.

ابراهيم رزقانة (١٩٤٨) - ب- : المرجع السابق ص : ٢٧.

القلفشندى (١٩٣٨) : صبح الأحيى في صناعة الانشا - الجزء الثالث - دار الكتب بالقاهرة - ص : ٣٠٠ - ٣٠٢.

حسين سرى (١٩٣٣) : علم الري - الجزء الأول - ص : ١٥.

محمد عوض محمد (١٩٣٠) - ا - : هر النيل - ص : ١٦٦ - ١٦٧.

محمد عوض محمد (١٩٣٠) - ب- : المرجع السابق - ص : ١٢٧.

### المراجع الأجنبية :

Ball (1939) : Contributions to the geography of Egypt. P. 56.

Ball, Murray (1942) a : Egypt in the Classical geographers. p. 69—70.

Ball, Murray (1942) b : Ibid. P. 25.

Ball, Murray (1942) c : Ibid P. 69.

Clerget. M. (1934) : Le Caire, étude de géographie urbaine et d'histoire économique. Tome I. p. 12—18.

Daressy (1929) : Les branches du Nil sous la 18<sup>e</sup> dynastie. Bull. Soc. G. Eg. T-XVI, Juin 1929, P. 293—294.

Toussoun. Omar (1922) a : Anciennes Branches du Nil, époque arabe, P. 83.

Toussoun. Omar (1922) b : Ibid — P. 89.

Victor Mosseri (1925) : La fertilité de l'Egypte. (mémoire présenté au congrès international de géographie du Caire, Avril 1925, et publié dans le compte rendu du congrès) T. IV, P. 135—168.

Willecocks, Craig (1913) : Egyptian Irrigation. vol. I, P. 296.

## الشرق الأوسط ومشكلة المياه

أولاً: في مصر.

ثانياً: في إسرائيل وحوض الخليج العربي.

ثالثاً: مستقبل الشرق الأوسط بالتعاون الإقليمي لحل مشكلة المياه.

رابعاً: التلوث البحري في البحر المتوسط:

١- مصادر التلوث البحري.

٢- التوزيع الجغرافي لمعامل التكرير والموانئ النفطية.

٣- مدى حماية البحر المتوسط من التلوث البحري.

٤- الحد من التلوث البحري.

خامساً: نظام التصرف في جنوب السودان وأثره على مشروعات

الري في مصر ومناقشة ظاهرة تلوث المياه:

١- مقدمة.

٢- نظام التصرف المائي لأنهار حوض بحر الجبل.

٣- مشروع القناة في إقليم السودان وأثره على مشروعات الري في

مصر.

سادساً: مشروعات استثمار مياه نهر الأردن:

١- المشروع الأمريكي.

٢- المشروع العربي.

٣- المشروع اليهودي.

٤- مشكلة عجز المياه.

**مناسحة: مصادر المياه في الوطن العربي:**

- ١- المياه الجوفية في الوطن العربي.
- ٢- إمكانيات المياه الجوفية والنهرية والمطر:
  - أ- الطبقات الحاملة للمياه.
  - ب- الأحواض الجوفية.
  - ج- الموارد المائية السطحية.
- ٣- المشاريع المطلوبة لتنمية الموارد المائية السطحية حتى عام ٢٠٠٠.

## أولاً: في مصر:

ولاستكمال الصورة عن الأوضاع الحالية للمياه في الشرق الأوسط تقسم دول المنطقة ما بين دول لديها فائض من المياه وأخرى مهددة بندرة المياه خلال الأعوام القادمة ودول أخرى تواجه حالياً وستواجه في المستقبل مشكلة مياه متفاقمة بسبب قلة مواردها المائية<sup>١</sup>. وتدرج مصر في المجموعة الثانية حيث مصادرهما من الماء كانت في عام ١٩٨٥ تبلغ ١٤٠ متراً مكعباً كل عام لكل فرد، ومن المتوقع أن تصل إلى ٦٠٠ متر مكعب في عام ٢٢٠٠. وتعتبر تركيا والعراق وإيران أكثر الدول حظاً بالنسبة لمواردها المائية في حين أن إسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن تعد من الدول المرشحة لمواجهة مشاكل مياه حادة مع بداية القرن المقبل.

وعلى الصعيد العالمي فمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية لا تزيد مواردها المائية المحلية المتجددة على ألف متر مكعب كل عام لكل مواطن طبقاً لآخر إحصائيات البنك الدولي، وهو الحد الفاصل لبداية الأزمة في الموارد المائية. وعلى سبيل المثال، فإن منطقة كندا والولايات المتحدة تتمتع بموارد تصل إلى ١٩,٤٠٠ متر مربع وأمريكا اللاتينية ٢٣,٩٠٠ متر مربع ويصل المتوسط العالمي إلى ٧٧٠٠ متر مربع. والمفارقة هي أنه على الرغم من بخل الطبيعة على منطقة الشرق الأوسط وأهمية المياه بالنسبة لها فإنه لا يوجد سوى معاهدة واحدة لتقسيم المياه في المنطقة وهي التي تم توقيعها بين مصر والسودان في ٨ نوفمبر ١٩٥٩. وتحصل مصر بموجب هذه الاتفاقية على ٥٥,٥ مليار متر مكعب في حين تتمتع السودان بـ ١٨,٨ مليار متر مكعب من مياه النيل. وحيث أن نهر النيل يمر بتسع

<sup>١</sup> 'جريدة الأهرام: بتاريخ ١٩٩٤/٢/٩ - معركة المياه في الشرق الأوسط - 'حزام العطش' يلف بمنطقة مساحتها ١٠ ملايين كيلومتر مربع ص ٥.

دول إفريقية، فقد قامت مصر بمبادرة لتجميع الدول المطلة على نهر النيل في إطار إجتماعات الأندوجو، وهي كلمة تعني الأخوة باللغة السواحلية.

ثانيا: في إسرائيل وحوض الخليج العربي:

نبدوه بخطاب أرسله الزعيم الصهيوني حاييم ويزمان في عام ١٩١٩ أي بعد عامين من وعد بلفور موجه إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك لويد جورج ويقول ويزمان في هذا الخطاب الهام إن حدود الوطن القومي اليهودي لا يمكن أن يتم وضعها على أساس المعايير التاريخية وحدها. ويضيف أن هناك ضرورات الحياة الاقتصادية العصرية التي يجب أخذها في الاعتبار. ثم يقول صراحة: إن المستقبل الاقتصادي لفلسطين يعتمد على إمدادها بالمياه اللازمة للري وإنتاج الكهرباء<sup>٢</sup>.

إن السيطرة على الأرض وعلى المياه أصبحا أمرين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما في ذهن القيادة الصهيونية. ومنذ ١٩٤٨، أصبح للإستيطان الزراعي أولوية لضمان استمرار الدولة الناشئة. إن إسرائيل مثلها مثل غالبية دول المنطقة تخشى مواجهة نقص في المياه خلال الأعوام القادمة. لتمسك إسرائيل بالأراضي المحتلة وخاصة الضفة الغربية هو اعتماد إسرائيل على مياه هذه الأراضي لتوفير ما يلزمها في مجالات الري حيث يؤكد أن ٩٠٪ من المياه المستخرجة من الضفة الغربية تخدم استهلاك دولة إسرائيل وأن السكان الفلسطينيين لا ينعمون إلا بعشرة في المائة فقط من حجم موارد المياه الموجودة بأراضيهم.

إن إسرائيل لديها موارد مائية اليوم تصل إلى ١٦٥٠ مليون متر مكعب منها ٩٥٠ مليون متر مكعب من المياه الجوفية و ٦٠٠ مليون من نهر الأردن وبحيرة طبرية ومن ٦٠ إلى ١٠٠ مليون من الأنهار والممرات المائية الصغيرة. ومنذ إحتلال الأراضي العربية في عام ١٩٦٧ سيطرت إسرائيل على الموارد المائية لهضبة الجولان السورية وروافد نهر الأردن وغالبية الآبار والمياه الجوفية للضفة الغربية وقطاع غزة.

<sup>٢</sup> جريدة الأهرام: بتاريخ ١٩٩٤/٢/٢١ - معركة المياه في الشرق الأوسط - إسرائيل وحوض الخليج العربي - ص ٥.



إن إسرائيل وضعت إستراتيجية لربط الضفة الغربية وغزة من خلال إنشاء شبكة من المستوطنات اليهودية التي من شأنها زيادة استهلاك إسرائيل من الموارد المائية على حساب السكان الفلسطينيين. ويؤكد أن ٥٢٪ من أراضي الضفة الغربية ونحو ٥٠٪ من أراضي قطاع غزة قد تم الاستيلاء عليها من أجل إنشاء المستوطنات الإسرائيلية. نظرا لأن المنظمة الصهيونية العالمية تدعم المياه بالنسبة للإسرائيليين بنسبة عالية فقد أصبح نصيب استهلاك الفرد الإسرائيلي في المستوطنات من ٦٤٠ إلى ١٤٨٠ مترا مكعبا في العام في حين لا يزيد استهلاك الفلسطيني عن ١٠٧ إلى ١٥٦ مترا مكعبا.

في النهاية إن إسرائيل تبحث الآن إمكانية جلب المياه من بلغاريا ويوجوسلافيا السابقة وإيطاليا ورومانيا، كما أنها تقوم حاليا بشراء مياه من تركيا. إن المياه التي تأخذها إسرائيل من الجولان والتي تشكل نحو ٢٢٪ من امدادات المياه الخارجية لإسرائيل تمثل سببا رئيسيا لتمسك الدولة العبرية بالأراضي السورية. إن إسرائيل باحتلالها الضفة الغربية وهضبة الجولان تمسك حاليا بمفتاح توزيع الموارد المائية في المنطقة خاصة أن إسرائيل والأردن والأراضي المحتلة ستكون من أكثر المناطق المعرضة لنقصان الموارد المائية في المستقبل القريب.

وعن الخليج نقول فيه إن هذه المنطقة التي تخزن أكثر من نصف الاحتياطي العالمي في مجال البترول و ٢٠٪ من احتياطي الغاز الطبيعي تنقصها المياه بشكل حاد. إن الطلب على المياه في منطقة الخليج يتزايد بصورة مطردة وبنسبة تصل إلى ١٠٪ سنويا. إن دول الخليج تسعى لإستخدام "هبة الله" ويقصد بها البترول من أجل تحويل الصحراء إلى واحة ويعطى مثالا بالامارات العربية المتحدة التي نجحت من خلال إستثمارات دامت عشرين عاما في اصلاح ٢٠٠ ألف هكتار من الأرض وزرع ٨٠ مليون شجرة. إن دول الخليج فكرت في السبعينات في جلب جبال جليدية عائمة من القطب الجنوبي إلى موانئ شبه الجزيرة العربية لكن هذا المشروع لم ير النور نظرا لصعوبة تحقيقه.

إن دول الخليج تعطي الأولوية اليوم لعمليات تحلية المياه لتوفير ما تحتاجه في هذا المجال نظرا لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تتيح لهم توفير موارد مائية جديدة من المياه العذبة. إن المشكلة الرئيسية للتحلية هي ارتفاع سعر تكلفة هذه التكنولوجيا حيث أن المتر المكعب الواحد من المياه يتكلف أكثر من ١,٨٠ دولار، أي ستة جنيهات مصرية ونظرا لأن الزراعة تستلزم استهلاك كميات ضخمة من المياه فإن تقنيات تحلية المياه لا يمكن استخدامها في هذا المجال وتكتفي دول الخليج باستخدامها للاستهلاك المحلي للمدن وبعض الصناعات. فأربعون في المائة من المياه التي تستهلكها مدينة مكة المكرمة تأتي من المياه المحلاة في حين أن هذه النسبة تصل إلى ٩٠٪ بالنسبة لمدينة جدة و ٩٥٪ بالنسبة للدمام. ويعتبر المصنع الذي يمد مدينة الرياض بالمياه العذبة من أهم مصانع العالم في هذا المجال وكان انتاجه أكثر من ٣٠٠ مليون متر مكعب في عام ١٩٩٠. وهناك أكثر من مائة وحدة لتحلية المياه في منطقة الخليج توفر أكثر من ٧٠٪ من احتياجات هذه الدول من المياه العذبة.

### ثالثا: مستقبل الشرق الأوسط بالتعاون الإقليمي لحل مشكلة المياه:

أنه منذ البداية كانت السيطرة على المياه في مفهوم الأيديولوجية الصهيونية من أهم عناصر الأمن القومي لدولة إسرائيل. إن الإسرائيليون أدركوا منذ البداية أنه بغير مياه فإن "أرض الميعاد" ستتحول إلى صحراء جرداء. أنه من أسباب حرب ١٩٦٧، كانت محاولة إسرائيل تحويل مياه نهر الأردن لمصلحتها مما اعتبرته الدول العربية تهديدا لأمنها القومي.

إن إسرائيل توزع المياه في الأراضي المحتلة بين الفلسطينيين وسكان المستوطنات بطريقة غير عادلة كما لا تسمح للفلسطينيين بحفر آبار تزيد على مائة متر تحت الأرض في حين أن سكان المستوطنات يحفرون آبارا تصل إلى ٥٠٠ متر، كما أنه من المسموح لهم حفر آبار على مقربة من الآبار الفلسطينية فيضخون بذلك مياه هذه الآبار.

بحصائيات تدل على أن الإسرائيلي يستهلك في المتوسط ٣٧٥ مترا مكعبا من المياه في حين أن الفلسطيني لا يستهلك سوى ١٠٧ إلى ١٥٦ مترا مكعبا وينعم سكان المستوطنات بمتوسط ما بين ٦٤٠ و ١٤٨٠ مترا مكعبا في كل عام<sup>٣</sup>.

إن مستقبل الشرق الأوسط يقوم على التعاون الإقليمي لحل مشكلات المياه وإن البديل لهذا التعاون هو تصادم دول الشرق الأوسط من أجل ضمان امدادهم بالمياه اللازمة، وأن هناك مشكلات سياسية وسيكولوجية مازالت تعترض سبيل تعاون دول المنطقة لتوزيع الموارد المائية، وإن الطريق إلى إتفاق متكامل بين دول المنطقة كافة سيكون صعبا وطويلا، ولكنه نرى ضرورة إقامة "مجموعة إقليمية للمياه في الشرق الأوسط" من أجل تجنب الأجيال القادمة مواجهات قد تكون دامية في إطار الصراع على المياه. ويذكر بأن الوحدة الأوروبية قد بدأت عام ١٩٥١ بإنشاء المجموعة الأوروبية للفحم والصلب وكانت الدول الأوروبية قد خرجت لتوها من الحرب العالمية الثانية، وإن الفحم والصلب كانا يمثلان في ذلك الوقت منتجات إستراتيجية لازمة لإعادة بناء إقتصاديات أوروبا، كذلك فإن الأهمية الحيوية للمياه في الشرق الأوسط قد تجعل الموارد المائية تلعب دورا يسهم في تقارب دول الشرق الأوسط.

ونختتم بأنه إذا كانت المياه مصدرا للنزاع في الشرق الأوسط فاتها من الممكن كذلك أن تساهم في بناء السلام في هذه المنطقة.

#### رابعا: التلوث البحري في البحر المتوسط: ١- مصادر التلوث البحري:

- أ- عمليات شحن وتفريغ النفط ونقله بحرا.
- ب- تخلص السفن من المياه الزيتية من المحركات ومياه الموازنة.
- ج- تسرب الزيت من معامل التكرير العديدة، والتي تظهر بشكل خاص على سواحل جنوب أوروبا.

<sup>٣</sup> جريدة الأهرام: بتاريخ ١٤/٢/١٩٩٤. معركة المياه في الشرق الأوسط - مستقبل المنطقة والمياه - ص ٥.

- عمليات التصفية عن النفط واستخراجه من تحت مياه البحر، حيث بدأت مثل هذه العمليات بشكل ساجح في المياه البحرية في منطقة الجرف القاري في كل من الجماهيرية وتونس.
- ه- فقد الزيت من محركات المنشآت الصناعية، ومعامل تكرير النفط المجاورة للشاطئ.

## ٢- التوزيع الجغرافي لمعامل التكرير والموانئ النفطية:

وتوضح الخريطة (شكل ١) معامل التكرير، وموانئ تصدير النفط والمناطق المسموح بتفريغ مياه الموازنة بها في البحر المتوسط، ومن الخريطة نلاحظ أن السواحل الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط، بها العديد من موانئ تصدير النفط، فعلى الساحل الشرقي للبحر المتوسط، توجد موانئ تقوم بتصدير جزء من مناطق انتاجه في تلك الدول إلى موانئ شرق البحر المتوسط، كما توجد موانئ تصدير النفط على الساحل الليبي والتونسي والجزائري، وبالتالي تصبح هذه المناطق عرضة للتلوث بمياه الموازنة وزيت محركات السفن وعمليات الشحن.

وعلى الساحل الأوروبي يوجد العديد من معامل تكرير النفط، وقد ذكر أن كل خمسين مصفاة نفط في حوض البحر المتوسط تلقي في هذا البحر حوالي ٢٠ ألف طن سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحوادث التي تتعرض لها ناقلات النفط بين الحين والآخر، تزيد من مشاكل التلوث، ففي سنة ١٩٧٣م مثلاً أدى اصطدام إحدى ناقلات النفط مع باخرة تجارية إيطالية في مضيق ميسينا، إلى تسرب حوالي ٢٥٠٠ طن من النفط الخام في البحر.

## ٣- مدى حماية البحر المتوسط من التلوث البحري:

وقد أجريت دراسة في عام ١٩٧٠م لمعرفة كميات النفط العائمة على سطح البحر المتوسط بين جزيرة رودس، وجزر الأزور في المحيط الأطلسي، مروراً بمضيق جبل طارق فوجد تكوينات نفطية في ٧٥٪ من العينات البالغة ٧٦٤ عينة فنسبة كبيرة من المياه قد لوثت بالنفط. ونظراً

لأهميه الموقع الجعرا في البحر المتوسط إذ يمر به أهم طريق ملاحى فى العالم، بين قناة السويس وقناة بما فضلا عن ساقلات النفط العملاقة، بين الخليج العربى والمحيط الأطلسى، لذلك أبرمت عدة معاهدات دوليه لحماية البحر المتوسط من التلوث وتحديد مناطق القاء المخلفات وفقا للخريطة المرفقة؛

#### ٤- الحد من التلوث البحرى:

ويمكن الحد من التلوث البحرى وتقليل آثاره الضارة على كل من الإنسان وكذلك الأحياء المائية والنباتية باتباع الأساليب الآتية:

أ- معالجة مياه المجارى بالمدن والقرى وكذلك مياه المصارف قبل وصولها إلى البحر أو البحيرة. وقد اتخذت خطوات متقدمة فى هذا المجال فى كثير من الدول المعنية ففي مصر تعالج مياه شيكات الصرف ويعاد إستخدامها فى الري كما يصل قدر ضئيل منها إلى بحيرات شمال الدلتا ومنها إلى البحر المتوسط. فالخريطة المرفقة توضح موقع بحيرة مريوط جنوب الاسكندرية وقد وصلت إليها مياه الصرف فرفعت من مستوى المياه بها وتحسنت بيئة الصيد.

ب- وفى ليبيا عولجت مياه المجارى لبعض المدن مثل طرابلس وبنغازى. فمنطقة القوارشة تبعد عن مدينة بنغازى مسافة ١٢ كم فى اتجاه الجنوب الشرقى وقد إستخدمت مياه المجارى المنفاه لري حوالي ٩٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية تمتد على جانبي قناة وادي القطارة الواقعة بمنطقة المشروع. كما أنشأ سد على مجرى وادي القطارة لتخزين مياه الأمطار وتقدر الكمية المخزنة بحوالى ١٢٥.٠٠٠ م<sup>٣</sup> تستخدم لغسل التربة والري. ولا تصل المياه الملوثة إلى البحر

ج- التخلص من النفط العائم: بعد حوادث الناقلات بالحرق أو الشطف وتخزينه فى سفن أعدت لهذا الغرض مع الحد من إستخدام المواد الكيماوية تجنباً لإصابة الأحياء المائية والنباتية إذ أن تفكك المواد

<sup>١</sup> م حويحي التلوث البحرى بالنفط مجلة العلوم لانسانيه نوفمبر ٩٠ ص ٢٥٢  
٢ ما عداها

الهيدروكربونية بالنفط إلى قطيرات تنتشر في مساحات واسعة يجعل من السهل امتصاصها فتضر الأسماك والأتسان. وهنا نشير إلى أن عظم المساحات المائية تجعل من الصعب التخلص من المواد الملوثة التي تظل في المياه عشرات السنين كما أن انتشار وبقاء المواد الكيميائية لمكافحة النفط تهدد الأحياء المائية بالضعف والعقم للأجيال المتوالية.

د- يمكن الحد من التلوث بمياه الصابورة باتباع إحدى طريقتين:

- ١- قبل شحن الخزانات بمياه الصابورة تغسل جيدا أو يخزن الماء الملوث في خزان خاص لينفصل الماء عن النفط ببطء. وقرب موانئ الشحن يفرغ الماء المنفصل في البحر. ويعبأ النفط الجديد فوق ترسبات النفط السابقة.
- ٢- بناء أحواض في موانئ التصدير تفرغ فيها مياه الصابورة حتى يتم تصفيتها تخلصا للنفط. ويوجد مثل هذه الأحواض في ميناء الحريقة النفطي قرب مدينة طبرق بالجمهورية الليبية<sup>٥</sup>.

خامسا: نظام التصريف في جنوب السودان وأثره على مشروعات الري في مصر ومناقشة ظاهرة تلوث المياه:

#### ١- مقدمة:

يتمثل جنوب السودان في هذا المنخفض العظيم الذي يحاط تقريبا بخط كنتور ٥٠٠ متر فوق سطح البحر، والذي يجري إليه أنهار من جهات مختلفة، فيجري إليه بحر الجبل والزراف والغزال والسوبات وروافدها وبعض جداول من جبال النوبا. ويتميز هذا الحوض المتسع بأن حافته المرتفعة تشغل حيزا صغيرا، بينما يشغل المنخفض معظم مساحة الحوض. ولذلك تبدو هذه الأنهار العديدة وهي قليلة السرعة كثيرة الغدران والمستنقعات إذ أن أكثر مساحة الحوض أقطار فسيحة ضعيفة الاتحاد. وارتفاع قاعه في المتوسط نحو ٤٠٠ مترا فوق سطح البحر. وهذا

<sup>٥</sup> م. ميثلي: تلوث البحار - مجلة العلوم الإنسانية - نوفمبر ٩١ - كلية الأدب - جامعة ناصر - ليبيا - ص ٣٧٠.

الإنخفاض الكبير هو إحدى مناطق الهبوط الحديثة في إفريقيا، فهذه المنطقة كانت جزءاً من الهضبة الإفريقية قبل أن تهبط، ومما يقوي هذا الرأي أن التشابه تام في البنية بين الأقاليم التي جنوبيها وإقليم جبال النوبا وكردفان.

ويغطي هذا الحوض طبقات رسوبية تفتتت من الصخور المتحولة التي تتكون منها الهضاب المجاورة. فتظهر التربة الطفالية الحمراء في القسم الجنوبي الغربي من هذا الحوض وتربة رسوبية فيضية طينية في الجزء الباقي ومن أهم صفاتها أنها تتكون من ذرات دقيقة وأنها شديدة التماسك كما أنها رديئة الصرف، وذلك لشدة ضعف الاتحاد العام.

ونظراً لأن اتحدار الحوض يبدو ضعيفاً للغاية فإن بحر الجبل والغزال يسيلان في مجرى منخفض الجوانب بحيث لا يمكن لأيهما أن يحتوي مياه الفيضان، فتفيض مياه النهر عن جانبيه وتنتشر المستنقعات، وهذه نتيجة لازمة لتضاريس أحواض هذه الأنهار. وتكوين المستنقعات هنا ظاهرة سائدة فالأمطار يصعب تصريفها لاستواء الأرض في أجزاء كثيرة من هذا الحوض والأرض بطبيعتها لا تتشرب المياه بسهولة. وقد يتحتم أحياناً رم طرق وسط المستنقعات حتى يتيسر الانتقال من جهة إلى أخرى، وكثيراً ما يقيم الأهالي حاجزاً يحول دون تسرب المياه إلى قرأهم ومنازلهم.

وفي فصل الأمطار تتحول أقطار شاسعة إلى مستنقعات. وبعضها من النوع الدائم كما هو الحال في الجزء الأدنى من بحر الجبل وبحر الغزال، وهذه تسمى بالسدود وهي نتيجة مباشرة لحالة الإقليم من الناحيتين المناخية والنباتية، والسد كثل من النبات تعترض مجرى النهر، وفي بحر الغزال يبدو السد على شكل أعشاب تنمو في قاع النهر وتطفو أوراقها وأغصانها على وجه الماء. وأما سدود بحر الجبل فهي كتل ضخمة من النبات مندمج بعضها في بعض، وقد يبلغ سمكها من خمسة إلى سبعة أمتار، وطولها قد يبلغ ميلاً وبعض ميل.

وتتمثل منطقة السدود خاصة في الجزء الأدنى من بحر الجبل ابتداءً من بلدة بور، ويظهر بحر الجبل هنا في مجرى واحد رئيسي وعدة مجار

فرعية، وعلى جوانب هذه المجاري تمتد المستنقعات وترداد حجما وعددا في فصل الصيف بعد الأمطار. وتحتل هذه المستنقعات نباتات مختلفة من أهمها نبات البردي والبوص وأم الصوف، وتبدو هذه النباتات متشابكة متضافرة على شكل كتل ضخمة تعوق جريان النهر في بعض الجهات.

وبقي النيل فيما وراء هذه المستنقعات والسدود سرا غامضا قد أغلقت دونه الأبواب وذلك منذ أقدم العصور حتى أوائل القرن التاسع عشر، حيث تعاقب المستكشفون بعضهم أثر بعض، وعلى أثر المستكشفين جاء المبشرون والمستعمرون إلى أعالي النيل وهكذا انتشعت السحب وأميط اللثام الذي ظل يحجب وجه النيل دهرًا طويلا، ولم تلبث الحضارة بمحاسنها ومساوئها أن بسطت نفوذها على هذه الأقطار القاسية. وفي الوقت الحاضر بدأ الاهتمام بأمر تطهير النهر من السدود فلا تترك لتتراكم وتكون تلك العبء الكؤود التي تعرقل الملاحة وتعطل المواصلات.

## ٢- نظام التصريف المائي لأنهار حوض بحر الجبل:

وأما من حيث نظام التصريف المائي لأنهار هذا الحوض الكبير فيوضحه الجدول الآتي، ومن هذا الجدول تظهر الحقائق الجغرافية الهامة الآتية:

### أولا:

إن متوسط ما ينصب من بحيرة فكتوريا إلى النيل هو ٥٦ مليونا من الأمتار المكعبة في اليوم أو حوالي ٦١٢ مترا مكعبا في الثانية، ويبدو أن هذا التصريف ضعيف إذا علمنا أن المساحة السطحية لماء البحيرة يزيد على ٦٦,٠٠٠ كيلومتر مربع، وإن منسوبها لا يتغير إلا قليلا. يرجع السبب في ذلك إلى عظم ما تنقده البحيرة بالتبخّر فقد ذهب ويليوكوكس وكريج<sup>٦</sup> أن نسبة ما تنقده البحيرة بالتبخّر إلى ما ينصرف منها إلى نهر النيل هو بنسبة ٢:٩. وقد قدر هرس<sup>٧</sup> أن الكميات المختلفة من المياه



المكتسبة والمفقودة على أساس عمق المياه في البحيرة هي على النحو  
الآتي تقريبا<sup>٧</sup>:

من الأمطار	١٢٠ سنتيمترا	المكتسب
من الأنهار التي تصب فيها	٣٠ سنتيمترا	
من التبخر	١٢٠ سنتيمترا	الفاقد
من تصرف نيل	٣٠ سنتيمترا	فكتوريا

فمقادير الأمطار والتبخر متعادلة تقريبا وتبلغ نحو أربعة أمثال كمية المياه التي تدخل إلى البحيرة أو تخرج بواسطة الأنهار.

ويوضح الجدول أيضا أن معدل المتوسط اليومي لتصرف بحر الجبل شمال بحيرة البرت هو ٦٥ مليوناً من الأمطار المكعبة، ويبدو هنا أن الفرق كبير بين تصرف نيل فكتوريا وبحر الجبل، وذلك مع ملاحظة أن بحيرة البرت أصغر مساحة من بحيرة فكتوريا إذ تبلغ مساحتها نحو ٥٣٠٠ كيلومتر مربع ومرجع هذا الفرق بين تصرف النهرين أن نسبة التبخر من مياه بحيرة فكتوريا أعلى بكثير منها في بحيرة البرت إذ تمتاز هذه البحيرة على بحيرة فكتوريا من الوجهة المائية بأن سواحلها المرتفعة الأخدودية تجعلها صالحة لأن يخزن فيها مقدار عظيم من الماء دون أن تزداد نسبة البخر من مائها، لأن مساحة سطحها لا تزداد بارتفاع مستواها ازديادا كبيرا كما تنتهي إليها مياه أعالي النيل مما يؤدي إلى ارتفاع تصرفها.

والمهم هنا أن ما يصل من هذا التصرف إلى الحوض الأدنى لبحر الجبل يبدو قدرا ضئيلا للغاية، إذ لو قورنت التصرفات المقاسة عند منجلا بالكميات التي تصل منها عند الملكال، لاتضح أنه بينما يختلف التصرف

<sup>٧</sup> هرست: موجز عن حوض النيل - القاهرة ١٩٤٦ - ص ٥٥ - ترجمة محمد نظيم - وزارة الأشغال المصرية.

معدل المتوسط الشهري للتصرف ١٩٤٦-١٩١٢  
بالمليون من الأطنان المتحركة في اليوم<sup>١</sup>

السلعة	نيسان	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١- قمح رقيق	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣
٢- قمح متوسط	٤٤	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
٣- قنابل قذاريه	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣
٤- قنابل قذاريه	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣
٥- قنابل قذاريه	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣
٦- قنابل قذاريه	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣
٧- قنابل قذاريه	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣

١ هـ. أ. هرست: موجز عن حوض النيل - القاهرة ١٩٤٦ - ترجمة محمد عبد العظيم  
- وزارة الأشغال - ص ٥٧.

رقعة	نيسين	لريسير	للكوير	سليسير	أستون	فيليب	فيليك	ميكو	لوريك	شارين	لريسير	باني	فهرج
٣٩	٤١	٣٩	٤١	٤٠	٣٨	٣٩	٣٩	٣٧	٣٨	٤٠	٤١	٤٣	هـ. قتل الكويش في ليريا هـ. مستأجرات ٩. بحر قزوين عند ميناء ١٠. بحر قزوين شمال بحيرة ١١. قوت ١١. قبل كفتوريا شمال هلاوت
٧٤	٧٤	٧٠	٨٠	٦٦	٨٩	٧٩	٧٤	٧٥	٦٢	٥٨	٦٠	٦٤	هـ. قتل الكويش في ليريا هـ. مستأجرات ٩. بحر قزوين عند ميناء ١٠. بحر قزوين شمال بحيرة ١١. قوت ١١. قبل كفتوريا شمال هلاوت
٦٥	٧١	٧١	٦٩	٦٦	٦٤	٦٢	٦٢	٦١	٥٩	٦٠	٦٣	٦٧	هـ. قتل الكويش في ليريا هـ. مستأجرات ٩. بحر قزوين عند ميناء ١٠. بحر قزوين شمال بحيرة ١١. قوت ١١. قبل كفتوريا شمال هلاوت
٥٦	٥٣	٥٢	٥٣	٥٤	٥٧	٦٠	٦٤	٦٣	٥٧	٥٣	٥٢	٥٢	هـ. قتل الكويش في ليريا هـ. مستأجرات ٩. بحر قزوين عند ميناء ١٠. بحر قزوين شمال بحيرة ١١. قوت ١١. قبل كفتوريا شمال هلاوت

١ هـ. أ. هرسنت: موجز عن حوض النيل - القاهرة ١٩٤٦ - ترجمة محمد عبد العظيم  
- وزارة الأشغال - ص ٥٧.

السوي المار بمنجلا بين ١٥، ٥٦ مليار فان التصرف الذي يصل الملكال عن طريق بحري الجبل والزراف يختلف بين ١٠، ١٧ مليار فقط على التوالي، أي أن ما يفقد بمناطق المستنقعات أو السدود يتراوح بين ٣٣٪، ٦٩، ٠٪. كما أن فترة إنتقال المياه في الوقت الحاضر بين منجلا والملكال تصل في المتوسط إلى حوالي ثلاثة أشهر.

ومن ذلك يتضح أن مشروع شق قناة في منطقة السدود يعتبر متمما لمشروع التخزين في البحيرات الاستوائية ومكملا له، ولن يكون لأحدهما ميزة تذكر بغير الآخر لأن إنشاء خزانات البحيرات بدون القناة إجراء غير مثمر عمليا، كما أن إنشاء القناة وحدها لا يفي بالغرض في السنين الشحيحة الإيراد.

وبعد الانتهاء من إنشاء خزان رئيسي للتخزين المستمر على بحيرة فكتوريا عند شلالات أوين، وخزان منظم للتخزين على بحيرة اليرت وشق قناة جونجلي، سوف يكون من الإمكان تكبير حوالي خمسة مليارات في السنوات المتوسطة الإيراد وثمانية مليارات لسد العجز في السنوات الشحيحة الإيراد في مصر.

ثانيا:

يظهر من هذا الجدول بجلاء أن كل نصيب النيل الأبيض من مياه هذا الحوض الكبير لا يزيد على ٣٩ مليونا من الأمتار المكعبة في اليوم وذلك يرجع إلى عظم ما يفقد من المياه بالتبخر في منطقة المستنقعات التي تأخذ في الظهور إلى الشمال من منجلا على جاتبي بحر الجبل ورواقده حتى بحيرة نو. وتنقسم هذه المستنقعات إلى قسمين، وهما:

٢م	٨٣٠	لمستنقعات الدائمة ومساحتها
٢م	٦٢٠	لمستنقعات المؤقتة ومساحتها
٢م	١٤٥٠	يكون المجموع

وتنقسم المستنقعات الدائمة إلى ثلاثة أقسام وهي:

٢م	٤٠٠	لمستنقعات الشرقية ومساحتها
٢م	١٠٠	مستنقعات جزيرة الزراف ومساحتها
٢م	٣٣٠	لمستنقعات الغربية ومساحتها
٢م	٨٣٠	لمجموع

ويقدر نحو ٦,٢ مليارا من الأمطار المكعبة من تصرف منجلا في منطقة المستنقعات وذلك بفعل التبخر في فترة إنخفاض النهر من أكتوبر إلى مارس كما يفقد أيضا نحو ٦,٢ مليارا من الأمطار المكعبة من تصرف منجلا في فترة ارتفاع النهر من أبريل إلى سبتمبر، وسبب الفاقد في هذه الحالة هو التبخر وتشرب أرض المستنقعات المؤقتة بالمياه. وتكون جملة الفاقد في منطقة السدود هذه هي حوالي ١٢,٤ مليارا من الأمطار المكعبة في السنة.

ويبين الجدول الآتي توزيع هذا الفاقد على شهور السنة في فترة إنخفاض النهر وارتفاعه<sup>١</sup>.

متوسط الفاقد شهريا بمنطقة المستنقعات من تصرفات بحر الجبل عند منجلا  
بالمليون م<sup>٣</sup> يوميا ١٩٤٢-١٩١٢

الشهر	تصرفات منجلا	تصرف المستنقعات	الفاقد	النسبة المئوية للفاقد	ملاحظات
أكتوبر	٨٧,١	٤٣,٣	٤٣,٨	٥٠,٣	
نوفمبر	٨٧,٣	٤٦,٠	٤١,٣	٤٧,٣	
ديسمبر	٧٨,٣	٤٣,٦	٣٤,٧	٤٤,٣	فترة إنخفاض النهر
يناير	٧٠,٣	٤٠,٥	٢٩,٨	٤٢,٤	
فبراير	٧٠,٤	٤١,١	٢٩,٣	٤١,٦	
مارس	٥٩,٦	٣٣,٥	٢٦,١	٤٣,٨	
أبريل	٦٠,٠	٣٩,٠	٢١,٠	٣٥,٠	
مايو	٦٠,٠	٣٧,٠	٢٢,٠	٣٨,٣	

<sup>١</sup> إمام سعيد: مشروع إنشاء قناة ص ٣٩ - مجلة المهندسين فبراير ١٩٥٣.

الشهر	تصرفات منجلا	تصرف المستتعات	الفاقد	النسبة المئوية للفاقد	ملاحظات
يونيو	٧٧,٠	٣٩,١	٣٧,٩	٤٩,٢	فترة إرتفاع النهر
يوليو	٧٣,٥	٤٠,١	٣٣,٤	٤٥,٤	
أغسطس	٧٨,٧	٤١,٥	٣٧,٢	٤٧,٣	
سبتمبر	٩٢,٣	٤٤,٠	٤٨,٣	٥٢,٣	

ويتأمل هذا الجدول نرى أن ما يضيع من ماء النهر في شمالي منجلا وفي إقليم المستتعات مقدار عظيم للغاية. ومن الغريب أن هذا الفاقد يبدو كثيرا دائما سواء أكان مستوى النهر في منجلا عاليا أو منخفضا، فإن هذا أن يؤثر في تصرف النهر عند بحيرة نو تأثيرا يذكر، وكان هذه المياه الزائدة لا تأثير لها غير زيادة مساحة المستتعات وازدياد ما يفقده النهر من مائه بهذه الوسيلة. ويجب أن نذكر أن قطعي الزراف لم يقلل من مساحة المستتعات تقريبا. كما أن التصرف النهائي لمنطقة المستتعات لم يتغير قبل وبعد إنشاء هذين القطعين. وتعمل هذه المستتعات كمنظم للتصرف النهري.

أما أنهار بحر الغزال فهي متشابهة في أن الجزء الأدنى لمجراها عرضة لتكوين السدود والسمتتعات. وبحر الغزال نهر بطيء منخفض الضفاف. وإذا كانت نسبة المفقود من ماء بحر الجبل عظيمة، فإن المفقود من ماء بحر الغزال أعظم، وكل ما يصل إلى النيل الأبيض من ماء هذا النهر هو نحو ٢٠ مترا مكعبا في الثانية طول العام. وذلك هو كل ما يستفيد به نهر النيل من حوض بحر الغزال الفسيح الكثير الأنهار. ولا عجب من هذا الوضع الخاص، إذ أن بحيرة نو وما يحيط بها من المستتعات كافية بأن يتخير من سطحها لا ما يأتي به بحر الغزال من المياه فقط، بل كذلك ما يحمله بحر الجبل.

وأمام هذا الفاقد الكبير من مياه بحر الغزال وروافده في منطقة المستتعات أصبح لزاما على حكومتى جمهورية مصر العربية والسودان أن يضعوا مشروعا دقيقا لحل هذه المشكلة. ويرى الباحث أن تعميق الجزء

الأدنى من مجرى كل من بحر الغزال وروافده يمثل حلا عمليا لتوفير المياه التي تصبغ في منطقة السدود والتي يقدرها هرسن بنحو ٢٠ ملياراً من الأمطار المكعبة سنوياً.

أما الروافد الرئيسية لبحر الغزال فتتمثل في بحر العرب وأنهر لل وجور وتنج وجل. وتتحد هذه الأنهار من المرتفعات التي تفصل مياه نهر الكنفو عن نهر النيل، وهذه تتحد كلها وتصب في بحيرة نو.

ويبدو من الجدول السابق أن معدل المتوسط اليومي لتصرف نهر السوايط عند المصب هو ٣٦ مليوناً من الأمطار المكعبة وهو تصرف معقول بالنسبة لطول النهر الذي لا يزيد على ٧٤٠ كيلومتراً، ولعل أهم ما يتصف به هذا النهر أنه لا تكتنف مجراه المستنقعات أو تبتت حوله الحشائش المائية والأعشاب إلا بقدر بسيط للغاية إذ أن كثرة رواسيه قد ساعدت على تكوين ضفاف عالية يجري وسطها النهر ولا يخرج عنها، والنهر معتدل الجريان وهو لا يكاد يخلو من الماء في أي وقت من أوقات السنة. ولو أن مياهه تقل قلة ظاهرة من فبراير إلى مايو ولا شك أنه لولا مياه السوايط الغنية بالرواسب والقوية التيار. لما تمكن النيل الأبيض من أن يخلق مجراه حتى الخرطوم، إذ أن مياه بحر الجبل الضعيفة الرواسب البطيئة التيار تبدو عاجزة عن حفر مجرى النيل الأبيض، ونهر السوايط مثل عملي واضح لأهمية تعميق الأجزاء الدنيا من مجرى أنهار جنوب السودان لكي نتخلص من قدر كبير من مساحة المستنقعات التي تسود في هذا الإقليم. هذا، ويكتتب نهر السوايط بحوالي ١٣,٥ مليار سنوياً في المتوسط لإيراد النيل. فهو بذلك يعوض بالتقريب نفس المقدار الذي يضيع في منطقة السدود من إيراد بحر الجبل.

وخلاصة القول أنه من المنتظر أن تقل الفواقد كثيراً إذا درست المجاري الرئيسية لجنوب السودان وزيدت سعتها المائية ويكون ذلك بالتوسع والتعميق وليس بإقامة الجسور إذ أن الأمطار الشديدة بالمنطقة لا تعطي الجسور الصناعية فرصة للتماسك والبقاء. كما أن تكاليف صيانتها ستكون باهظة جداً. وكما أن حيوانات المنطقة ستساهم في إتلاف هذه الجسور فكلما وجد فرس النهر قطعة جافة من الأرض سعى إلى تساقها

فتتهار أطرافها لتقل وزنه. والفيل يسير في قطعان يتراوح عددها بين الأربعة والستين وقد يبلغ أحيانا الثلاثمائة، ولا يخفى ما يسببه ذلك من اتلاف للجسور. أما التماسح فهو أهم الحيوانات المحلية بمنطقة السدود. ومن أهم طباعه الطريقة التي تخفي بها الأنثى بيضها. فهي تلجأ إلى الأرض العالية التي تشبه الجسور فتحفر فيها حفرة تتسع لحجمها وزيادة، وفي داخل هذه الحفرة تعمد إلى حفر عدة حفر صغيرة تخفي في أحدها بيضها. ولا شك أن هذه الحفر تضعف من قوة تماسك الجسور.

### ٣- مشروع القناة في إقليم السدود وأثره على مشروعات الري في مصر:

مما تقدم يبدو واضحا أن قدرا كبيرا من مياه بحر الجبل يضيع في منطقة المستنقعات ولاسيما مستنقعات جونجلي واواي وأعالي الزراف والزراف، إذ يقدر متوسط الفاقد في فترة إنخفاض النهر بنحو ٣٢٪ من تصرف منجلا ومتوسط الفاقد في فترة ارتفاع النهر بنحو ٥٠٪ من تصرف منجلا. لذلك يتجه التفكير إلى الأخذ بأحد المشروعين الآتيين:

أما المشروع الأول فيرمي إلى تعديل مجرى بحر الجبل بحيث يسمح بمرور ٦٥ مليون م<sup>٣</sup> من المياه مع فاقد بسيط، وهذا متوسط التصرف اليومي عند منجلا في شهري إبريل ومايو الذي ينتظر وصوله إلى أسوان في المدة الحرجة: يونيو ويوليو بعد اتمام المشروع. وبما أن مجرى النهر بين منجلا وبور يسمح بمرور هذا التصرف دون فاقد فيبدأ مشروع التوسيع والتعديل إلى الشمال مباشرة من بور وذلك لمسافة ٢٧٠ كيلومترا حتى قطعي الزراف. وعند قطعي الزراف لا يسمح لامتداد بحر الجبل بمرور تصرف أكثر من ثلاثين مليوناً من الأمطار المكعبة في اليوم في الفترة المذكورة وهو أقصى تصرف يوصله هذا الجزء من النهر إلى النيل الأبيض دون فاقد. أما باقي التصرف وقدره ٣٥ مليون متر مكعب في اليوم ينقسم بين:



- أ- مجرى بحر الزراف ويسمح له بمرور ١٥ مليون متر مكعب في اليوم وهو أقصى تصرف بدون فاقد.
- ب- يقترح إنشاء مجرى يجاور مجرى الزراف يسمح بتصرف قدره ٢٠ مليون متر مكعب في اليوم. ويبلغ طول هذا المجرى نحو ١٥٠ كيلومترا.
- وأهم النتائج الاقتصادية التي تنجم عن تنفيذ هذا الاقتراح :-

- أ- تقليل المدة اللازمة لوصول المياه من منجلا إلى النيل الأبيض إذ تقدر هذه المدة بنحو خمسة عشر يوما مما يساعد على ضبط التنبؤات الخاصة بالتصرفات الواردة عند أسوان.
- ب- تفادي الاتصال بمستنقعات بحر الغزال.
- ج- ضمان وصول تصرفات منجلا إلى النيل الأبيض يفاد بسيط جدا، وذلك في فترة الحاجة إليها بمصر (فبراير - يوليو).

وبين الجدول الآتي مدى ما تكسبه مصر من تنفيذ هذا الاقتراح، مع ملاحظة أن المدة لوصول المياه من منجلا إلى أسوان هي شهران بعد تنفيذ المشروع.

**التصرف بملايين الأمتار المكعبة في الشهر (١٩١٢-١٩٤٢)**

التاريخ عند منجلا	تصرفات منجلا	تصرف المستنقعات الحالية	المكسب بعد تنفيذ المشروع	التاريخ عند أسوان	المكسب عند أسوان بإعتبار فاقد ١٠٪
ديسمبر	٢١٨٠	١٣٦٧	٨١٣	فبراير	٧٣٢
يناير	١٩٧٠	١٣٠٤	٦٦٦	مارس	٦٠٠
فبراير	١٩٥٠	١٢٠٣	٦٤٧	أبريل	٥٨٢
مارس	١٨٠٠	١٠٩٥	٧٠٥	مايو	٦٣٥
أبريل	١٨٦٠	١١٠٥	٧٥٥	يونيو	٦٧٦
مايو	٢٣١٠	١١٥٨	١١٥٢	يوليو	١٠٣٧


هذا، ويصل المكسب عند المالكل إلى ٤,٧٣٨ وعند أسوان إلى ٤,٢٦٦ مليوناً من الأمتار المكعبة في السنة.

أما المشروع الثاني فيتلخص في شق قناة في منطقة المستنقعات تبدأ من جونجلي حتى مصب الزراف. وسيصل عمق هذه القناة إلى خمسة أمتار وعرض القاع إلى ١٢٠ متراً وستمكن القناة من صرف ٥٥ مليون متراً مكعباً من المياه في اليوم ويحمل النهر ١٠ مليون متر مكعب في اليوم في الفترة الحرجة. ويبدو أن المشروعين الأول والثاني يصلان إلى غرض واحد هو تخليص الفاقد في منطقة المستنقعات إلى الحد الأدنى حتى تستفيد مصر من تصرف منجلاً في الفترة الحرجة التي سبقت الإشارة إليها. ولكن المشروع الأول يبدو أقل نفقات من المشروع الثاني إذ أن المشروع الأول يستخدم النهر كثيراً بعد تعديل وتعميق المجرى.

وبعد تنفيذ مشروع القناة مع مشروع التخزين القرني في بحيرة فكتوريا عند جنادل أوين سوف يدبر لصالح مصر حوالي خمسة مليارات في السنوات المتوسطة الإيراد، وثمانية مليارات لسد العجز في السنوات الضعيفة الإيراد. وسيستخدم قدر من هذه المياه في تحسين المناوبات الصيفية وبذلك سيقتضي على مشكلة خطيرة من مشكلات الري الدائم في الدلتا إذ أن سوء المناوبات الصيفية كثيراً ما أدى ويؤدي إلى متاعب كثيرة وجرائم عديدة.

أما القدر الباقي من هذه المياه فيمكن أن يستغل في التوسع الزراعي في المناطق الآتية:

١,٥٠	مليون فدان	ي شمال الدلتا
١		ي مريوط غرب النوبارية
١		ي شمال سيناء
٠,٥٠		مال ترعة الاسماعيلية
٤		لمجموع



خريطة المطر السنوي في الشرق الأوسط



## الفصل الخامس

النطاق الجبلى المغربى فى الوطن العربى

## النطاق الجبلى المغربى فى الوطن العربى

### المحتويات

- نطاق جبال الأطلس.
- النطاق الشمالى للانتاج الزراعى
- نطاق الرعى والغابات
- نطاق النخيل
- الثروة المعدنية

### الخراائط

- ١ - المطر السنوى فى المغربى العربى
- ٢ - النباتات الطبيعية فى المغرب العربى

## النطاق الجبلي في الوطن العربي

دراسة في المظاهر الاقتصادية وآثارها على المجتمع العربي:

النطاق الجبلي في الوطن العربي يعتبر من أهم النطاقات التضاريسية من حيث تنوع مصادر الثروة الاقتصادية وذلك على الرغم من أنه لا يمثل أكثر من ربع المساحة الكلية التي تقدر بنحو ١١ مليون كيلومتر مربع، وتظهر السلاسل الجبلية ممثلة في جبال الأطلس بالمغرب العربي، والجبل الأخضر والجبل الطرابلسي وجبال تيبستي في الجماهيرية العربية الليبية والمرتفعات الجبلية على جانبي البحر الأحمر في مصر والسودان والمملكة العربية السعودية واليمن، والمرتفعات الاخدودية في غرب سوريا ولبنان وفلسطين، وجبال كردستان وزاجروس في شمال شرق وشرق العراق. وقد أطلق عرفيا على بعض هذه المرتفعات أنها جبال وهي في الواقع الجغرافي ليست جبالا بل حافات هضبية كما هو الحال في الجبل الأخضر والجبل الطرابلسي وهما حافات للهضبة العربية الليبية في افريقيا وآسيا. وسأستعرض الملامح الرئيسية للمظاهر الاقتصادية في جبال الأطلس التي تمثل أهم السلاسل الجبلية في الوطن العربي ومن أهم السلاسل الألبية في حوض البحر المتوسط.

### نطاق جبال الأطلس:

تمثل هذه السلاسل الجبلية العمود الفقري للمغرب العربي في تونس والجزائر والمملكة المغربية، إذ تنفرع من عقدة الأطلس العظمى التي يزيد ارتفاعها على ٣٠٠٠ مترا سلاسل جبلية في اتجاهات مختلفة فنحو الجنوب الغربي تمتد الأطلس الخلفية التي

يفصلها عن الأطلس العظمى وادي نهر سوس، ونحو الشمال الشرقي تمتد الأطلس الوسطى التي تنتهي نحو الشمال الغربي ممثلة في أطلس الريف وهما يحصران بينهما هضبة مراكش التي تبدو مفتوحة نحو الشمال الغربي فتستلم قدرا كبيرا من الأمطار، وتستمر أطلس الريف في اتجاهها نحو الشمال الغربي ثم تنتهي نحو الشمال الشرقي ممثلة في جبال سيرانفادا باسبانيا ويفصلها مضيق جبل طارق. ومن عقدة الأطلس العظمى هذه ونحو الشمال الشرقي تتفرع مجموعتان كبيرتان من السلاسل الجبلية هما الأطلس البحرية أو المجموعة الشمالية وأطلس الصحراء أو المجموعة الجنوبية وتحصران بينهما هضبة الشطوط وهي شبه مغلقة ولذلك لا تستلم الا قدرا بسيطا من الأمطار. وإلى الجنوب من سلاسل الأطلس تمتد مجموعة من المنخفضات الداخلية التي هبطت كرد فعل لتكوين هذه السلاسل العظيمة في أواسط الزمن الجيولوجي الثالث. وتتمثل هذه المنخفضات في مجموعتين كبيرتين وهما مجموعة العرق الشرقي ومجموعة العرق الغربي وتصلهما هضبة أولاد سيدي الشيخ، وهي امتداد للهضبة الأفريقية الكبرى. وفي هذه المنخفضات يمتد نطاق الواحات الكبير في المغرب العربي. ويزيد ارتفاع جبال الأطلس على ٢٠٠٠ متر بينما يتراوح ارتفاع هضبتي مراكش والشطوط بين ١٠٠٠-٥٠٠ مترا ويهبط نطاق الأحواض الجنوبية إلى أقل من ٢٠٠ متر، ويصل بعض أجزائه إلى أقل من ٣٠ مترا تحت سطح البحر كما هو الحال في منطقة بحيرات شط الجريد وشط ملرير في إقليم العرق الشرقي.

وهذه السلاسل الجبلية الضخمة لا تمثل عقبة في المواصلات إذ تكثر بها الممرات لتسهيل الاتصال بين السهول الشمالية والهضبات والأحواض الداخلية. وقد مدت عبر هذه الممرات



شبكة ضعيفة من الطرق والسكك الحديدية. ومن أهم هذه الطرق هذا الطريق الذي يربط بين مدينة مراكش على الهضبة المراكشية وتافيلالت في منخفض العرق الغربي الى الجنوب من الأطلس العظمى، وكذلك الطرق التي تربط بين مدن السهل الساحلي الشمالي مثل وهران والجزائر وتونس والواحات الجنوبية مثل فقيق وبسكرة وقفصة. ويعتبر ممر تازا من أهم الممرات الجبلية على الاطلاق وهو يربط بين مدن الهضبة المراكشية وحوض نهر السبوع من ناحية ووادي نهر مولوي من ناحية اخرى.

ومصادر المياه متوفرة في هذا النطاق الجبلي الكبير وهي المسؤولة عن تنوع الغطاء النباتي فتستقبل هذه الجبال قدرا كبيرا من الأمطار التي تتراوح بين ٤٠٠-٦٠٠مم على طول السهول الساحلية الشمالية والشمالية الغربية والتي تزيد على ٨٠٠مم على المنحدرات الشمالية لجبال الأطلس وعلى هضبة مراكش التي تستقبل الرياح الشمالية الغربية المحملة بالأمطار في فصل الشتاء لانها مفتوحة نحو الشمال الغربي. أما على هضبة الشطوط الداخلية وعلى المنحدرات التي تتحدر اليها فتقل الأمطار بحيث تتراوح ما بين ٢٠٠-٤٠٠مم لان هذا الاقليم الداخلي يقع في ظل المطر. أما نصيب الأحواض الداخلية فيبدو ضئيلا إذ يقل عن ٢٠٠مم، ومعنى هذا أن الزراعة في السهول الساحلية الشمالية والشمالية الغربية وعلى المدرجات الجبلية المطلة عليها يمكن أن تعتمد على مياه الأمطار في نصف السنة الشتوي بينما نجد أن الزراعة في الداخل لا بد لها أن تستعين أيضا بمياه الأنهار والآبار وهي متوفرة في هذا الاقليم.

والأنهار الرئيسية - وهي المصدر الثاني للمياه - تتمثل في المملكة المغربية في نهر مولاي الذي ينبع من غدة الأطلس الكبرى ثم يتجه نحو الشمال الشرقي ليصب في البحر المتوسط إلى الشرق من مدينة مليلة، ونهرا السبوع وأم الربيع وينبعان من الأطلس الوسطى ويخترقان الهضبة المراكشية نحو سهول المحيط الأطلسي، وقد أقيم على نهر السبوع سد يوفر مياه الري لنحو نصف مليون فدان كما أقيم على نهر أم الربيع سد آخر يوفر مياه الري لنحو ١٢٥ ألف فدان. أما نهرا سوس ودراع فينبعان من الممر الجبلي الذي يفصل بين الأطلس الخلفية والأطلس العظمى. ويتجه نهر سوس نحو الجنوب الغربي حتى يصب في المحيط الأطلسي عند أغادير، ويصنع نهر دراع قوسا كبيرا يتجه بعده نحو الجنوب الغربي إلى المحيط وهو يجف في فصل الصيف إذ يجري في إقليم صحراوي مرتفع الحرارة صيفا. وقد كونت هذه الأنهار أودية خصبة حملت إليها التربة من الجبال المجاورة، وأصبحت هذه الأودية مراكز الانتاج الزراعي الرئيسية في المغرب. ونهر شليف هو أكبر أنهار الجزائر وينبع من الأطلس البحرية ويمر بهضبة الشطوط ثم يصنع ثنية كبيرة مخترقا جبال الأطلس البحرية ليصب في البحر المتوسط إلى الشرق من وهران. وقد انشئ على هذا النهر في القسم الجبلي سد لتخزين نحو ٤ مليون متر مكعب تستغل في الري الصيفي. ونهر ماجردة هو النهر الرئيسي في تونس ينبع من الطرف الشمالي الشرقي للأطلس البحرية ثم يخترق القسم الشرقي من هضبة الشطوط ليصب في خليج تونس. وقد كون واديا خصبا ودلتا هي من أهم دلتاوات المغرب العربي وقد أقيم على هذا النهر ثلاثة سدود لتوفير مياه الري لنحو ١٣٠ ألف فدان فواكه وخضروات. ولا شك أن هذه الأنهار تمثل مصدرا مهما للمياه في المغرب العربي وقد استغلت في الري وأقيمت

عليها السدود لعمليات التخزين، كما استغلت بعض "منايع كمساقط مائية مهمة في توليد الكهرباء اللازمة للصناعة.

والمصدر الثالث للمياه في هذا الاقليم الجبلي هو المياه الجوفية المخزنة في الأودية الجافة التي تتحدر على جانبي أطلس الصحراء نحو هضبة الشطوط شمالا ونحو اقليم المنخفضات جنوبا ومن أشهر هذه الأودية وادي سوارا في العرق الغربي ووادي النسا في العرق الشرقي ووادي ناموس الجنوبي قرب واحة فقيق ووادي ناموس الشمالي الذي يمتد في القسم الأوسط من هضبة الشطوط. وتتركز في هذه الأودية الواحات وهي مراكز النشاط البشري والاقتصادي في هذا الاقليم الداخلي.

### النطاق الشمالي للإنتاج الزراعي:

ويسود هذا النطاق في السهول الساحلية والمقدمات الجبلية والأودية الجبلية. وقد تجمعت مقومات مختلفة لتشجيع نمو هذا النطاق من أهمها اعتدال المناخ ووفرة مصادر المياه وتربة البحر المتوسط السوداء الخصبة الغنية بالعناصر العضوية. هذا بالإضافة الى وفرة الأيدي العاملة اذ تتراوح الكثافة بين ٤٠-١٠٠ نسمة للكيلومتر المربع. ويشتهر هذا النطاق بزراعة الحبوب والفاكهة والمواالح<sup>١</sup> والزيتون ويبلغ متوسط انتاج الوطن العربي من القمح في السنوات الاخيرة نحو ٦ ملايين طن وهذا يعادل ما يقرب من ٣٪ من الانتاج العالمي ويساهم المغرب

<sup>١</sup> محمد صبيح عبد الحكيم وآخرون: الموارد الاقتصادية في الوطن العربي - ص ٥٢ وما بعدها.

العربي بنحو ٥٠٪ من الانتاج العربي للقمح موزعة بين الجزائر ٢٥٪ والمملكة المغربية ١٥٪ وتونس ١٠٪ ويقضي الانتاج عن حاجة الاقليم فيصدر الفائض الى الخارج. والشعير من الحبوب المهمة في الوطن العربي اذ يساهم بنحو ٤ ملايين طن أو ٤٪ من الانتاج العالمي. وتأتي المملكة المغربية في مقدمة الدول العربية انتاجا للشعير اذ تساهم بحوالي ١/٣ الانتاج العربي ويليهما بعد ذلك الجزائر التي تساهم ١/٤ الانتاج. وتتركز زراعة الشعير في وادي سوس ووادي دراع والأودية الجافة في الجزائر، حيث أن كمية الأمطار لا تسمح بزراعة القمح، وتعتبر المغرب الدولة العربية الثانية في انتاج الذرة بعد جمهورية مصر العربية في الوطن العربي ويزرع أساسا في وادي السبوع حيث يعتمد على مياه الري ويستهلك الانتاج كله محليا وهي تنتج حوالي ١٠٪ من الانتاج العربي.

ويكاد يركز الانتاج العربي للكروم على المغرب العربي الذي يساهم بنحو ٢,٧٥٠,٠٠٠ طن سنويا أو نحو ٨٥٪ من الانتاج العربي. تظهر مزارع الكروم على المنحدرات الشمالية للأطلس البحرية والأطلس العظمي وفي السهول الساحلية المجاورة لها وتنتج الجزائر وحدها ما يقرب من مليونين ونصف مليون طن. وتلعب الكروم دورا خطيرا في الاقتصاد الجزائري اذ أصبح النبيذ من أهم صادراتها وهي من أكبر الدول المصدرة للنبيذ في العالم وتسهم بنحو ٦٢٪ مما يدخل من النبيذ في التجارة العالمية. ويصدر معظم النبيذ الجيد الى فرنسا. أما كروم المملكة المغربية فتتركز مزارعها في اقليمي تازا ومكناس. وفي تونس تظهر مزارع الكروم حول خليج تونس وفي اقليم بنزرت الجبلي، وهي من أهم الغلات الزراعية اذ أن دخل البلاد منها يوازي نحو ٧ أمثال دخلها من القمح.

وتتمو أشجار الموالح على المدرجات الشمالية والشمالية الغربية للأطلس البحرية الأطلس العظمى، وفي بعض الأودية الجبلية، وعلى السهول الساحلية المجاورة، ولاسيما في وادي السبع وأم الربيع. وبدأ المغرب العربي يتوسع في زراعة الموالح في أعقاب الحرب العظمى الثانية حتى أصبح من أهم مناطق الانتاج في جوض البحر المتوسط وأصبح ينتج أكثر من  $\frac{1}{3}$  الانتاج العربي الذي يقدر بحوالي ١,٥ مليون طن. ويصدر المغرب العربي قدرا كبيرا من انتاجه الى أسواق غرب أوروبا قبل أن تنضج موالح إيطاليا وإسبانيا.

وتنتشر شجرة الزيتون على السفوح المنخفضة لجبال الأطلس المطلة على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. ويسهم المغرب العربي في الانتاج العالمي للزيتون بنحو ١٠٪ وتأتي تونس السادسة في الترتيب بين دول العالم المنتجة للزيتون وتسهم بحوالي ٤٪ من الانتاج العالمي تليها الجزائر والمملكة المغربية وتسهم كل منهما بنحو ٣٪ من الانتاج العالمي. تتركز زراعة الزيتون في تونس في الأطراف الشمالية الشرقية للأطلس البحرية ويقدر عدد الأشجار هنا بنحو ٣٠ مليون شجرة وتعتبر منطقة صفاقس أهم مناطق الزيتون في تونس وبها حوالي عشرة ملايين شجرة. وتساهم تونس بنحو ٢٠٪ من التجارة الدولية للزيتون وزيتته وتشغل بذلك المركز الثالث بين الدول المصدرة للزيتون. وفي الجزائر تعتبر مرتفعات القبائل أهم مناطق الانتاج إذ يتركز فيها نحو ٤٠٪ من مجموع أشجار الزيتون، وكثيرا ما تصدر الجزائر زيتها الجيد لتستورد أصنافا أقل جودة تناسب مع القوة الشرائية للسكان. ويقدر عدد أشجار الزيتون في كل من الجزائر والمغرب بنحو ١٣ مليون شجرة. ويتخصص كل من

أقليم الريف الجبلي والأطلس الوسطى في إنتاج الزيتون ويستهلك معظم الانتاج محليا.

وتجود زراعة التبغ على سفوح المرتفعات التي حولت الى مدرجات تضم حقولا صغيرة في ظل مناخ معتدل وقدر متوسط من الأمطار الشتوية وتربة خفيفة جيدة الصرف، وتتوفر هذه الميزات في المغرب العربي الذي يساهم بأكثر من ٦٠٪ من الانتاج العربي. وتأتي الجزائر في مقدمة الدول العربية إنتاجا للتبغ اذ تنتج وحدها نحو ٢٥ ألف طن سنويا أو ٥٠٪ من الانتاج العربي ويتركز هذا الانتاج أساسا في اقليمين هما جبال القبائل وجبال وهران في الأطلس البحرية، ويصدر أكثر من نصفه الى الخارج ويستهلك الباقي محليا. ويزرع التبغ في تونس في الأطراف الشمالية الشرقية من الأطلس البحرية، كما يزرع في المملكة المغربية في أطلس الريف ويساهم كل منهما بنحو ٥٪ من الانتاج العربي ويستهلك محليا.

### نطاق الرعي والغابات:

أما النطاق الاقتصادي الثاني فيتمثل في نطاق الرعي والغابات ويلاحظ أن المراعي تنو بازدهار بين الغابات على المنحدرات وفي الأودية الجبلية، ويمتاز الغطاء النباتي هنا بالتنوع للنباتين في مظاهر السطح وكميات الأمطار وأنواع التربة، فتظهر الغابات المعتدلة على المنحدرات الشمالية لجبال الأطلس حيث التربة الجبلية الخصبة والأمطار التي تزيد في معدلها على ٦٠٠مم. وتنتشر مراعي الاستبس في الأودية الحبلية وعلى الهضبات الداخلية ومنحدرات الأطلس الداخلية، اذ تقل كمية الأمطار عن ٤٠٠مم وتسود تربة الاستبس أو تربة

الحشائش السمرء وهي فقيرة نسبيا في المواد العضوية ما نباتات الصحراء فتظهر في الأحواض الجنوبية حيث تقل كمية الأمطار عن ٢٠٠مم.

ويحتل المغرب العربي المكانة الثانية في الوطن العربي بعد السودان من حيث غناه بالموارد الغابية ومن حيث المساحة التي تغطيها الغابات التي تقدر بنحو ١٢٪ من المساحة الكلية أو نحو ٨ مليون هكتار منها ٤ مليون هكتار في المملكة المغربية و٣ مليون هكتار في الجزائر ومليون هكتار في تونس.

وتظهر أشجار الأرز والصنوبر على القمم الجبلية والمنحدرات الشمالية التي يزيد ارتفاعها على ٢٥٠٠ متر، ويليهما بعد ذلك أشجار البلوط والفلين. أما المنحدرات المنخفضة فتغطيها أشجار الكافور والزيتون.

ومنطقة الغابات الرئيسية في تونس تتركز في الركن الشمالي الغربي الجبلي وتغطيه غابات من الفلين والبلوط والصنوبر، ووضعت الدولة مشروعا للتشجير حولت نتيجة له بضعة آلاف من الهكتارات الى الغابات. وفي الجزائر قد قطعت مساحات كبيرة من الغابات وزحفت الزراعة والمراعي اليها ثم بدأت الحكومة في اعادة تشجير بعض هذه الأراضي وذلك منذ عام ١٩٥٠م ولكن مشروع التشجير يسير ببطء اذ لم يزرع سنويا أكثر من ٢٥ ألف فدان. وفي المملكة المغربية تتركز الغابات على طول المنحدرات الشمالية الغربية للأطلس العظمى والوسطى وأطلس الريف. تهتم الدولة اهتماما كبيرا بالمحافظة على الثروة الغابية وتشجير المساحات التي قطعت أشجارها وتكثر في هذه الغابات أشجار الفلين والأرز والبلوط والصنوبر.

وتبلغ كمية الخشب التي تقطع سنويا أكثر من مليون ياردة مكعبة من الأخشاب الجيدة. هذا بالإضافة الى كميات اخرى من خشب الوقود. وأشجار الفلين تعتبر من أهم أشجار الغابات المعتدلة. ويصدر الفلين الى أسواق العالم وتصنع منه رقائق الفلين التي تستخدم في تغطية بعض ملاعب كرة السلة وسقوف وجدران دور السينما الكثيرة والمسارح المهمة للاحتفاظ بقوة الأصوات ونقاوتها كما يدخل الفلين في كثير من الصناعات الاخرى.

واذا كانت غابات المغرب العربي تمثل أهم الغابات المعتدلة في الوطن العربي فان غابات جنوب السودان تمثل الغابات المدارية الحارة في الاقليم كله وتغطي مساحة لا تقل عن ٣٠٠ ألف كم مربع أو ما يوازي ١٢٪ من مساحة البلاد. وتعد هذه الغابات موردا هاما للخشب الجامد الذي يؤخذ من أشجار التاك والماهجنى وغيرهما من الأنواع التي تستخدم أخشابها في صناعة الاثاث والمباني. ويبلغ الانتاج السنوي نحو ٣٠٠ ألف قدم مكعب من الأخشاب الجيدة. ويجدر أن نشير أيضا الى غابات السنت في غرب السودان في دارفور وكردفان حيث تنتج أكثر من ٧٠٪ من الصمغ السوداني المعروف وتعد الأبيض أكبر أسواق الصمغ العربي في العالم. ويستخدم في كثير من الصناعات الكيميائية والطبية.

ومراعي المغرب العربي غنية بمحصول الحلفا وبثروتها الحيوانية المتنوعة. وهذه المراعي من نوع السهوب أو الاستبس وتنمو على المنحدرات الداخلية وفي الأودية التي تتساب الى هضبة الشطوط حيث تتراوح كمية المطر الساقطة بين ٢٥٠-٦٠٠ مم. وتغطي هذه المراعي مساحة تزيد على ٥٠ مليون هكتار موزعة ما بين الجزائر ٤٠ مليون والمملكة



المغربية ٧,٥ مليون هكتار وتونس ٢,٥ مليون. وفي المملكة المغربية تنتشر مراعي الاستبس فوق المنحدرات الجنوبية للأطلس العظمى والخلفية وفي وادي سوس ووادي أم الربيع. وفي الجزائر تنمو المراعي فوق هضبة الشطوط ولاسيما في الأودية العديدة التي تقطعها وكذلك على المنحدرات المشرفة على الضبة. وتظهر في تونس في الأطراف الشرقية من هضبة الشطوط وإلى الجنوب من أطلس الصحراء. وتعطي تونس مثالا جيدا لتتابع النطاقات النباتية والزراعية بشكل واضح ففي السهول الشمالية والمقدمات الجبلية يظهر نطاق الكروم يليه نطاق الزيتون على الأطلس البحرية ثم نطاق المراعي على الهضبة وأخيرا نطاق النخيل في الجنوب. وتقدم هذه المراعي ثروة ضخمة من حشائش الحلفا التي تعد مادة خام لصناعة الورق الجيد. ويصدر منها سنويا كميات كبيرة إلى الخارج ولاسيما إلى غرب أوروبا وقد قامت بعض الشركات باستغلال هذه الحشائش استغلالا علميا منظما لغرض التصدير. وهي تنمو في إقليم الأطلس حيث تسقط الأمطار بكمية لا تقل عن ٤٠٠مم وتنمو هذه الحشائش في التربة الملحية الجافة حول مناطق الشطوط المعروفة مثل شط الهدنة والشط الشرقي. وتنمو أيضا فوق الكثبان الرملية التي تظهر عند الأطراف الشرقية للأطلس. وتستخدم الحلفا في صناعات أخرى غير صناعة الورق مثل صناعات الحبال والحصار والاحذية الشعبية والمكائس والفرش وغير ذلك. ويمكن أن تلعب الحلفا دورا مهما في اقتصاديات هذا الإقليم إذا أحسن استغلالها وتم تصنيعها محليا نظرا لأهمية مادة السليولوز التي تعد الحلفا من أغنى النباتات الطبيعية بها والتي تعد مادة خام تدخل في كثير من الصناعات الهامة. وقد بدأت الزراعة تزحف على أراضي الرعي في بعض المناطق ولاسيما في الأودية التي تتوفر فيها المياه الجوفية مثل وادي سوس

ووداي أم الربيع ووادي سوارا ووادي النسا الا أن هناك بعض العوائق التي تعطل من التوسع الافقي ومن أهمها، انتشار التربة الملحية وضعف شبكة المواصلات وقلة الأيدي العاملة الفنية.

وبلاد المغرب العربي من أغنى البلاد العربية في الثروة الحيوانية فهي تمتلك نحو ٤٥٪ من أعنام وماغر الوطن العربي وتحو ٢٥٪ من الأبقار. وتنتشر الماشية في السهول الساحلية والمقدمات الجبلية حيث يزداد الغنى النباتي وتطول الحشائش بسبب اعتدال المناخ وتوفر الأمطار المناسبة، بينما تزيد الأعنام والماعز فوق الهضبات وعلى السفوح الداخلية للجبال. أما الإبل فتوجد في الأحواض الداخلية حيث يقل المطر وتطغى مظاهر الصحراء ونصيب المغرب العربي من الإبل ضئيل فلا يزيد على نحو نصف مليون رأس.

والعامل الرئيسي الذي يؤثر في الانتاج الحيواني في كل الوطن العربي هو التنذب أو عدم سقوط الأمطار في مناطق الرعي بحيث تتفاوت الكمية الساقطة من سنة الى اخرى فينعكس هذا الوضع المناخي على الحياة النباتية من حيث الغنى أو الفقر وما يترتب على ذلك من نمو أو اضمحلال في الثروة الحيوانية. فبينما نجد أن معدل المطر السنوي في مدينة الجزائر هو ٧٦٠مم اذ بهذا المعدل ينخفض في بعض السنوات الى ٣٠٠مم وقد يزيد في سنوات اخرى الى ١٠٠٠مم. وفي بغداد يبلغ معدل المطر السنوي ٤٠مم وهو ينخفض الى ٥٠مم كما حدث في ١٩٠٧، أو يرتفع الى ٤٤٠مم كما حدث سنة ١٨٨٨، وكثيرا ما تعاني السودان من هذه النذبية في الأمطار وتزداد وضوحا وأثرا كلما اقتربنا من حدود الصحراء وينطبق التنذب أيضا على موعد بدء موسم الأمطار وانتهائه فقد يأتي المطر مبكرا

وقد يأتي متأخرا وينعكس كل ذلك على النبات ويدوره على الحيوان، ويؤدي هذا التذبذب في كميات المطر الى كوارث اقتصادية بسبب هلاك أعداد كبيرة من الحيوان. وقد حدث أن أصيبت بعض مناطق الرعي في المملكة المغربية بالجفاف ففقدت نحو ٩٠٪ من ثروتها الحيوانية.

وإذا تتبعنا التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانية في المغرب العربي نلاحظ أنه يمتلك ثروة ضخمة من الأغنام تقدر بنحو ٢٥ مليون رأس يخص المملكة المغربية وحدها من هذا العدد نحو ١٤ مليون رأس فهي تأتي في المرتبة الأولى من حيث الثروة الغنمية ويليهما في ذلك الجزائر ٧ مليون رأس وتونس ٤ مليون رأس. والثروة الغنمية كافية للاستهلاك المحلي بل وهناك فائض للتصدير في معظم السنوات ولاسيما في تونس. وتتقسم الضأن في بلاد المغرب الى نوعين رئيسيين هما الضأن الجبلي وضأن السهول وينتشر النوع الأول على المنحدرات الجبلية بينما يسود النوع الثاني في الأودية والسهول الساحلية ولاسيما سهول شرق تونس. وبلاد المغرب العربي أغني البلاد العربية في ثروتها من الماعز اذ تمتلك ما يقرب من نصف الماعز العربية أو نحو ١٤ مليون رأس منها ٩ مليون في المملكة المغربية و٣,٥ مليون رأس في الجزائر و١,٥ مليون رأس في تونس. وتربى هناك جنبا الى جنب مع الأغنام وفي الجهات الداخلية الفقيرة في أعشابها، ويسود المغرب العربي في ثروته من الأغنام والماعز لان المراعي هنا أكثر ملائمة لهذا النوع من الثروة الحيوانية.

أما عن الماشية فبلاد المغرب العربي بأقطارها الثلاثة تحتل المكانة الثانية من حيث الأعداد التي تمتلكها من الأبقار اذ تقترب ثروتها من أربعة ملايين رأس أي نحو ربع الأبقار العربية

ويوجد في المملكة المغربية وحدها نحو ٢,٥ مليون رأس. والأبقار العربية خليط من النوع الأفريقي المعروف بالزبو Zebo والنوع الهندي Bos Indicus والنوع الأوروبي Bos Taurus. وهذا أمر طبيعي فقد تبعت عمليات الغزو المتعددة ادخال أنواع مختلفة من الأبقار. وتربى الأبقار في بلاد المغرب على المقدمات الجبلية وفي السهول الساحلية قرب المدن الرئيسية وأيضاً في الأجزاء الدنيا من الأودية الجبلية. وتشتهر أبقار بلاد المغرب بصغر حجمها نتيجة لتذبذب كميات المطر إذ أن صغر الحجم هو في الواقع نوع من الاقلمة أو التكيف لظروف البيئة المحلية. والمغرب العربي لا يعرف الجاموس وهو في الواقع ليس معروفاً في كل الوطن العربي الا في اقليم الأهوار بجنوب العراق وفي جمهورية مصر العربية ولاسيما في دلتا النيل فهو يتركز في الأماكن التي تكثر فيها المجاري المائية والتي يعتدل مناخها نوعاً من حيث الحرارة إذ أنه لا يتحمل الحرارة مع الجفاف كما لا يتحمل البرودة.

ويجدر بنا أن نشير أن مراعي الاسبتيس في المغرب العربي بنوع خاص وفي شمال كل من ليبيا والعراق وسوريا وفي لبنان وفلسطين تختلف تماماً عن مراعي السفانا في وسط وجنوب السودان تلك المراعي التي تعتمد على الحرارة المرتفعة والأمطار الصيفية فحيث تتراوح الأمطار بين ٩٠٠-١٥٠٠ مم تنمو الحشائش التي يزيد ارتفاعها على ثلاثة أمتار وهذه هي السفانا الغنية في جنوب السودان والتي تظهر كبساط أخضر نضر تصل الحشائش في طولها الى مستوى الشجيرات المتناثرة مما يجعل الانتقال صعباً وعسيراً. وعندما يأتي فصل الجفاف بين نوفمبر وفبراير تجف هذه الحشائش بسرعة. ومنطقة السفانا في الجنوب هي موطن الماشية التي تنتشر بأعداد كبيرة

### نطاق النخيل:

ويظهر في الواحات التي تتركز في بطون الأودية الجبلية الى الجنوب مباشرة من الأطلس الداخلية والأطلس العظمى وأطلس الصحراء. ويقدر عدد نخيل التمر في بلاد المغرب بوحداثها السياسية الثلاثة بنحو ١٧ مليون نخلة تنتج سنويا حوالي ١٩٠ ألف طن أو ما يعادل ١٨٪ من جملة الانتاج العربي. وتسهم الجزائر وحدها بحوالي ٩٪ من الانتاج العربي ويليهما في ذلك المملكة المغربية ٦٪ وتونس ٣٪.

وانتاج الوطن العربي من التمر يزيد قليلا على مليون طن وهذا يمثل ما يقل عن ٨٥٪ من الانتاج العالمي للتمر. وهكذا يبدو أن الانتاج العالمي للتمر يكاد يتركز في الوطن العربي، ويأتي العراق وجمهورية مصر العربية في مقدمة الدول العربية المنتجة للتمر اذ يساهم كل منهما بنحو ٣٠٪ من الانتاج العربي وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة ١٥٪ ثم الجزائر بنسبة ٩٪ ويقدر عدد أشجار النخيل في الجزائر بنحو ١٠,٥ مليون نخلة تنتج نحو ٩٥ ألف طن.

وتتركز أهم مناطق الانتاج في الجزائر في الواحات الجنوبية ولاسيما في بسكرة والأغواط وعين صفراء. ومعظم انتاج الجزائر من الأصناف الجيدة التي تعد للتصدير وفقا لأحدث الطرق وهي تنافس في ذلك التمر العراقي في بعض الأسواق الأوروبية والأمريكية. ومعظم صادرات الجزائر من التمر تأخذ طريقها الى أوروبا ولاسيما فرنسا وإيطاليا وبريطانيا مستفيدة في ذلك من موقعها الجغرافي مطلة على البحر المتوسط. ويصدر تمر العراق الى كثير من دول العالم وتأتي الدول الآسيوية في

مقدمة دول العالم استيرادا للتمر العراقي اذ تستأثر بنحو ٧٠٪ من جملة الصادرات ومن بينها تشغل الهند المركز الأول وتليها اليابان فسوريا فالمملكة العربية السعودية فباكستان وتأتي جمهورية مصر العربية في مقدمة الدول الافريقية استيرادا للتمر العراقي ويليهما السودان فالصومال. والعراق أعظم مصدر للتمر في العالم، وتمثل صادراته نحو ٨٠٪ من جملة ما يدخل من التمر في التجارة العالمية. أما الجزائر فهي الدولة العربية الثانية في تصدير التمر. والدول العربية الاخرى تستهلك معظم انتاجها محليا.

وفي المملكة المغربية يقدر عدد أشجار النخيل بنحو ٤ مليون نخلة تنتج حوالي ٦٠ ألف طن من التمر. وينمو معظم النخيل في الواحات الى الجنوب من الأطلس العظمى، ومن أهمها واحات فجيج وتافيلالت ووادي دراع وهو أهم وأجمل منطقة لزراعة النخيل في المغرب ويروى النخيل هنا من مياه نهر دراع. أما نخيل الجهات الاخرى فيروى بمياه الآبار ويستهلك معظم الانتاج محليا.

ويبلغ عدد النخيل في تونس نحو ٢,٥ مليون نخلة تعطي نحو ٣٠ ألف طن من التمر. ويتركز الانتاج في واحات قابس وشط الجريد التي تنتج أجود الأنواع ويستهلك أكثر الانتاج محليا. وتصدر كميات قليلة تبلغ حوالي ٢٥٠٠ طن الى فرنسا وإيطاليا ويوغسلافيا.

لما عن المعادن فيتركز معظمها في النطاق الجبلي ونخص بالذكر الحديد والمنجنيز والفوسفات.<sup>١</sup>

ويبلغ الانتاج العالمي من خام الحديد نحو ٥٠٠ مليون طن يساهم فيها الوطن العربي بنحو ٧ مليون أو ١,٥٪ وإذا كان انتاج البلاد العربية من الحديد يبدو متواضعا الا أنها تساهم بقدر أكبر في تجارة الحديد الدولية فهي تسهم بنحو ١٢٪ مما يدخل من الحديد في التجارة الدولية، وتصدر الجزائر أكثر من نصف هذه النسبة، كما أنها تنتج أكثر من ٥٠٪ من الحديد العربي وأهم مناجم الحديد الجزائري هي مناجم عونزة في جبال الأطلس البحرية قرب الحدود التونسية ومناجم بني صاف في أقصى الغرب ومناجم جبل بوعمران في القسم الأوسط من الأطلس البحرية. وقد ثبت وجود كميات كبيرة من الحديد قرب الحدود المغربية عند تندوف في إقليم الأطلس الخلفية، ويقدر احتياطي الحديد هنا بنحو ٢٥٠٠ مليون طن غير أن استغلال حديد تندوف لم يبدأ بعد لضعف المواصلات اليه وقلة الأيدي العاملة الفنية.

ويتركز الحديد التونسي في الاقليم الجبلي قرب الحدود الجزائرية في مناجم سلاطة والجريصة بمنطقة التل العليا كما توجد بعض المناجم في منطقة التل الشمالية، وتنتج تونس ما يقرب من ١,٥ مليون طن.

<sup>١</sup> محمد رياض، كوش عبدالرسول: الاقتصاد الافريقي - القاهرة ١٩٦٣ - ص ٢٤٠ ومابعدها.

وأما في المملكة المغربية فيستخرج الحديد من مناجم جنيغرة في الأطلس العظمى ومناجم مليلة في إقليم أطلس الريف. ويصل الانتاج الى حوالي مليون طن.

ويصدر معظم حديد المغرب العربي الى دول غرب أوروبا ولاسيما المملكة المتحدة وبعض الدول الأمريكية. ولا يصدر الى فرنسا لأن انتاجها المحلي يزيد على استهلاكها وهناك فائض للتصدير الى الخارج.

وأما عن المنجنيز فينتج الوطن العربي نحو نصف مليون طن أو ما يعادل ٩% من الانتاج العالمي. ويتركز الانتاج أساسا في المملكة المغربية في الوديين الجبليين سوس ودراع وفي منطقتي بوعرفة والعيون بالجلال الشرقية. ويبلغ معدل الانتاج نحو ٣٥٠ ألف طن يصدر معظمه الى الخارج. وفي الجزائر يوجد خام المنجنيز في جبل جتارا في الجنوب الغربي وتقدر امكانيته الانتاجية بحوالي ٥٠ ألف طن سنويا. ويدخل المنجنيز في صناعة السبائك الحديدية ليكسبها صلابة ومقاومة للتآكل والصدأ.

ويساهم المغرب العربي بنحو ٩٠% من انتاج الفوسفات في البلاد العربية، وتأتي المملكة المغربية في صدر القائمة بانتاجها الذي يزيد على ٦,٢٥٠,٠٠٠ طن، وتأتي تونس بعدها بانتاج يقدر بنحو ٢,٢٥٠,٠٠٠ طن. أما الجزائر فتصيبها يزيد قليلا على نصف مليون طن سنويا. ويتركز الانتاج في المناطق



الجبليّة. ويعد المغرب العربي من أكبر مناطق العالم إنتاجا للفوسفات إذ تنتج أقطاره الثلاثة نحو تسعة ملايين طن سنويا وترتفع نسبة الخام فيه فيصل الى نحو ٧٥٪ في بعض الجهات. ويستخدم الفوسفات في صناعة الأسمدة التي تحتاج إليها بعض المزروعات وهو في حالته الطبيعيّة لا يصلح كسماد لانه لا يذوب بسهولة في الماء ولذلك يعالج بحامض الكبريتيك فيتحول الى سوبر فوسفات سهل الذوبان في الماء فيمتصه النبات. وفي المملكة المغربية يتركز الانتاج في مناجم وادي زم الذي يأخذ من الأطلس الوسطى، ويصدر الانتاج من الدار البيضاء الى إيطاليا واسبانيا وبلجيكا وجنوب افريقيا. وفي تونس يوجد خام الفوسفات على شكل طبقات عظيمة السمك والامتداد، في منطقتين رئيسيتين هما منطقة حفصة في الأطراف الجنوبيّة الشرقية من أطلس الصحراء والى الشمال من منخفض شط الجريد ومنطقة عين كرمة في الأطلس البحريّة والمنطقة الأولى على اتصال جيد بميناء صفاقس بينما الثانية ترتبط بخط حديدي وشبكة من الطرق بميناء تونس حيث يصدر الانتاج الى الخارج. وطبقا لمشروعات التنمية للثروة المعدنية لوحظ أن ارتفع انتاج تونس من الفوسفات الى ٣ مليون طن سنة ١٩٨١م وما بعدها، والمستهلك الأول لفوسفات تونس هو فرنسا اذ يصدر إليها نحو ٣٠٪ من الانتاج بينما تستوعب إيطاليا نحو ٢٣٪ وكل من البرازيل وأوغندة بين ٣٪ ، ٤٪، والباقي يصدر الى القارة الأوروبية عدا نحو ٢٠٠ ألف طن تستيقها البلاد لصناعة السوبر فوسفات. أما نصيب الجزائر الذي يقدر بنحو نصف مليون طن أو أزيد قليلا فيوجد على شكل تكوينات واسعة الانتشار غير أن نسبة المعدن فيه تنخفض الى ٥٠٪ ويتركز الانتاج في اقليم كريف في الأطلس البحريّة عند الحدود التونسية،

ويصدر معظم فوسفات الجزائر الى الأسواق الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا.

هذه هي الملامح الرئيسية للمظاهر الاقتصادية في النطاق الجبلي بالمغرب العربي، ويمكن أن نستخلص الحقائق الهامة الآتية وهي لا تنطبق فقط على المغرب العربي بل تبدو واضحة في الاقاليم العربية الاخرى:

#### أولاً:

تتذبذب متوسط انتاج الفدان بين فترة واخرى لتتذبذب كميات الأمطار من سنة الى أخرى. ومعنى هذا أن أي توسع زراعي يجب أن يعتمد على مشروعات الري وليس على كميات الأمطار. وكل الدول العربية تعاني من هذه المشكلة. ولعل خير مثال لهذه الظاهرة ما تعاني منه سوريا في بعض السنوات من نقص في الأمطار. ففي اقليم حلب بسوريا بلغت كمية المطر التي سقطت في الموسم الزراعي ١٩٥٣-١٩٥٤ نحو ٥١٤مم بينما انخفضت هذه الكمية الى ١٨٣مم في موسم ١٩٥٩-١٩٦٠، وقد ترتب على هذا أن هبط انتاج القمح في سوريا من ٩٦٥ طن الى ٥٣٣ طن في موسم ١٩٥٩-١٩٦٠. ويلاحظ أن مساحة الأراضي الزراعية التي تعتمد على الري تمثل نسبة صغيرة من مجموع مساحة الأراضي الزراعية اذ تصل هذه النسبة في المغرب الى ٣٪ أو ٢٢٠ ألف هكتار وفي الجزائر ٣,٥٪ أو ٢٤٥ ألف هكتار وفي تونس ٠,٧٪ أو ٣٠ ألف هكتار، وهي في سوريا ١٤٪ أو ٥٩١ ألف هكتار. وقد بدأت دول المغرب العربي في استغلال بعض الخنادق النهرية الجبلية بتحويلها الى خزانات ل تخزين المياه الزائدة وذلك باقامة سدود عليها كما أشرنا

من قبل. وتأتي العراق في مقدمة الدول العربية التي استفادت من هذه الخوانق النهرية فأقامت السدود على معظم الانهار الجبلية التي تأخذ من جبال زاغروس وكرديستان وتتساب نحو نهر دجلة كما هو الحال في نهر الزاب الكبير ونهر الزاب الصغير ونهر دياي. وتستغل هذه المياه في التوسع الزراعي كما يستغل سقوط المياه عند السدود في توليد الكهرباء، وهذا بالإضافة الى تنظيم الفيضانات النهرية فلا تتكون المستنقعات ولا تهدد الزراعة والمدن بالفيضانات العالية.

### ثانيا:

ضعف الانتاج: فالانتاج الزراعي أقل بكثير من امكانيات الأرض اذ أن متوسط انتاج الفدان لا يزال أقل من متوسط الانتاج العالمي بما يتراوح بين ١٠، ٢٠٪ ومرجع هذه الظاهرة الى عوامل كثيرة من أهمها قلة استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الزراعة وعدم اختبار التقاوي المناسبة وقلة استخدام الأسمدة، فيجب التوسع في البحوث العلمية الزراعية لكي تحدد أجود الأصناف التي تصلح في الأراضي المختلفة ومتى أثبتت التجارب جودة صنف من الأصناف ووفرة محصوله وقوة مقاومته للأمراض وسهولة تصريفه في الداخل أو في الخارج عمن استعماله وحرم استعمال غيره ويكون ذلك عن طريق التوسع في الجمعيات الزراعية التعاونية التي توزع على الزراع البذور أو الشتلات المنتقاة.

وهنا يجب أن أشير الى ضرورة تنويع الانتاج وادخال محاصيل جديدة كلما سمحت الظروف بذلك. ولاشك أن تنويع الانتاج يؤدي الى تقليل المخاطر الاقتصادية التي يتعرض لها

الزراع والتي تنجم عن التقلبات الجوية أو الاصابة بالآفات الزراعية أو تغيير في أحوال السوق مما يؤدي الى انخفاض الأسعار ومن البديهي أن هبوط الأسعار لا يطرأ في وقت واحد لكل الحاصلات فتتويع الانتاج يؤدي الى توزيع المخاطر.


### ثالثاً:

ضعف شبكة المواصلات: مما يعرقل التوسع الزراعي واستغلال الثروة المعدنية والاستفادة من الامكانيات السياحية اذ تتركز هذه الشبكة في السهول الساحلية وتمتد منها خطوط قليلة نحو الداخل. وتوجد مساحات واسعة في هضبة الشطوط واقليم الأحواض الداخلية تفتقر الى خطوط المواصلات مما عرقل نمو الانتاج الاقتصادي الزراعي والرعي والمعدني. والسياحة اليوم أصبحت مورداً من أهم الموارد الاقتصادية ووسيلة ناجحة للتنمية الاقتصادية وفضلاً عن هذا فهي أداة فعالة للتقارب بين الشعوب والتعاون بينها، ففي صيف ١٩٦٦م مثلاً قد زار إيطاليا ١٠ مليون سائح وزار اسبانيا ١٤ مليون سائح فانتعشت البلاد وعم الرخاء. والمغرب العربي يتمتع بامكانيات سياحية عظيمة فهو يضم ثروة أثرية نادرة تجمع بين الآثار الفينيقية والرومانية والاسلامية، هذا بالإضافة الى المناظر الطبيعية الرائعة في جباله وأوديته، تلك المناظر التي تفوق في جمالها أجمل مناظر جبال الألب في أوروبا. ويتمتع بلاد المغرب بمناخ معتدل جميل وشمس مشرقة وشواطئ ممتازة تجعلها قبلة الأنظار. الا أن ضعف شبكة المواصلات قد قلل من الاستفادة بهذه الثروة السياحية المتنوعة فالبلاد في حاجة ماسة الى الاهتمام بشبكة المواصلات والتوسع في انشاء الفنادق المناسبة للسياحة في

المناطق الجبلية المتعددة والقيام بدعاية علمية واسعة لتعريف العالم بهذه الثروة السياحية المتنوعة النادرة.


هذه هي المشكلات الرئيسية الثلاث من تنبذب في كمية الأمطار وضعف في الانتاج وفقر في شبكة المواصلات مما أدى الى عرقلة في التوسع الاقتصادي وقلة في الدخل العام وبطء في نمو السكان، ولاشك أن الحكومات المغربية تعمل جادة في التخلص من هذه المشكلات بعد أن نالت هذه البلاد استقلالها وتمتعت بنسيم الحرية وأخذت مكانتها مرفوعة الرأس بين الدول الحرة المستقلة.





( قلا عن : المغرب العربي - دكتور ابراهيم رزقانه )

النباتات الطبيعىة  
في  
المغرب العربي



( نقلاً عن : المغرب العربي — دكتور ابراهيم وزقانه )



## الفصل السادس

### الأهمية الاقتصادية للموانئ العربية



## الفصل الثالث

### الأهمية الاقتصادية للموائى العربية

#### مقدمة:

#### ١- موائى الممرات الجبلية:

الدار البيضاء.  
الجزائر.  
وهران.  
تونس.  
طرابلس.  
بنغازي.  
بيروت.

#### ٢- الموائى البترولية:

البريقة.  
الحريقة.  
رأس لانوف.  
السدره.  
الزويتينة.

### ٣- موانئ الأودية النهرية:

الاسكندرية.  
البصرة.

### ٤- موانئ المضائق البحرية:

طنجة.  
عدن.

### ٥- أهمية قناة السويس:

وصف القناة.  
أهميتها التجارية والبتروولية.

### ٦- موانئ الصيد:

أهمية الثروة المائية.  
بعض موانئ الصيد.

### ٧- بعض مشاكل الموانئ العربية.

## الأهمية الاقتصادية للموانئ العربية

يتمتع الوطن العربي بموقع جغرافي ممتاز اذ يقع بمساحته التي تزيد على ١١ مليون كيلومترا مربعا عند ملتقى القارات الثلاث افريقيا وأوروبا وآسيا. فأصبح بذلك المركز تتجمع عنده الطرق العالمية الرئيسية عبر هذه القارات.

ومما زاد في الأهمية أن الوطن العربي يمتلك سواحل طويلة تطل على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي فظهرت موانئ رئيسية تلعب دورا مهما في ابراز الأهمية الاقتصادية للاقليم. ويلاحظ أن كل الدول العربية لها منافذ على مسطحات بحرية مهمة بما في ذلك المملكة الاردنية التي تطل على خليج العقبة بمنفذ ضيق نشأت عنده ميناء العقبة.

وهذه الموانئ تخدم سوقا عربية متنوعة الانتاج فالتوسع رقة الوطن العربي وتعدد اقاليمه المناخية أدى الى تنوع الانتاج الزراعي والرعي والمعني ولذلك تعددت الموانئ ذات الوظائف المختلفة.

وتتقسم الموانئ العربية من حيث النشأة والخدمات الى: موانئ الممرات، وموانئ البترول، وموانئ الأودية النهرية، وموانئ المضائق البحرية، وموانئ قناة السويس، واخيرا موانئ الصيد.

أما موانئ الممرات الجبلية والطرق القديمة فهذه تتمثل في الدار البيضاء والجزائر ووهران وتونس وطرابلس وبنغازي وبيروت. وهي تقع قرب ممرات جبلية وعد نهاية طرق قديمة

مهمة. فالدار البيضاء تنتهي عندها الطرق الآتية عبر ممرى نزا ومراكش. وممر نزا يربط بين وادي نهر ملوية الغني بانتاجه الزراعي وهضبة مراكش الغنية بمراعيها المتنوعة. وممر مراكش يربط بين وادي نهر تتسيفت وهو من أهم مراكز انتاج الجيوب وبين اقليم العرق الغربي أو المنخفض الغربي خلف الأطلس العظمى وهو اقليم رعوي هام وغني بثروته المعدنية.

وتمتاز الدار البيضاء بخليج طبيعي متسع جعلها الميناء الأول في المملكة المغربية وتلقى عندها كل الطرق الرئيسية للبلاد. وهي خامس مدينة كبرى في افريقيا بمعدل سكاني يزيد على مليون نسمة. وهي أكبر مركز لتصدير الفوسفات في الوطن العربي اذ تقع على مقربة من هضبة الفوسفات في المملكة المغربية حيث تنتج أكثر من ٦ مليون طن أو ٦٠٪ من الانتاج العربي وهي قريبة من مناجم الحديد التي تنتج نحو ١,٥ مليون طن سنويا يصدر معظمه الى الخارج. وهي تحتكر كل تجارة الدولة تقريبا.

وأما ميناء الجزائر فتقع عند رأس ممتدة نحو البحر المتوسط. والمدينة تتوسط سهل متيجة الضيق الذي يحاط بجبال القبائل من الشرق والجنوب وجبال الظهراء من الغرب. والمدينة تشرف على أهم ممرات جبال الأطلس البحرية وتنتهي عندها الطريق التجاري الهام الذي يمتد مخترقا جبال الأطلس وهضبة الشطوط وأطلس الصحراء ثم عبر هضبة الحجاز الى حوض النيجر في افريقيا السوداء.

ونتيجة لهذا الموقع الممتاز تتحكم الجزائر في أكثر من ٥٠٪ من تجارة الاقليم وتأتي الكروم في مقدمة الصادرات إذ تنتج جمهورية الجزائر وحدها نحو ٢,٥ مليون طن من الكروم أو نحو ٨٥٪ من الانتاج العربي. وتلعب الكروم دورا خطيرا في الاقتصاد الجزائري إذ أصبح النبيذ من أهم صادراتها وهي من أكبر الدول المصدرة للنبيذ في العالم وتسهم بنحو ٦٢٪ مما يدخل من النبيذ في التجارة العالمية ويصدر معظم النبيذ الجيد الى فرنسا.

وتأتي الجزائر أيضا في مقدمة الدول العربية انتاجا للتبغ، إذ تنتج وحدها ٢٥ ألف طن سنويا أو ٥٠٪ من الانتاج العربي ويتركز الانتاج أساسا في اقليم جبل القبائل قرب مدينة الجزائر. ويصدر أكثر من نصفه الى الخارج ويستهلك الباقي محليا.

ويصدر ميناء الجزائر أيضا التمر إذ تساهم الجزائر بنحو ٩٠٪ من الانتاج العربي الذي يقدر بمليون طن. وتتركز أهم مناطق الانتاج الجزائري من التمر في الواحات الجنوبية. ومعظم الأصناف ممتازة وتعد للتصدير وفقا لأحدث الأساليب العلمية وهي تنافس في ذلك التمر العراقي في الأسواق الأوروبية والأمريكية ولاسيما إيطاليا وفرنسا وبريطانيا.

وقد استفادت الجزائر من موقعها الجغرافي فهي قريبة من هذا السوق الهام في وسط وغرب أوروبا حيث يسكن أكثر من ٢٠٠ مليون نسمة من السكان المشتغلين بالصناعة في مجتمع صناعي يتمتع بمستوى اقتصادي مرتفع. وهذا السوق الكبير هو الذي يستهلك كل فاض انتاج حوض البحر المتوسط.

وتساهم الجزائر أيضا بنحو ٦٪ من تجارة الحديد الدولية. وهي تنتج نحو ٣,٥ مليون طن، ومناجمها الرئيسية تقع الى الشرق من مدينة الجزائر في الاقليم الجبلي وقد ثبت وجود كميات كبيرة من الحديد الخام قرب الحدود المغربية عند تتدوف في اقليم الأطلس الخلفية، ويقدر احتياطي الحديد هنا بنحو ٢٥٠٠ مليون طن. ولكن لم يستغل حتى الآن الى أن تم تد الطرق اللازمة لربطها بالطريق الرئيسي لمينائي الجزائر وهران.

وفي جمهورية تونس تعتبر ميناء تونس نواة حركة المواصلات ونواة حركة التجارة اذ تقع المدينة مشرفة على وادي نهر ماجردة الذي يعتبر حلقة الاتصال بين الاقليم السهلي والاقليم الجبلي. والميناء ضحل ولكن انشئت قناة عميقة تربط بين مدخل خليج تونس والمدينة. وبموازاة هذه القناة يمتد طريق للسيارات يخترق الخليج الى قلب المدينة.

وبالإضافة الى موقع مدينة تونس في منتصف المسافة بين قناة السويس وجبل طارق فهي كذلك مركز سياحي ممتاز اذ أن ظهيرا غني بالآثار القديمة مثل أنقاض مدينة قرطاجة التي تقع الى الشمال الغربي من المدينة الحديثة بحوالي ١٢ ميلا.

وتعتبر تونس مركزا لكل الطرق الآتية من السهل الشرقي والجبالي المجاورة فتنتقل الى الميناء غلات الاقليم التي تصدر الى الخارج. والانتاج هنا يتركز في نطاقات متوالية تتمثل في نطاق الكروم في أقصى الشمال ويليها نطاق الزيتون على المنحدرات الجبلية ثم نطاق الرعي على الطرف الشرقي لهضبة الشطوط ثم نطاق النخيل قرب بحيرة شط الجريد. وتتركز مناجم الحديد في الشمال الغربي قرب الحدود الجزائرية كما يتركز انتاج



الفوسفات قرب منخفض شط الجريد. وأهم صادرات تونس تتمثل في النييد وزيت الزيتون والحبوب وحشائش الحلفا والحديد والفوسفات (٢,٥ مليون طن فوسفات، ١,٥ مليون طن حديد خام).

ويذهب نحو نصف الصادرات التونسية الى فرنسا كما أن حوالي ٣/٤ الواردات يأتيها من فرنسا.

وتأتي تونس السادسة في الترتيب بين دول العالم المنتجة للزيتون وتسهم بحوالي ٤٪ من الانتاج العالمي وتشغل المركز الثالث بين الدول المصدرة لزيت الزيتون وتساهم بنحو ٣٠٪ من تجارته الدولية.

وفي الجماهيرية الليبية تتركز التجارة الخارجية في مدينتي طرابلس وبنغازي إذ تساهم طرابلس بنحو ٧٠٪ من هذه التجارة أما بنغازي فنصيبها نحو ٣٠٪ ومنذ أقدم العصور اشتهرت المدينتان بالتجارة فهما تقعان عند نهاية طريقين هامين يمتدان جنوبا حتى حوض النيجر وتشاد والسودان، فأما الطريق الأول فكان يمتد من طرابلس مخترقا ممرات الجبل الطرابلسي الى غدامس ومنها الى أدرى في وادي الشاطئ ثم الى سبها عاصمة الجنوب ومنها يتفرع الى فرعين أحدهما يمتد الى غات فحوض النيجر والثاني يمتد الى أوزو فحوض تشاد.

وكانت غدامس مركزا مهما للنشاط التجاري إذ تتجمع عندها القوافل، وقد تتكون القافلة من حوالي ١٠٠٠ جمل. وقد تصل في بعض الحالات الى ٣٠٠٠ جمل وكان يستغرق سير القافلة من غدامس الى الجنوب أشهرا طوالا، وقد لا تعود القافلة من

رحلتها الا بعد عام أو عامين. ويشتهر أهل غدامس بخبراتهم في مسالك الصحراء، وكان يصحب القافلة أيضا أصحاب الأصوات الشجية يرسلون حلو الأغاني وعذب الألحان مع ألوان من الأدب الشعبي، الذي بعثته الرحلات الشاقة الطويلة. وكانت أبواب غدامس تودع كل عام حوالي ١٠ قوافل تعود محملة ببضائع الجنوب.

أما بنغازي فتتجمع عندها طرق الجبل الأخضر ثم يمتد الطريق بعد ذلك نحو الجنوب الى واحة جالو ومنها الى واحة الكفرة وهي غدامس الشرق اذ كانت تتجمع عندها مسالك متعددة ومنها الطريق الرئيسي الى البوهران.

وإذا راجعنا جدول الواردات والصادرات لأعوام ١٩٦٤-١٩٦٩ يبدو لنا أن قيمة الواردات قد ارتفعت من ١٠٤,٣٧٩,٠٠٠ عام ١٩٦٤ الى ١١٤,٤١٦,٠٠٠ في عام ١٩٦٥ ثم الى ١٤٤,٠٠٠,٠٠٠ في عام ١٩٦٦، وفي عام ١٩٦٩ قد سجلت الواردات زيادة قدرها ١١,٣ مليون جنيه لتبلغ نمو قدره ٨,٤٪. ويعد هذا المعدل منخفضا اذا ما قورن بمعدلات النمو التي حققتها الواردات في السنوات السابقة والتي بلغت ١٧٪ في عام ١٩٦٧ و ٣٥,١٪ في عام ١٩٦٨. ويصل حجم الاستيراد في عام ١٩٧٠ الى نفس المستوى تقريبا الذي بلغه في عام ١٩٦٩. هذا ويلاحظ أن الزيادة واضحة في المواد الاستهلاكية بأنواعها المختلفة وخاصة المواد الغذائية والأثاث والسيارات والأدوات الكهربائية. وقد زادت واردات اللحوم التي تستورد

للذبح بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا، وهذا دليل على أن القوة الشرائية قد ارتفعت نتيجة لارتفاع المستوى الاقتصادي<sup>١</sup>.

الصادرات من النفط الخام بالبراميل خلال  
شهر يناير ١٩٧١ حسب البلدان المستوردة

اسم القطر	عدد البراميل المصدرة	النسبة المئوية للصادرات
النمسا	٤٦٩,١٤٧	٠,٤٧ %
بلجيكا	٣,١٤٤,١٧٧	٣,١٧ %
البرازيل	٥٥٣,٩٣٤	٠,٥٦ %
الدنمارك	٣٧٣,٤٣٠	٠,٣٨ %
مصر	٥٧١,٦٤٢	٠,٥٨ %
فرنسا	١٣,٢٥٠,٩٦٠	١٣,٣٥ %
ألمانيا الغربية	٢٣,٤٨٧,٩٥٤	٢٣,٦٦ %
إيطاليا	٢٢,٩٠٧,٣٨٠	٢٣,٠٨ %
هولندا	٤,٥٧٤,١٢٧	٤,٦١ %
رومانيا	١٤٧,٣٤٣	٠,١٥ %
إسبانيا	٥,٣٠٢,٩٥٧	٥,٣٤ %
سويسرا	٢,١٨١,٥١٥	٢,٢٠ %
ترينيداد	٢,٠٥١,٤٣١	٢,٠٧ %
تركيا	٧٧٣,٠٢٥	٠,٧٨ %
ريطانيا	١٣,٥٠٤,٧٩٠	١٣,٦١ %
أمريكا	٣,٣٥٦,٤٥٧	٣,٣٨ %

<sup>١</sup> مصرف ليبيا: التقرير السنوي الرابع عشر لمجلس الإدارة ١٩٦٩/١٩٧٠ ص ١١٢.

اسم القطر	عدد البراميل المصدرة	النسبة المئوية للصدرات
جزر الباهاما	٢,٦٠٣,٤٢٩	٢,٦٢ %
المجموع	٩٩,٢٥٣,٦٩٨ برميل	١٠٠ %

أو ما يكافئ ١٢,٩٠٤,٦٩٨ طن طولي

معدل التصدير  
اليومي = ٣,٢٠٠,٠٠٠ برميل/يوم

أي ما يعادل = ٤١٦,٢٨٠ طن طولي/يوم

جدول رقم (٢)  
صادرات النفط الخام من موانئ البحر المتوسط  
سنة ١٩٦٩ (بملايين الأطنان)

اسم القطر	الصادرات الاجمالية	النسبة المئوية للصادرات	الصادرات الى أوروبا	النسبة المئوية للواردات الأوروبية
الجزائر	٤٤	١٦,٤%	٣٩	٨,٧%
ليبيا	١٤٨	٥٥,٣%	١٣٧	٣٠,٦%
العراق	٥٢	١٩,٤%	٤٨	١٠,٧%
السعودية <sup>١</sup>	٢٣	٨,٩%	٢١	٤,٨%
المجموع	٢٦٧	١٠٠%	٢٤٥	٥٤,٨%

أما عن الصادرات غير البترولية فهذه في مجملتها مواد زراعية وحيوانية وكمياتها تتغير من سنة الى أخرى وفقا لظروف الأمطار فاذا زادت الأمطار زاد الإنتاج وزاد فائض التصدير. الا أن الأيدي العاملة الريفية في نقص ملحوظ إذ أنها تهاجر الى المدن الكبيرة أو تنتقل للعمل في شركات البترول. ويلاحظ أن قيمة الصادرات قد هبطت من ٢,٠٨٧,٠٠٠ في عام ١٩٦٤ الى ١,٦٨١,٠٠٠ عام ١٩٦٥ نتيجة لنقص في الكميات المصدرة من الفول السوداني والمواشي وبنور الخروع واللوز والحمضيات والتبغ مع زيادة طفيفة في المعادن الخردة والحلفا.

<sup>١</sup> المهندس عبدالحى بن عمران: اقتصاديات تطوير حقول النفط (محاضرة القايت في كلية الاقتصاد والتجارة - الجامعة الليبية ١٩٧٠/١٩٧١م)

ولم يظهر زيت الزيتون في قائمة الصادرات لعامي ١٩٦٤-١٩٦٥ إذ أن كل الإنتاج استهلك محليا. وفي عام ١٩٦٩ لوحظ أن الصادرات التقليدية غير النفط قد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة ١٠,٣٪ لتبلغ ٩٠٨,٠٠٠ جنيه! ومن المنتظر أن تزداد الصادرات في السنوات القادمة للتوسع الزراعي والصناعي الحديث.

وتأتي إيطاليا في مقدمة الدول المصدر إليها فنصيبها ٤٦,٥٪ من الصادرات الليبية غير البترولية ويليهما في ذلك المملكة المتحدة ١١,٥٪ وفي عام ١٩٦٩ بلغت نسبة ما استوردته دول السوق الأوروبية المشتركة ٧١,٦٪.

ومن حيث الواردات نجد أن ٢٥,٥٪ من الواردات يأتي من إيطاليا ويليهما الولايات المتحدة الأمريكية ١٧,١٪ ثم المملكة المتحدة ١٤,٨٪ وألمانيا الغربية ١٠,٢٪، وفي عام ١٩٦٩ استمرت دول أوروبا الغربية تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للواردات وخاصة دول السوق المشتركة<sup>١</sup>.

ومثلنا الأخير في هذا النوع من الموانئ العربية يتمثل في ميناء بيروت وهو المنفذ الأول لجمهورية لبنان. وإلى الخلف من المدينة يمتد شريط ضيق من السهول الساحلية يليه سلسلتان متوازيتان من الجبال بينهما وادي البقاع. وقد قطعت هذه السلاسل بالممرات الجبلية التي سهلت الربط بين الساحل والداخل في بيروت على اتصال جيد بالداخل عن طريق شبكة كبيرة من الطرق تربطها بالمدن الرئيسية في لبنان وسوريا

<sup>١</sup> المرجع السابق: ص ١١٧ وما بعدها

كدمشق وحلب وحمص وحماء وطرابلس وهي على اتصال جيد أيضا ببغداد وذلك بالطريق الصحراوي الهام الذي يبدأ من دمشق.

ولبنان تأتي في مقدمة الدول العربية عناية بشبكة الطرق ويليهما في ذلك الجمهورية الليبية. وتتعدد موانئ البترول في البلاد العربية المنتجة للبترول ففي ليبيا توجد موانئ سدره ورأس لانوف ومرسى البريقة ومرسى الحريقة والزويتينة وفي الجزائر ميناء بجاية، وفي تونس ميناء الصخيرة وفي جمهورية مصر العربية ميناء السويس، وفي المملكة السعودية ميناء رأس التنورة، وفي الكويت ميناء الأحمد، وفي المنطقة المحايدة ميناء سعود، وفي العراق ميناء الفاو، وفي قطر ميناء أم سعيد.

وفي أواسط عام ١٩٦٠ تم اختيار مرسى البريقة لتكون أول ميناء بترولي في ليبيا لنقل زيت البترول من حقل زلطن على بعد ١٧٥ كم جنوبا، وتمتاز البريقة بعمق مينائها وحمائته من العواصف، وفي أواخر عام ١٩٦١م انتهت شركة اسو من اعداد الميناء واتمام انشاء خط أنابيب البترول وطريق من الاسفلت، وفي ١٢ سبتمبر ١٩٦١ صدرت أول شحنة من بترول ليبيا الى الخارج.

وكان مرسى البريقة هذا قبل الحرب العظمى الثانية يمثل مدينة صغيرة يسكنها ١٥٠٠ نسمة ثم هجرها معظم سكانها أثناء الحرب، وأصبحت الآن مركزا من مراكز العمران المهمة.

ومنذ أوائل عام ١٩٦٧، بدء في انشاء مصنعين أحدهما لتسييل الغاز الطبيعي في مرسى البريقة، ويكون من أكبر

مصانع تسيل الغاز الطبيعي في العالم والمصنع الثاني لضغط الغاز من زلطن تمهيدا لنقله الى مرسى البريقة، كما قد تم الاتفاق مع شركتي ليني الايطالية وكاتالانا الاسبانية على شراء هذا الغاز بمعدل ٢٣٥ مليون قدم مكعب يوميا للشركة الايطالية، و ١١٠ مليون قدم مكعب يوميا للشركة الاسبانية، ويصدر الغاز الايطالي الى ميناء سبيتسيا والغاز الاسباني الى برشلونة، ومنهما ينقل في أنابيب خاصة الى المناطق المجاورة. وقد تم هذا المشروع الكبير وهو من أهم المشروعات الحديثة والعمل يجري في توسيع الميناء وتعميقه.

ومنذ أوائل عام ١٩٦٤، وبعد اكتشاف حقل بترول السرير الى الجنوب من طبرق بنحو ٥١٣ كم تم اختيار مرسى الحريقة كميناء بترولي الى الجنوب من خليج طبرق وذلك لعاملين أحدهما أن الميناء يقع في خليج محمي من الرياح ولاسيما رياح الشتاء والثاني أن المياه عميقة بالقرب من الشاطئ بحيث أصبح من الممكن بناء رصيف لرسو ناقلات البترول الخام، ومن ثم تجنب استعمال خطوط أنابيب تحت الماء، وتم بناء خط الأنابيب وجميع ملحقاته في ديسمبر ١٩٦٦، وصدرت أول شحنة خام من بترول السرير في ١٢ يناير ١٩٦٧، والطاقة المحتملة لخط الأنابيب البالغ قطره ٣٤ بوصة، تعتبر طاقة كبيرة.

وفي عام ١٩٦٥، وصل إنتاج ليبيا من خام البترول الى ٥٧,٧ مليون طن وهي بذلك كانت في المرتبة الرابعة بين الدول العربية بعد الكويت ١٠٧ مليون طن، والمملكة العربية السعودية ٩٩ مليون طن، والعراق ٦٣ مليون طن.



وفي ١٩٦٦، ارتفع انتاج ليبيا الى ٧٢ مليون طن ووصل في عام ١٩٦٨، الى نحو ١٣٥ مليون طن، وفي عام ١٩٦٩، الى ١٥٠ مليون طن، وكانت ليبيا تحتل بذلك المرتبة الثالثة بين البلدان المصدرة للنفط في العالم.<sup>١</sup> ويصل معدل التصدير اليومي في ذلك الوقت الى ثلاثة ملايين من البراميل يوميا (٣,٠٠٠,٠٠٠ برميل يوميا).

وقد ارتفعت قيمة صادرات البترول الخام من ٢١٦,٤٠٠,٠٠٠ جنيه في ١٩٦٤ الى ٢٨٠,٣٢٦,٠٠٠ جنيه في عام ١٩٦٥، وتأتي ألمانيا الغربية في رأس قائمة الدول المصدر اليها في عام ١٩٦٥، اذ كان نصيبها من قيمة البترول الليبي ٣٨,١٪، يليها في ذلك المملكة المتحدة ٢٠,٧٪، وإيطاليا ٩,٦٪، وفرنسا ٩,٣٪، أما الولايات المتحدة الأمريكية فكان نصيبها ٣,٢٪، وبين الدول العربية تأتي جمهورية مصر العربية في رأس القائمة اذ صدر اليها ١,٤٪، يليها تونس ٠,٦٪، وفي عام ١٩٦٩ ارتفعت قيمة صادرات النفط الى ٧٧٢,٠٥٥,٠٠٠ جنيه واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى فوصلت نسبتها الى ٢٣,١٪ من اجمالي صادرات النفط.<sup>٢</sup>

<sup>١</sup> وزارة النفط والمعادن: الصناعة البترولية في ليبيا - ١٩٧٠ - ص ٢٥

<sup>٢</sup> تأتي ألمانيا الغربية في المرتبة الثانية ٢١,٨٪ من اجمالي الصادرات النفطية، ثم بريطانيا ١٣,٨٪، مصرف ليبيا: التقرير السنوي الرابع عشر ١٩٦٩/١٩٧٠ -

ص ١٢٠ وما بعدها

الجدول الآتي معدل الانتاج اليومي من النفط  
خلال السنوات من ١٩٧٣-٦١م

السنة	الانتاج اليومي
١٩٦١	٤٦,٢٤٦
١٩٦٢	١٧٩,٤٥٢
١٩٦٣	٤٥٩,٠٠٠
١٩٦٤	٨٦٢,٠٠٠
١٩٦٥	١,٢٢٣,٠٠٠
١٩٦٦	١,٥٠٤,٠٠٠
١٩٦٧	١,٧٤٤,٠٠٠
١٩٦٨	٢,٦٠٠,٠٠٠
١٩٦٩	٣,١١٨,٠٠٠
١٩٧٠	٣,٣١٨,٠٣٨
١٩٧١	٣,٩٦٣,٦٠٠
١٩٧٢	٢,٢١٥,٠٠٠
١٩٧٣	٢,١٨٦,٠٠٠

المصدر: وزارة النفط (الجمهورية العربية الليبية)

صادرات النفط خلال عام ١٩٧٣  
حسب البلدان المستوردة بالبراميل

البلد المستورد	الصادرات خلال عام ١٩٧٣	النسبة للمجموع %	الصادرات المترجمة
إيطاليا	٢٠٦٥٧٨٧٤٣	٢٦,٠	١٥٩٨٧٠٢٥١٢
ألمانيا الغربية	١٨١٤٥١٨٣٦	٢٢,٨	٢٠٨٨٨٧١٧١٤
بريطانيا	٩٠٩٣٤٧٠٦	١١,٥	١٢٥٠٢٨١٦٥٩
الولايات المتحدة الأمريكية	٧٤٩٠٩٧٧٠	٩,٤	٤٢٨٠٧١٧٨٨
فرنسا	٤٤٢٥٢٠٧١	٥,٦	٧٦٤٥٣١٥١٧
باهاماس	٣١٧٨٤٢٧٣	٤,٠	١٢١٥٠٦٥٧٣
هولندا	٣١٤٢٧٣١٨	٣,٩	٦٢١٥٠٦٠٣٤
بلجيكا	١٩٨٩٦٤٦١	٢,٥	٢٦٥٧٩٨٨١٠
اليونان	١٤٢٨٢١٤٧	١,٨	٢٠٧٧٢٦٦٨
الاتحاد السوفييتي	١٢٩٠٦٠٩٣	١,٦	٢٦٧٦١٥٢٧
كندا	١٢٥٩٨٤٤١	١,٦	٤٥٢٥٧٢١٤
اسبانيا	١١٩٩٦٣٧٦	١,٥	٣٣٤٧١٦١٢٢
سويسرا	١١٨٦٥٤٦١	١,٥	١٠١٥٨٧٧٢٧
رومانيا	٩٤٩١٢٠١	١,٢	٢١٨٢٢٨٣٦
البرازيل	٩٢٩٣٦٨٠	١,٢	٢٦٤٩٩٨٦١
اليابان	٦٤٤٤٧٢٦	٠,٨	١٤٤٣٥٤٦٣
بلغاريا	٦٠٠٥٩٥٨	٠,٨	١٣٤٩٢٠٦٤



والفترة التالية من عام ١٩٨١ إلى عام ١٩٨٩:

لقد تناولت هذه الفترة دراسة انتاج النفط في ليبيا والوطن العربي ومدى ارتباطه بالانتاج العالمي ومن الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تعتبر من أولى الدول العربية التي اكتشف فيها النفط في عام ١٨٨٦ ثم توالى بعد ذلك اكتشافات النفط في بقية البلاد العربية، فبدأ انتاج النفط العراقي في عام ١٩٢٧ وفي البحرين بدأ الانتاج في ١٩٣٥ وفي السعودية في عام ١٩٣٦ وفي الكويت عام ١٩٤٦، أما في قطر فقد اكتشف النفط فيها في عام ١٩٣٩ والجزائر في عام ١٩٥٧، وفي ليبيا في عام ١٩٥٩.

ونظرا لأهمية النفط في التجارة الدولية نجد أن نسب انتاجه تختلف من دولة لأخرى بمعنى أن هناك مناطق في العالم تساهم بنسب عالية جدا في انتاج النفط ولاسيما المنطقة العربية والتي تحتل مركز الصدارة بين دول العالم في الانتاج كما أن هناك دول أخرى لا تنتج النفط رغم أنها دول صناعية وفي حاجة ماسة لهذه المادة وذلك مثل دول أوروبا الغربية واليابان.

أما بالنسبة للدول المنتجة للنفط في الوطن العربي<sup>٢</sup>، فإن المملكة السعودية تحتل مركز الصدارة (الجدول التالي) حيث بلغ

<sup>١</sup> عبدالرازق المرتضى: التشريعات النفطية الليبية - مرجع سابق - ١٩٨٢.

ص ٢٦٦، ٢٦٤

<sup>٢</sup> محمد صبحي وآخرون: الوطن العربي أرضه وسكانه وموارده - ١٩٨٨ - مرجع

سابق - ص ٤٠٩، ٣٨٠

<sup>٣</sup> محمود على الغدامسي: النفط الليبي - ص ٤٤ وما بعدها - طرابلس ١٩٩٠

انتاجها من النفط عام ١٩٨٩ حوالي ٩,٨٠٨ مليون برميل في اليوم.

جدول يوضح إنتاج النفط الليبي والعربي والعالمي  
خلال الفترة من ١٩٨١ إلى ١٩٨٧  
بمليون برميل في اليوم

الدولة	١٩٨١	١٩٨٢	١٩٨٣	١٩٨٤	١٩٨٥	١٩٨٦	١٩٨٧	نسبة التغير ١٩٨٦ - ١٩٨٧
ليبيا	١,٢١٨	١,١٣٦	١,٠٣٠	٠,٩٥٧	١,٠٣٦	١,٠٣٤	٠,٩٧٣	٥,٩ -
تونس	٠,١١١	٠,١٠٧	٠,١١٥	٠,١١٤	٠,١٢٠	٠,١٠٧	٠,١٠٠	٦,٥ -
الجزائر	٠,٧٩٠	٠,٧٩٠	٠,٧٥٥	٠,٦٦١	٠,٦٩٥	٠,٦٠٠	٠,٦٣٤	٥,٧ +
سوريا	٠,١٦٣	٠,١٨٤	٠,١٦١	٠,١٦٢	٠,١٦٢	٠,١٩٤	٠,٢٣٢	١٩,٦ +
العراق	٠,٨٩٢	١,٠١٢	١,٠٩٩	١,٢٢٢	١,٤٢٧	١,٦٨٨	٢,٠٧٩	٢٣,٢ +

- ١ منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوبك) تقرير الأمين العام السنوي  
الثاني عشر - الكويت - ١٩٨٥ - ص ٧٣
- ٢ منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوبك) تقرير الأمين العام السنوي  
الرابع عشر - الكويت - ١٩٨٧ - ص ٧٤

نسبة التغير من ١٩٨٦ - ١٩٨٧	١٩٨٧	١٩٨٦	١٩٨٥	١٩٨٤	١٩٨٣	١٩٨٢	١٩٨١	الدولة
١١,٧ +	٠,٩٢٦	٠,٨٢٩	٠,٧٨٠	٠,٦٨٢	٠,٦٢٤	٠,٦٠٣	٠,٦٠٣	مصر
١٦,٦ -	٤,٢٠٥	٥,٠٤٢	٣,٣٣٣	٤,٠٧٩	٦,٤٥٩	٦,٤٨٢	٩,٨٠٨	السعودية
١٤,٢ -	١,٢١٥	١,٤١٦	١,٠١٧	١,١٦٠	١,٠٥٢	٠,٨١٧	١,١٣٠	الكويت
٩,٦ +	١,٥٠١	١,٣٧٠	١,٢٠٢	١,٤٢٠	١,١١٨	١,٢٤٨	١,٥٠٢	الإمارات
٢,٣ -	٠,٠٤٣	٣,٠٤٤	٠,٠٤٢	٠,٠٤٢	٠,٠٤٢	٠,٠٤٤	٠,٠٤٦	البحرين
٣,٣ -	١١,٩٠٨	١٢,٣٢٤	٩,٨١٤	١٠,٤٩٩	١٠,٨٢٣	١٢,٤٢٣	١٦,٢٦٣	مجموع قطر
١,٠ -	٥٩,٧٣١	٥٩,٨٢٧	٥٦,٤٠٠	٥٥,٧٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٩٠٠	٥٨,٤٠٠	الأردن مجموع دول العالم



ثم أخذت الكميات تتناقص حتى وصلت في عام ١٩٨٥ الى حوالي ٣,٣٣٣ مليون برميل وهي أقل سنوات الانتاج. أما في عام ١٩٨٦ فقد وصلت الى ٥,٠٤٢ مليون برميل وقلت في سنة ١٩٨٧ حيث لم تتجاوز ٤,٢٠٥ مليون برميل في اليوم، أي تراجع بنسبة ٥٧,١٪ عما كان عليه في سنة ١٩٨١. ورغم انخفاض انتاج النفط السعودي الا أنها لازالت تمثل المركز الأول في الانتاج العربي أي بنسبة ٥٨,٨٪. والامارات العربية في المركز الثاني ٩,٠٪ حيث ساهمت بحوالي ١,٥٠٢ مليون برميل في اليوم في نفس السنة. أما بالنسبة لليبيا فقد احتلت المركز الثالث ٧,٣٠٪ في عام ١٩٨١، حيث بلغ الانتاج في تلك السنة حوالي ١,٢١٨ برميل في اليوم. أما أقل معدلات الانتاج العربي فقد تمثلت في دولة البحرين اذ ترواح انتاجها خلال عام ١٩٨١ حوالي ٠,٠٤٦ مليون برميل في اليوم أي نسبة ٠,٠٣٪ فقط ويبين جدول المقارنة أن نسبة الانتاج في الدول العربية المصدرة للبترو (الأوبك) خلال الفترة ١٩٨١-١٩٨٧ قد تراجع في السنوات الأخيرة، فبعد أن كان في سنة ١٩٨١ قد وصل الى ١٦,٢٦٣ مليون برميل في اليوم أي ٢٨,٦٪ من انتاج العالم، نجد أنه وصل في عام ١٩٨٧ الى حوالي ١١,٩٠٨ مليون برميل فقط وهذا مما جعل نسبة التغير بين سنة ١٩٨٦ وسنة ١٩٨٧ تصل الى ٣,٣٪ بالسالب، ويرجع السبب في ذلك الى تراجع انتاج كل من البحرين والسعودية العربية وقطر الكويت وتونس وليبيا.

أما بالنسبة لإنتاج كل من سوريا فقد زاد بنسبة ٢٣,٢٪ والجزائر بنسبة ١٩,٦٪ والإمارات ٩,٦٪ وبالنسبة لانخفاض الإنتاج النفطي في مجموعة الأوبك فقد صاحبه انخفاض في الإنتاج العالمي أيضا حيث كان الإنتاج في عام ١٩٨١ حوالي ٥٨,٤٠٠ مليون برميل في اليوم ثم أخذ في التناقص حتى سنة ١٩٨٥ حيث بلغ حوالي ٥٦,٤٠٠ مليون برميل في اليوم. ثم ارتفع في عام ١٩٨٦ حيث بلغ ٥٩,٨٢٧ مليون برميل في اليوم. أما في عام ١٩٨٧ فقد انخفض بنسبة ١,٠٪ حيث وصل إلى ٥٩,٢٣١ مليون برميل في اليوم.

ومن خلال العرض السابق يتضح لنا أن الإنتاج العالمي للنفط والإنتاج العربي غير ثابتين وهما متذبذبان من حيث كميات الإنتاج. وبالنسبة لإنتاج النفط الليبي والعربي فتستنتج النقاط الآتية:

أ- أن أعلى كميات الإنتاج من النفط الليبي خلال الفترة ١٩٨١-١٩٨٧ قد وصلت إلى ١,٢١٨ مليون برميل في اليوم، وأقل المعدلات كانت في عام ١٩٨٧ حيث لم تتجاوز ٠,٩٧٣ مليون برميل/يوم.

ب- وصلت كميات الإنتاج في مجموعة منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (الأوبك) في عام ١٩٨١ حوالي ١٦,٦٨١ مليون برميل/يوم. وهي أعلى كميات الإنتاج خلال تلك الفترة، ثم أخذ هذا الإنتاج يتدنّى حتى وصل إلى أقل معدل

١ منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (الأوبك): التقرير السنوي الثاني عشر - الكويت - ١٩٨٥ - ص ٧٢

له في عام ١٩٨٥ حيث بلغ ١٠,١٣٨ مليون برميل/يوم، ثم أخذ في الزيادة في عام ١٩٨٦ حيث وصل الى ١٢,٦٥٧ مليون برميل/يوم ثم انخفض في عام ١٩٨٧ بنسبة ٣,٥٪.

ج- يرجع السبب الرئيسي في ارتفاع وانخفاض كميات الانتاج في ليبيا والوطن العربي الى ارتفاع وانخفاض سعر للنقط، والى كميات الانتاج المحددة من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك)، فهي تملك تحديد الانتاج وكميات تصدير كل دولة وذلك وفق الظروف والمعطيات التولية، ووفق الاحتياطي العربي لكل دولة من الدول العربية كما يوضح بملحق جدولها.

وأما موانئ الأودية النهرية فمن أهمها ميناء الاسكندرية وميناء البصرة، وميناء الاسكندرية هو ميناء مصر الأول اذ يرد اليها ٧٥٪ من الواردات ويصدر منها ٩٠٪ من الصادرات ويرجع ذلك الى موقعها الجغرافي الممتاز فهي على اتصال جيد بالداخل عن طريق شبكة من الطرق الحديدية والبرية والمائية، كما أن الميناء عظيم الاتساع اذ تبلغ المساحة المائية للميناء أكثر من ١٦٨٠ فدان وهو ميناء عميق محمي من الرياح ومحمى من طمي النيل بعكس ميناء بورسعيد وقد جهزت الميناء بعدد كبير من الأرصفة وفقا للنظم الحديثة كما بني بها أكبر محطة ركاب بحرية في الشرق الأوسط.

١ صبحي قنوص وآخرون: التحولات السياسية والاقتصادية خلال عشرين سنة ١٩٨٩/٦٩ - دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان - بنغازي - سبتمبر ١٩٨٩ - ص ٣٠٦

ويأتي القطن في رأس قائمة الصادرات، هذا بالإضافة الى  
 سلع زراعية أخرى كالبصل والأرز وكذلك بعض الصناعات  
 الزراعية والمنسوجات وبعض مشتقات البترول، والواردات منها  
 مواد زراعية وآلات لانشاء المصانع ومواد خام صناعية وآلات  
 كهربائية ولتغطية احتياجات المدن الجديدة الموضحة بالجدول  
 المرفق<sup>١</sup>.

وأما البصرة فهي الميناء الأول في العراق ويصل اليها كثير  
 من السفن التجارية من الخليج العربي، وهي على اتصال جيد  
 بالداخل عن طريق النهر والطرق البرية والسكك الحديدية وتبعد  
 عن رأس الخليج العربي بنحو ٦٠ كيلومترا وعمق مجرى النهر  
 ومدة قناة عند رأس الخليج طولها ٣٠ كلم حتى تتمكن بعض  
 السفن من أن تصل الى المدينة.

والمنطقة غنية جدا بغابات النخيل، ويأتي التمر في مقدمة  
 الصادرات من البصرة والمعروف أن العراق في مقدمة الدول  
 العربية انتاجا للتمر فهو يساهم بنحو ثلث الانتاج العربي الذي  
 يقدر بحوالي مليون طن.

<sup>١</sup> المصدر: مركز المعلومات (مجلس الوزراء) - تجازات ١٩٨١-١٩٩٩ - ص ٢٠

وتعتبر منطقة شط العرب في جنوب العراق أكثر جهات العالم نخلاً وأغناها بالتمر وهي تضم أكثر من ٤٠٪ من نخيل التمر في العراق ، ويصدر تمر العراق الى كثير من دول العالم . وتأتي الدول الآسيوية في المقدمة استيراداً للتمر العراقي اذ تستأثر بنحو ٧٠٪ من جملة الصادرات . وتأتي الهند في المركز الاول وتليها اليابان فسوريا ثم المملكة السعودية فباكستان . وبين الدول الافريقية تأتي جمهورية مصر العربية في رأس القائمة ويليهما السودان فالصومال .

وموانئ المضائق البحرية تتمثل في طنجة وعدن . وتمتد شبه جزيرة طنجة مشرفة على مضيق جبل طارق وهو المدخل الغربي لحوض البحر المتوسط ، ويفصلها من الجانب الاوربي مسافة لا تزيد على تسعة أميال . وتتجمع هنا كل الطرق الآتية من موانئ المحيط الاطلسي في اتجاهها عبر البحر المتوسط الى الشرقيين الاوسط والاقصى مما أكسب المدينة أهمية كبرى كميناء للعبور وتموين السفن وبرز أهميتها كمركز سياحي ممتاز ولا سيما أن ظهرها الجبلي مثلاً في الريف يتمتع بحمال طبيعي خلّاب . كما أن المدينة تتصل بالداخل اتصالاً سهلاً منظمًا عن طريق شبكة من الطرق ، والسكك الحديدية تربطها بأقليم مراكش في الجنوب وبحوض نهر ملوية عبر ممر تازا في الشرق كما يمتد الطريق الساحلي على طول الساحل الافريقي حتى الاسكندرية .

وميناء عدن من ناحية أخرى يشرف على المدخل الجنوبي للبحر الاحمر أو مضيق باب المندب ، وتتجمع هنا الطرق الآتية من المحيط الهادي والمحيط الهندي في اتجاهها نحو البحر الاحمر والبحر المتوسط قاصدة موانئ المحيط الاطلسي الاوربية والامريكية مما خلق من المدينة ميناء رئيسياً للعبور وتموين السفن . اذ يزورها شهرياً ما يزيد على ٦٠٠ سفينة حمولتها نحو ٣٠ مليون طن . كما يقوم الميناء أيضاً بعمليات تخزين البضائع واعادة توزيعها على نطاق واسع .

وتعتبر عدن مركزاً لشبكة من الطرق تمتد غرباً إلى تربة التي تطل مباشرة

على مضيق باب المندب ومنها الى مخا والحديدة باليمن . كما يربطها بالداخل طريق هام يعبر وادي تين الى تعز ومنها الى صنعاء ، ويمتد طريق نحو الشرق الى مكلا ومسقط والساحل المهادن . وهكذا تشرف عدن أيضاً على كسل الجنوب العربي .

وقناة السويس بلا شك لها قيمتها الكبرى في حركة التجارة وليس أدل على ذلك من أن البترول يكون نحو ٦٥٪ من جملة التجارة التي تمر بالقناة . وقد ارتفعت هذه النسبة بقدر ملحوظ بعد أن كانت نحو ١٧٪ عام ١٩٣٨ أي قبل الحرب العظمى الثانية . ولا يحتمل أن تضعف القيمة البترولية للقناة اذ يستبعد تحويل النقل عن طريق الكاب أو جنوب أفريقية ، فالسفن التي تسير بين موانئ البترول في الشرق الاوسط والموانئ الاوربية ستضطر لاضافة ما يقرب من ٤٧٠٠ ميل أو بين ١٢ الى ١٨ يوماً لو سارت عن طريق الكاب وبلاضافة الى أنه لا توجد الناقلات الكافية لنقل الكمية المطلوبة في الوقت المناسب . وهكذا تختصر قناة السويس طريق السفر بين الشرق والغرب بما يوازي ٤٠٪ من المسافة . ويمر حوالي ٩٠٪ من البترول المصدر من الشرق الاوسط لاوروبا بواسطة قناة السويس من ناحية وأنابيب البترول من ناحية أخرى . ولقد زاد المتوسط اليومي لعدد السفن العابرة للقناة من ٤٠,٢ ، في عام ١٩٥٥ الى ٥٥,٦ عام ١٩٦٥ ، كما سجلت القناة في ٩ مارس سنة ١٩٥٨ رقماً قياسياً في عدد السفن العابرة اذ مرت بها ٨٤ سفينة وهو أضخم عدد للسفن المارة بالقناة في يوم واحد منذ انشائها . وتتراوح سرعة السفن في القناة بين ١٣ - ١٤ كيلو مترأ في الساعة تبعاً لتوعها وحمولتها . ومتوسط زمن عبور السفن بالقناة التي طولها ١٧٣ كلم هو ١٥ ساعة ونتيجة للتحسينات التي ادخلت على القناة في السنوات الاخيرة قد ارتفع الغاطس المسموح به للسفن العابرة من ٣٥ قدماً عند التأميم الى ٣٨ قدماً (١١,٥٨ مترأ) في ٢٩ فبراير سنة ١٩٦٤ م وفي المستقبل القريب باذن الله تعالى ستعمق قناتنا العربية الخالدة وتعود الى نشاطها التجاري الكبير. ومنى ١٩٩٦ وصل غا طس الـ ٥٦ قدماً .

وأما عن موانئ الصيد فهي قليلة على الرغم من أن الوطن العربي غني بثرواته المائية المتنوعة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة وذلك لطول سواحلها وتعدد بحاره وبحيراته وكثرة مجاريه المائية العذبة ومع كل هذه المسطحات المائية فإن الانتاج السمكي لا يزيد على ٩٠ ألف طن أو ما يساوي ١٪ من الانتاج العالمي . ولذلك فإن نصيب الفرد يبدو ضعيفاً اذ لا يتعدى ٤ كيلو جرامات في السنة بينما يصل الى ٣٠ كيلو جراماً في اليابان والى ١٣ كيلو جراماً في إنجلترا والى ١٢ كيلو جراماً في إيطاليا . وتقدم المصايد العربية البحرية أقل من ربع ما يمكن أن تقدمه لسكانها بينما نجد أن هذه النسبة تبلغ نحو ٨٠ - ٩٥ ٪ في أغلب الدول ذات السواحل البحرية . ويرجع هذا الضعف في الانتاج العربي الى عوامل من أهمها : أساليب الصيد الأولية وجهل الصيادين بأماكن تجمع الاسماك وعدم قدرة السفن المستخدمة على الابتعاد من الساحل اذ معظمها يسير بالشرع أو المجداف .

ويتركز المحصول السمكي في المملكة المغربية التي تأتي في المرتبة الاولى اذ يبلغ انتاجها السنوي نحو ٥٠ ألف طن أو ما يوازي ١/٧ المحصول العربي . وجمهورية مصر العربية التي وصل انتاجها أخيراً الى نحو ٣٢٠ ألف طن فأصبحت تنتج ما يوازي ثلث المحصول كله أما الجزائر فهي في المرتبة الثالثة بانتاج يصل الى ١٢٨ ألف طن . ويأتي بعد ذلك الجنوب العربي ثم تونس أما باقي الدول العربية فانتاجها محدود جداً .

ومصايد المحيط الاطلسي هي أهم المصايد البحرية العربية فان انتاجها السمكي الوفير هو الذي أكسب المملكة المغربية شهرتها في هذا الميدان ذلك أن هذه المصايد تقدم نحو ٩٠ ٪ من الثروة السمكية للمملكة المغربية .

ويعتد ساحل المحيط الأطلسي هنا لمسافة ١٨٠٠ كم كساحل رملي منخفض تكثر به الخلجان الطبيعية التي مهدت لخلق موانئ الصيد مثل أسفي وأغادير والعرائش والقنيطرة والرباط. إلا أن ميناء أسفي هو أهمها جميعا إذ يساهم بثلاث المحصول المغربي من الثروة السمكية، وتغذ أغادير الميناء الثانية لصيد السمك في الوطن العربي ولا يقل إنتاجها كثيرا عن إنتاج أسفي.

وقد ازدهرت صناعة حفظ الأسماك وتقوم المغرب بتصدير أسماك محفوظة الى دول كثيرة وبخاصة فرنسا التي يصدر إليها نحو ٥٠٪ من الأسماك المصدرة ويلبيها ألمانيا ٢٠٪ ثم إيطاليا ١٠٪.

وتتركز المشاكل الرئيسية التي تواجه الموانئ العزبية في قلة عمق هذه الموانئ مما يصعب معه استقبال السفن الكبيرة، وإن نمو شبكة المواصلات لا يتناسب مع النمو الصناعي والتجاري والسكاني لهذه المدن مما أدى الى خلق أزمة كبيرة في النقل، وضعف استغلال المناطق الخلفية لهذه الموانئ استغلالا علميا منظما. وإهمال السياحة البحرية إهمالا يكاد يكون كليا، وأخيرا قلة العناية بموانئ الصيد التي تبدو في حاجة ماسة الى التوسع في شبكة المواصلات التي تربطها بالداخل مع العناية برفع المستوى الاقتصادي والثقافي لجماعة الصيادين عن طريق الجمعيات التعاونية الحديثة.



وقد أولت الحكومات العربية عناية خاصة بدراسة كل هذه المشاكل الرئيسية بغية الوصول الى العلاج الجذري السليم. وتأتي ليبيا في مقدمة الدول العربية اهتماما بمشاكل الموانئ فقد تضمنت سياسة الدولة الاقتصادية عناية كبيرة بتوسيع وتعميق مينائي طرابلس وبنغازي واهتماما بالغاً بنمو شبكة المواصلات في كل الدولة مما يؤدي الى الاسراع في تنفيذ كل مشروعات التوسع الاقتصادي المتنوعة.

### انتاج الزيت الخام والغازات الطبيعية ومشتقاتها

خلال عامي ١٩٩٢ - ١٩٩٣

مصري

(الوحدة : ألف طن مترى)

البيان	١٩٩٢	١٩٩٣	نسبة التغير % ١٩٩٣ / ٩٢
الزيت الخام	٤٤٢٢٦	٤٥٤٦٤	٢,٨+
غازات طبيعية *	٧٦٠٠	٨٩٧٢	١٨,١+
مكتشفات	١٠٨٦	١٢٩٨	١٩,٦+
بوتاجاز	٦٧٢	٧٦٥	١٣,٨+
الاجمالي	٥٢٥٨٥	٥٦٤٩٩	٥,٤+

\* لا يشمل الحرق والمستخدم كوقود .


### انتاج الغازات والبوتاجاز والمكتشفات

خلال عامي ١٩٩٢ - ١٩٩٣

مصري

(الوحدة : ألف طن)

السنة	الغازات	البوتاجاز	المكتشفات	اجمالي
١٩٩٢	٧٦٠٠	٦٧٢	١٠٨٦	٩٣٥٩
١٩٩٣	٨٩٧٢	٧٦٥	١٢٩٨	١١٠٣٥
نسبة التغير %	١٨,١	١٣,٧	١٩,٦	١٧,٩



طرق التجارة الإسلامية التقليدية ووراكرها .

## الفصل السابع جغرافية مصر الطبيعية

## جغرافية مصر العربية

### المحتويات

#### الموقع الجغرافي وأثره في التطور الاقتصادي

.....	مقدمة
.....	عوامل الموقع الجغرافي :
.....	١- النيل
.....	٢- المناخ
.....	٣- السطح

#### مناخ الدلتا والوادي

.....	مقدمة
.....	اقليم السواحل الشمالية
.....	اقليم
.....	الدلتا
.....	اقليم الصعيد

## الموقع الجغرافي وأثره في التطور الاقتصادي

تتميز مصر بموقع جغرافي هام إذ تقع عند مجمع قارتي أوراسيا وإفريقيا وعند مفترق بحرين داخليين تمتد أحدهما إلى المحيط الهندي ومناطقه الحارة ، ويمتد الآخر إلى المحيط الأطلسي ومناطقه الباردة . ولذلك كانت مصر ولا تزال أرض الزاوية التي تجتمع عندها مسالك الشرق والغرب . وتحد مصر شمالاً بالبحر المتوسط ، وشرقاً بالبحر الأحمر فخليج العقبة الذي يفصلها عن المملكة العربية السعودية . وتبدأ بعد ذلك الحدود الشرقية للبرية من رأس خليج العقبة عند رأس طابة في اتجاه عام نحو الشمال الغربي حتى البحر المتوسط شرق بلدة رفح بـ ١٠٠ كيلومتر واحد ويفصل هذا الخط بين مصر وفلسطين . ويبدو أن هذه الحدود سياسية محنة ، إذ أن تضاريس سيناء ونظام تكوينها الجيولوجي يمتد خارج تلك الحدود ويتجاوزها إلى الأقطار المجاورة (١) . كذلك تقطع تلك الحدود مجارى الوديان وتركبها مقسمة ، كما تفصل بين أراضي القبيلة الواحدة فيصبح جزء منها في أرض سيناء وجزءها الآخر في فلسطين وشرق الأردن مما يصعب مهمة الحكام في مناطق تشبك مصالحها في المرعى والماء (٢) .

أما الحدود الغربية بين مصر وليبيا فتبدأ على بعد عشرة كيلومترات شمال غرب السلوم عند بئر الرملة ثم تتجه نحو الجنوب الغربي إلى سيدي عمر ومنها نحو الجنوب مارة ببئر سفروان وبئر الشقة ، وتنتهي الحدود بعد ذلك نحو الجنوب الغربي حيث تتبع طريق الاخوان حتى قبيل واحة جنوب .

(١) E. Krenkel Geologie der Erde, erster Teil, Sinai, P. 87

(٢) عيسى عمار 'الدخل الشرق لمصر' بحث مسروح من مجلة الجمعية الجغرافية المصرية - مجلد الواحد والثلاثون - ١٩٤٦ - ص ١٩٨ .

اذ تتجه فجأة نحو الجنوب الشرقى تاركة هذه الواحة فى الأراضى الليبية .  
ويسير الحد بعد ذلك مع خط طول ٢٥ شرقاً حتى يلتقى بخط عرض ٢٢ شمالاً على السفوح الشمالية لجبل العوينات . ويبدو أيضاً أن هذه الحدود ليست طبيعية اذ فصلت بين واحى سيوه وجنوب بينا يتعان فى منخفض واحد (١) .

وحيث تنتهى الحدود الغربية تبدأ الحدود الجنوبية من السفوح الشمالية لجبل العوينات ثم يسير الحد السياسى شرقاً مع خط عرض ٢٢ شمالاً حتى البحر الأحمر . وأما الحدود الادارية بين مصر والسودان فتظهر على شكل اثناء شمال وادى حلفا بنحو ٣٥ كيلومتراً بحيث تقع أذنجان فى مصر وقرى فى السودان . وتظهر الحدود الادارية مرة أخرى عند وادى قبقة وهو أحد روافد وادى العلاقى الذى يتصل بالنيل . ويبدو الحد الادارى هنا على شكل قوس يثنى نحو الجنوب ثم نحو الشمال الشرقى فى اتجاه عام ماراً بجبل مقسم وأم الطيور ويترى منيعة وشلاتين حتى ينتهى الى البحر الأحمر جنوب وادى الحوضين . وقد خطت هذه الحدود الادارية بين مصر والسودان وفصلت منها نحو ١٦٠٠٠ كم ٢ لتفصل بين أراضى جماعة البشارية فى مصر والعبادية فى السودان حتى تنتهى المنازعات بينهما . ولكن هذه الحدود الادارية لم تفصل تماماً بين القبيلتين ، هذا فضلاً عن أن هذا الجزء الذى اقتطع من مصر يعتبر من أغنى أجزاء الصحراء الشرقية فى الماء والنبات ويحتمل أن يكون غنياً فى الثروة المعدنية .

ويظهر أيضاً أن الحدود السياسية الجنوبية ليست هى الأخرى حدوداً طبيعية : بل ان الطبيعة قد أكلت الوحدة بين شطرى الوادى بما هو واضح من تدخل كثير من المظاهر الطبيعية فى الشمال والجنوب . فمظاهر السطح تكاد تجرى بنظام واحد اذ أن سلاسل جبال البحر الأحمر النارية الحديثة تتجاوز حدود مصر الى شرق السودان وإلى الحضية الحيشية : والصحراوان الشرقية والغربية يجرى بينهما نهر النيل بسهله الفيضى مكوناً ظاهرة طبيعية



حتى الوقت الحاضر . ولكن هذا الموقع الجغرافي كان وبالا على مصر في عصور الضعف والانتكاش ، فكُن كثيرًا من الغزوات وموجات الهجرة من الوصول الى أرض مصر ، وعلى الرغم من أن هذه الهجرات والغزوات قد عطلت مجرى التاريخ المصري فترة من الزمن فإنها قد جددت في الوقت نفسه دم مصر وأضافت الى ملكات شعبها ومواجهه ، فالاختلاط الذي انجملت عنه هذه الهجرات والغزوات قد زاد في تنوع ثروة البلاد الجنسية والثقافية .

وقد ساهم الموقع الجغرافي بتصيب كبير في تشكيل تاريخ مصر الحديث وتطورها الاقتصادي ، فقد أبرزت الحملة الفرنسية على مصر قيمة الموقع الجغرافي لهذه البلاد ، وهكذا انجذبت الأنظار نحو الشرق الأدنى بوجه عام ، ونحو مصر بوجه خاص . وكان من أهم أغراض هذه الحملة أن تستغل موقع مصر الجغرافي في الاشراف على الطريق التجاري بين الشرق الأقصى وغرب أوروبا . وكانت الحملة الفرنسية نقطة التحول في تاريخنا الحديث من التواهي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فلأول مرة في تاريخ مصر الحديث تدخل البلاد في دائرة حكم أوربي مستنير ، وشاهد المصريون أنظمة أخرى تخالف ما ألفوه من قبل ورأوا كيف استطاعت المدينة الأوربية أن تغزو بلادهم وأن تحطم قوة الممالك والعثمانيين التي كانت تسيطر على مصائرهم . وهكذا بدأت النقطة الكبرى التي دفعت المصريين الى ادخال الحضارة الأوربية الى بلادهم .

وبجفر قناة السويس التي افتتحت رسمياً في نوفمبر ١٨٦٩ تحول النقل البحري بين الشرق والغرب تدريجياً عبر مصر ، وزاد مع هذا التحول التدويري توجيه أنظار العالم نحو موقع مصر الجغرافي في وقت لم تكن فيه مصر من القوة والتأسيك بحيث تستطيع الافادة منه كما فعلت في بعض عصورها السابقة . وقد حفرت هذه القناة لحساب شركة فرنسية أخذت امتياز حفرها من الحكومة المصرية ، وكان للشركة وحدها الحق في جباية رسوم المرور عبر القناة ، فصر لم تسرد موارد الدخل الذي كان لها من قبل إلا بعد تأميم القناة في عام ١٩٥٦ .



وقد بدأت مصر تستغل مركزها الجغرافى الممتاز : فظهرت نواة أسطول تجارى مصرى فى البحرين المتوسط والأحمر ممثلا فى سفن الشركة العربية للملاحة البحرية وغيرها ، ونحو الأسطول التجارى المصرى يعنى نمو فى الدخول القومى وذلك لحصول شركات الملاحة المصرية على أجور نقل البضائع المصرية أو الأجنبية : هذا فضلا عن سهولة تصريف المنتجات المصرية فى أسواق الدول المجاورة حيث تروج فيها لرخسائها وملائمتها للذوق الشرقى .

وقد تعاونت عوامل جغرافية طبيعية أخرى لا يراز أهمية الموقع الجغرافى وتتلخص هذه العوامل فى :

١ - النيل : ذلك النهر الذى خلق الوادى . وكون فى قاعه هذا السهل الخصيب واقطع من البحر تلك الدال الفسيحة يحمل لنا والوادى فى كل عام الطمى اللين الذى يجدد خصب التربة ، هذا فضلا عن الماء الوفير الذى يزيد فى قدرة البلاد على الانتاج .

والنيل بنظامه الخاص من الفيضان قد فرض على المجتمع المصرى الزراعى الوحدة والنظام ، وكان الشريان الأساسى للمواصلات بين مختلف جهات الوادى والدلتا . فساعد على ربط أنحاء البلاد ونشأ بين المصريين نوع من التعاون كان نواة لقيام حكومة مركزية منظمة تسهر على أمن البلاد ورفاهيتها وتضمن حسن توزيع المياه . وساهم النيل فى ظهور موانئ هامة لعبت دوراً له قيمته فى تاريخ البلاد مثل رشيد ودمياط . وكانت السويس ولا تزال على اتصال بالوادى عن طريق ترعة الاستماعية . ويصل القطن المصرى عن طريق النيل لفرعة الحمودية الى الاسكندرية لتصديره الى الخارج.

وللنيل الفضل الأول فى خلق مدينة زراعية راقية منذ فجر التاريخ وقد ساهم الموقع الجغرافى فى نقل مظاهر هذه المدينة الى دول حوض البحر المتوسط . فالتل كان يفيض فى أواخر الصيف وأوائل الخريف فيغذى التربة بالماء والغرين ، ثم ينحسر عنها فى وقت ملائم لزراعة المحاصيل الشتوية

فهي التي قللت هذه الغزوات وأضعفت تأثيرها حتى استطاعت مصر في جميع الحالات أن تنهض وتعاود سيرتها الأولى بعد فترة طويلة أو قصيرة من الاضطراب . ومصر من هذه الناحية تختلف كثيراً عن العراق التي تجاورها سهوب بادية الشام من ناحية وأعلى هضبة إيران والأناضول وما ورأيهما من ناحية أخرى مما جعل العراق في معظم أدوار تاريخها تحت رحمة الغزاة الذين كثيراً ما وصلوا في أعداد كثيرة وعلى موجات متتالية لأن الصحارى والبادية التي تحيط بالعراق ليست في جفاف صحارى مصر : فهي لم تنظم سبل المجرات ولم تخفف من حدة الغزوات : وكثيراً ما طغت البادية على الحضار فظالت القوضى وعدم الاستقرار .

والصحراء فضل آخر على نمو الحضارة المصرية : فقد كان لوجود المعادن بها وبخاصة الذهب وأحجار الزخرفة والبناء أثر كبير في تقدم فن الصباغة وفن الحفر والبناء فنحت المصريون القدامى التماثيل الرائعة وشيدوا الهياكل والمعابد . وتساهم الصحراء في الوقت الحاضر بثروة معدنية قيمة تتمثل في زيت البترول والفوسفات والمنجنيز والكبريت وغيرها . هذا فضلاً عما اشتهرت به الواحات من أشجار النخيل والتفاحية والمواالح والزيتون .

وخلاصة القول أن هذه العوامل الجغرافية قد تعاونت مع الموقع الجغرافي فأخرجت أمة عريقة تجاهد لتتحدى حضارتها وتستغل موارد ثروتها .

من قمع وشعر ، ثم يسقط مطر الشتاء فيغذيها حتى نهاية موسم نموها وحلول فصل الحصاد في أواخر الربيع ، وعندما يتوقف الفلاح عن الزراعة في الصيف في وقت لم يعرف فيما نظام الري الدائم تشق أشعة الشمس الحلوة سطح التربة فتسمح بنفوذ الهواء إليها وتقلبها بعناصرها المفيدة وتطهرها من الآفات . وهكذا يتجلى مبالغ تعاون عناصر البيئة المختلفة من تربة خصبة ونظام جريان المياه والمناخ .

٢ - المناخ : يمتاز مناخ مصر حلة بأنه حار وجاف في نصف السنة الصيفية وأنه معتدل وممطر في نصف السنة الشتوية . وهذا الموضع الملائم الخاص أبعد الأثر في نمو حضارة مصر منذ أقدم العصور إذ ساعد اعتدال المناخ على نشاط الفلاح والعامل وهما عماد الحضارة . وكان لصفاء الجو أبعد الأثر في تقدم فن الطب والاحتياط عند قدماء المصريين وتقدم الطيران في الوقت الحديث . وقد تعاون المناخ مع الموقع الجغرافي لصالح الاقتصاد المصري . فثلا قد ساعد هذا المناخ على سرعة تزوج الموالح التي تجد سوطاً رائحة في وسط وغرب أوروبا قبل وصول موالح إيطاليا وأسيا إلى هذه السوق وقد شجع هذا المناخ على وصول السياح من أنحاء العالم لزيارة مصر وآثارها القدعة ولا سيما أن هذه البلاد تقع على الطريق الملاحي الرئيسي الذي يربط الشرق الأقصى عبر قناة السويس بغرب أوروبا والمحيط الأطلسي .

٣ - السطح : تتألف مصر من الوادي والدلتا ومن الصحراء على جنباتها شرقاً وغرباً والكل إم إقليم أثره في نمو الحضارة . فإقليم الوادي والدلتا يمتاز بخصوبة التربة ويتجدد عناصرها في كل عام . فهي كربة صنية لمن أحسن فلحها وتمهدها . والمطليحة في مصر دائمة العمل حتى في فترات اضمحلال المدينة وانقطاع جبل كاثارخ ، فالليل باق بانتظام في كل سنة يكسب الأرض خصباً جديداً ، وكان من أثر ذلك أن تمكنت مصر أن تخرج من كثير من فترات اضمحلالها وهي أصلح مما كانت وأقوى على النهوض والتقدم .

وعلى الرغم من أن مصر تقع في الركن الشمالي الشرق من افريقية محاطة بأقاليم فقيرة . إلا أن صحراء مصر كانت دائماً كالدرع تحمي البلاد شر الغزوات



## مناخ الدلتا والوادي

يتأثر مناخ مصر بعوامل طبيعية أهمها :

- (أ) الموقع الجغرافي بين خطي عرض ٢٢° شمالاً و ٣١° شمالاً مطلاً على البحر الأبيض المتوسط بنظامه المناخي الخاص .
- (ب) اختلاف مظاهر السطح ، فالوادي يمثل اقليماً منخفضاً بين هضبتين مرتفعتين هما الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وكان لهذا الوضع الخاص أبعاد الأثر في نظم الحرارة والرياح والأمطار ، وهي العناصر الرئيسية للمناخ .
- (ج) تأثير الاقليم بنظم الضغط والرياح على قارات افريقية وآسيا وأوروبا والمحيط الأطلسي .

ويمكن أن يقسم وادي النيل في مصر مناخياً الى اقليمين كبيرين وهما :

- (أ) الاقليم الواقع جنوب النيل وهو لا يتأثر بالأعاصير الشتوية .
- (ب) الاقليم الواقع شمالاً وهو الذي يتأثر بتلك الأعاصير تأثيراً مطرداً ، ولا شك أن مرور الانخفاضات الشتوية والربيعية بمصر يمثل أكبر ظاهرة مناخية تؤثر في مناخ البلاد ، ولولا تلك هذه الانخفاضات لما حدثت أنطار شتوية ولا هبت رياح الخماسين ولا العواصف الرعدية البرقية ولما اختلفت مهبّات الرياح . ولولا هذه الانخفاضات لكان مناخ مصر مناخاً حاراً في الصيف دافئاً في الشتاء مع رياح شمالية دائمة جافة لا تتغير .

وتكثر هذه الانخفاضات في أشهر الشتاء والربيع وهي نادرة في أشهر الصيف وأوائل الخريف ، وعند مرورها تنخفض رياح الشمال وتصبح رياحاً

غربية أو جنوبية أو شرقية أو بين هذه الاتجاهات (١). ولما كانت هذه الانخفاضات تتوالد في حوض البحر الأبيض المتوسط فلا بد أن نفوذها يضعف كلما توجهنا جنوباً ، حتى الإسكندرية تقل الرياح الحادة من الشمال قلة كبرى بحيث لا تزيد نسبتها عن ١٥ ٪ في يناير ومارس وإلى أقل من هذا في شهر فبراير ، بينما تصل نسبة الرياح الجنوبية والغربية والجنوبية الغربية إلى نحو ٤٠ ٪ في كل من شهري يناير وفبراير ، وفي الجزيرة تنخفض نسبة رياح الشمال في يناير إلى ٧,٤ ٪ والرياح الشمالية الشرقية إلى ٣,٨ ٪ ، بينما نسبة الرياح الجنوبية ١٧,٦ ٪ والجنوبية الغربية ١٥,٨ ٪ (٢).

لما المينا فتمثل منطقة الانتقال بين الاقليمين الكبيرين ، ويمثل الجدول الآتي الأرقام الدالة على النسبة المئوية لتيوب الرياح في هذه المنطقة .

	شمالية	شمالية	شرقية	جنوبية	جنوبية	غربية	غربية	شمالية	سكون
	شرقية	شرقية	شرقية	جنوبية	جنوبية	غربية	غربية	شمالية	
يناير	٢٦,٧	٩,٧	٦,١	٣٩,٠	١,٤	٣,٦	٩,٣	٢٩,٧	
يوليو	٢٢,٩	٣,٠	٥,٤	٦,٧	—	١,٢	١٤,٥	٦,٧	

ويبدو من أرقام شهر يناير قلة الرياح الجنوبية وغيرها من الرياح التي تتأثر بمرور الأعاصير ، بينما ترتفع نسبة رياح الشمال بدرجة كبيرة ، هذا فضلاً عن زيادة نسبة فترات السكون ، مما يجعلنا نتفقد أن نفوذ أعاصير البحر المتوسط قل أن يصل إلى المينا حتى في أشهر الشتاء . والواقع أن اقليم المينا في الشتاء اما تهب عليه رياح الشمال من منطقة الضغط المرتفع الواقعة في شماله ، أو أن تسود فيه حالة سكون لأنه هو مركز لمنطقة ضغط مرتفع .

(١) محمد عوض : شهر النيل - الطبعة الأولى - ٢١٣ وما بعدها .

(٢) ١ - المرجع السابق ص ٢١٤

ومنى انتقلنا جنوباً دخلنا في منطقة تسود فيها رياح الشمال طول العام ،  
فنسبة الرياح الشمالية والشمالية الغربية في أسبوط تزيد على ٦٧ ٪ ، أما أسوان  
فهى أكثر بلاد مصر تأثراً بالرياح الشمالية .

من هذا العرض يبدو واضحاً أن الوادى مقسم الى اقليمين مختلفين  
من حيث مدى التأثير بمرور الأعاصير ، ويمكن أن يقسم الوادى أيضاً  
الى أقاليم مختلفة على أساس عامل المطر .

(أولاً) إقليم السواحل الشمالية : يتميز بمناخ معتدل ممطر في الشتاء  
وحار جاف في الصيف ، وتعتبر الاسكندرية خير مثال لهذا المناخ لموقعها  
على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتمثل عناصر هذا المناخ فيما يأتى :

#### (١) الحرارة :

ينطق الجدولان الآتيان بالفرق الكبير بين نظامى الحرارة  
في القاهرة والاسكندرية (١) .

ومن هذين الجدولين تبدو الظاهرات الآتية :

١ - الاسكندرية أدفاً في فصل الشتاء من القاهرة : وهى في الواقع  
أدفاً من كثير من بلاد الصعيد . وهى أيضاً أقل حرارة في الصيف من القاهرة  
فالاختلاف الشهري أقل في الاسكندرية منه في كثير من بلاد القطر .

٢ - ان الفرق بين النهاية الكبرى والنهاية الصغرى في الاسكندرية يبلغ  
نحو ثمانى درجات في يناير وسبع درجات في يولييه ، بينما يصل هذا الفرق  
في القاهرة الى نحو احدى عشرة درجة في يناير وأربع عشرة درجة في يولييه .  
ومعنى هذا أن الليل أدفاً كما أن حرارة النهار ألطف في الاسكندرية منها  
في القاهرة . فأن المناخ الصحراوي على الاسكندرية ضعيف جداً . ومرجع  
هاتين الظاهرتين الى تأثير البحر المطلف والرياح التى تهب من هذا البحر .

(١) ١ - محمد عوض محمد : شهر النيل ص ٢٢٢





ذلك لأن البحر يحتفظ بالحرارة بينما يفقدها اليابس بسرعة ، كما أن الماء لا تزداد حرارته بنفس السرعة التي تزداد بها حرارة اليابس .

٣ - أما الظاهرة الثالثة فهي أن شهر أغسطس هو أكثر شهور السنة حرارة ، بينما في القاهرة يولييه هو أحر الشهور . وهذه الظاهرة أيضاً مرجعها تأثير البحر . فنظراً لأن معظم رياح الاسكندرية تهب من جهة البحر ، كانت حرارة البحر أكثر تأثيراً في مناخ المدينة من حرارة البر . ولما أن البحر عادة أبطأ من البر في امتصاص الحرارة الشمسية وأبطأ من البر أيضاً في فقدانها بالتشعاع ، فلذلك يتخلف شهر الحرارة العظمى في الاسكندرية عنه في القاهرة ويتراوح مقدار التخلف من ١٥ : ٢٠ يوماً<sup>(١)</sup> .

#### (ب) الرياح :

يبين الجدول الآتي توزيع النسب المئوية لأنواع الرياح التي تهب على الاسكندرية في أشهر السنة المختلفة . وهو يمثل متوسط احدى وثلاثين سنة (من سنة ١٨٨٨ : سنة ١٩١٨) (٢) . ومن الدراسة التحليلية لهذا الجدول نستنتج الحقائق المناخية الآتية :

١ - تسود رياح الشمال طول السنة اذ تبلغ نسبة الرياح الشمالية ٢٤ ٪ والشمالية الشرقية ١٣ ٪ والشمالية الغربية ٢٧ ٪ . بينما تمثل رياح الجنوب نسبة ضعيفة فتبلغ نسبة الرياح الجنوبية ٣ ٪ والجنوبية الشرقية ٤ ٪ والجنوبية الغربية ٥ ٪ ، ورياح الجنوب تظهر عادة عند مرور الانخفاضات الجوية .

٢ - في فصلي الخريف والشتاء تسود رياح الشمال الا أثناء مرور الانخفاضات الجوية عبر البحر الأبيض من الغرب الى الشرق فيتغير نظام الرياح وتسود رياح الجنوب . ويتغير اتجاه الرياح وفق موقع الاعصار بالقسمة

J. I. Craig : Effect of the Mediterranean Sea on the temperature in Egypt; (١)

Cairo Scientific Journal, Vol. VII, No. 80.

Mahmoud Hamed : The Climate of Alexandria, p. 51 . (٢)

الاسكندرية	توزيع النسب المئوية لأنواع الرياح في السنة							
	شمالية	شمالية شرقية	شرقية	جنوبية شرقية	جنوبية	جنوبية غربية	غربية	شمالية غربية
يناير	١٢	٩	٧	٦	٦	١٥	١٦	١٨
فبراير	١٢	١٠	٧	٧	٦	١١	١٨	١٩
مارس	١٧	١٥	٨	٧	٤	٥	١٥	٢٤
أبريل	٢١	١٨	٩	٧	٣	٢	١٠	٢٥
مايو	٢٦	١٩	٧	٦	٢	١	٩	٢٤
يونيه	٢٣	١١	٢	٢	١	١	٨	٣٨
يوليه	٣٠	٤	—	—	—	—	١١	٥٢
أغسطس	٣٤	٦	—	—	—	—	٧	٤٨
سبتمبر	٤١	١٣	٢	١	١	١	٣	٣١
أكتوبر	٣١	٢٥	٧	٢	٢	٢	٥	١٧
نوفمبر	١٩	١٨	٧	٤	٤	٨	١٢	١٥
ديسمبر	١١	٩	٧	٦	٦	١٥	١٤	١٥
السنة	٢٤	١٣	٥	٤	٣	٥	١١	٢٧

لمنطقة الاسكندرية قسود الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية عندما يكون الانخفاض شمال غرب المدينة ، وتكون الرياح جنوبية عندما يكون الانخفاض شمال المنطقة . وعندما يترك الانخفاض مكانه متجهاً نحو الشرق تبدأ الرياح الغربية والشمالية الغربية في الظهور (١) .

٣ - لا تزال رياح الشمال هي الرياح السائدة في فصل الربيع ، بل ان نسبتها تزيد في هذا الفصل عنها في فصل الخريف والشتاء . ويمتاز

(١) ١ - محمود حاد محمد : مناخ العالم - ص ٢٥٢ - ٢٥٤

ب - W. G. Kendrew : The Climates of the Continents, p. 273

فصل الربيع هنا يرياح الخماسين وهي تبدئ من شهر فبراير وتنتهي في منتصف يونيه . والخماسين رياح تهب من الجهات الجنوبية والجنوبية الشرقية والغربية على مصر عامة . ومرجع هبوبها هو مرور انخفاضات جوية آتية من الغرب . وقد قسم مستر ستون هذه الانخفاضات الى نوعين وهما : الانخفاضات التي تمر على البحر الأبيض من الغرب الى الشرق ، والانخفاضات القادمة من الصحراء الليبية في نفس الاتجاه . وبينما نجد أن المجموعة الأولى كثيرة الحدوث في فبراير ، فإذا بالمجموعة الثانية تغلب في أبريل ومايو . وأما شهر مارس فيتميز بمقادير متساوية من النوعين (١) . وقد أحصيت الانخفاضات في مدى ستة عشر عاماً (٢) فبلغ عددها ١٨٥ منها ٤١ في فبراير ، ٤٤ في مارس ، ٤٨ في أبريل ، ٣٤ في مايو ، ١٨ في يونيه . ويضاف الى ذلك أن انخفاضات شهر فبراير تنشأ عنها رياح خاسينية قصيرة المدى تدوم نحو يوم أو يومين ، وهي ليست رياحاً شديدة الحرارة لأنها تهب في وقت لم يتم فيه بعد تسخين الأقطار الجنوبية ، ولذلك تمر دون أن نشعر بأن هناك خاسين . أما الانخفاضات الصحراوية في أبريل ومايو فتسبب رياحاً خاسينية حارة تدوم ثلاثة أيام أو أربعة ، وكثيراً ما تحمل معها مقداراً كبيراً من الرمال وهذه هي التي يطلق عليها الجميع رياح الخماسين ، مع أن جميع العوامل التي سببها هي نفس العوامل التي تسبب نفاثاتها في فبراير ومارس . هذه هي رياح الخماسين التي كثيراً ما تضايق الأهالي ، وهي على كل حال لا تعتبر عقبة في سبيل نشاط السكان لأن مدة اشتدادها قد لا تتجاوز بضعة أيام مبعثرة في فصل الربيع . وهي نقطة ضعف لا نذكر إذا قورنت بالمرزايا العديدة لمتاخم الاقليم . فهنا رياح الشمال المتعشة العلية والسماء الصافية والشمس الساطعة طوال السنة ونسيم البر والبحر الملطف .

(١) ١ - محمد عوض محمد : نهر النيل - ص ٢٢٦

ب - Sutton : A Barometric Depression of The Kamsin Type, p. 1

(٢) من سنة ١٩٠٧ الى سنة ١٩٢٢ (المرجع : رقم ١ ب) .

٤ - وفي فصل الصيف تسود رياح الشمال وتكاد تختفى رياح الجنوب.  
ففى شهر يونيه تمثل الرياح الجنوبية الشرقية ٢ ٪ والرياح الجنوبية ١ ٪ ،  
والرياح الجنوبية الغربية ١ ٪ ، وتختفى هذه الرياح فى شهرى يوليه وأغسطس

أما سرعة الرياح فيوضحها الجدول الآتى (١) :

المنطقة	متوسط سرعة الرياح بالكيلومترات فى الساعة					
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه
الإسكندرية (٢)	١٥,١	١٦,٦	١٥,٧	١٥,٦	١٤,٤	١٥,٦
القاهرة	١٣,٣	١٤,٩	١٧,٦	١٨,٨	١٩,٧	٢٠,١
	يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الإسكندرية	١٦,١	١٥,١	١٣,١	١٠,٨	١٢,٤	١٣,٢
القاهرة	١٨,٣	١٧,٣	١٨,٣	١٧,٩	١٥,١	١٣,٤

ويبدو من هذا الجدول أن سرعة الرياح متقاربة فى أشهر السنة المختلفة ،  
ولكن سرعة الرياح تقل فى فصلى الخريف والشتاء عنها فى فصلى الربيع  
والصيف . كذلك يلاحظ أن سرعة الرياح فى الإسكندرية أقل منها فى القاهرة  
ولعل ذلك راجع الى طبيعة الموقع الجغرافى . فالإسكندرية مدينة مفتوحة  
مما يسهل تنظيم حركة الرياح ، بينما تحاط القاهرة بحافى المصبتين الشرقية  
والغربية مما يزيد فى سرعة الرياح أثناء انحدارها نحو المدينة ، وسرعة الرياح  
هنا تقلو معقولة ولا تعرقل أى نشاط بشرى .

A) Mahmoud Hamed : The Climate of Alexandria, p. 47 (١)

B) Meteorological Department, Report for the Years 1945-1947, Cairo 1950, p. 131

(٢) ١ - جدول الإسكندرية يمثل متوسط الفترة من ١٩٠٣ الى ١٩٢٢

ب - جدول القاهرة يمثل متوسط الفترة من ١٩٠٦ الى ١٩٢٠ (مرصد حلوان) .

أما العواصف (١) درة ولا تزيد عادة على خمس عواصف في السنة وتحدث في الفترة من نوفمبر إلى مايو ، وذلك نتيجة انخفاض شديد العمق بحر قرب الاسكندرية تستمر العاصفة عادة أكثر من بضع ساعات . وفي مدة ١٩ سنة (١٩٠٤ - ١٩٢٢) حدثت ٩٧ عاصفة موزعة كالآتي :

يونيه - سبتمبر	صفر	ديسمبر	١٩	مارس	١١
أكتوبر	١	يناير	٢٠	أبريل	٦
نوفمبر	١٠	فبراير	٢٨	مايو	٢

هذا ويلاحظ أنه في نفس الفترة ، لم ترد عدد العواصف التي مكثت أكثر من ١٢ ساعة على عاصفة موزعة كالآتي :

مارس - أكتوبر	صفر
نوفمبر	١
ديسمبر	٢
يناير	٢
فبراير	٩

#### (ج) الرطوبة النسبية :

ويوضحها الجدول الآتي ، ويبدو منه أن الرطوبة النسبية تصل إلى أقصى ارتفاع لها في فصل الصيف وتهبط إلى أدنى نسبة لها في فصل الشتاء . ومرجع هذه الظاهرة إلى عاملين وهما :

- ١ - في فصل الصيف تسود رياح الشمال الرطبة وتكاد تختفي رياح الجنوب الجافة مما يساعد على رفع الرطوبة النسبية . أما في الشتاء فتظهر رياح الجنوب الجافة ولاسيما أثناء مرور الانخفاضات الجوية مما يساعد طبعاً على خفض الرطوبة النسبية .

(١) العاصفة هي رياح ريدها معها على ٥ كم في الساعة وتستمر على الأقل لمدة ساعة

توزيع الرطوبة النسبية في كل شهر من شهور السنة						النقطة (١)
السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه
	٦٦٪	٦٤	٦٥	٦٧	٧٠	٧٢
٦٨	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
	٧٢	٧١	٦٧	٦٨	٦٥	٦٥

٢ - نظراً لموقع الاسكندرية على ساحل البحر ، لا ترتفع درجة الحرارة كثيراً في فصل الصيف مما يساعد على احتفاظ الجو برطوبة نسبية عالية (٢) .

#### (د) الأمطار :-

هذا الاقليم من أغزر بلاد القطر أمطاراً اذ يبلغ متوسط ما يسقط بالاسكندرية من المطر نحو ٢٠٤ مم في السنة . وتقل الأمطار كلما اتجهنا شرقاً وجنوباً ، فمقدار المطر في رشيد ١٥٣ مم ، وفي دمياط ١٢٤ مم ، وفي بور سعيد ٩٢ مم ، كما أن مقدار المطر في كفر الزيات ٥٦ مم ، وفي القاهرة ٣٢ مم . وتفسر هذه الظاهرة يبدو في شكل الساحل واتجاه الرياح التي تحمل المطر . فن الاسكندرية الى رشيد ينتجه الساحل من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي ، ومن رشيد الى دمياط يكون من الغرب الى الشرق تقريباً مع تقوسات هنا وهناك ، ومن دمياط الى بور سعيد يكون اتجاه الساحل من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي .

(١) Hamed Mahmoud : The Climate of Alexandria, p. 36

هذه الأرقام تمثل متوسط الفترة من سنة ١٨٨٨ الى سنة ١٩٢٢

(٢) الرطوبة النسبية هي النسبة في المائة بين مقدار بخار الماء الموجود فعلاً في الجو وبين مقدار بخار الماء الذي يمكن أن يتواجد فيه اذا تشبع الجو تماماً في درجة حرارة معينة . وكلما ارتفعت درجة حرارة الهواء كلما زادت قابليته لتشبع ببخار الماء فتأخذ الرطوبة النسبية في التناقص .

(مصدر حامد محمد : مناخ العالم - ص ١٤٧ : ١٤٨) - القاهرة ١٩٣٦

ولما أن أكثر هبوب الرياح التي تحمل المطر الى هذه السواحل يكون  
اما من الغرب أو من الشمال الغربي ، حتى كلا الحالتين نرى أن ساحل  
الاسكندرية يعترض هبوب هذه الرياح اعتراضاً فتسقط قهقراً كبيراً  
من أمطارها . وتقل الأمطار كلما اتجهت هذه الرياح نحو الشرق أو الجنوب .

أما من حيث نظام سقوط المطر في الاسكندرية فيوضحه الجدول الآتي :

توزيع الأمطار في كل شهر بالليترات							المعلقة
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه	السنة	الاسكندرية (١)
٥٤	٢٣	١٤	٢	١	—	٢٠٤	بور سعيد
١٢,٥	١٤,٥	٧,٨	—	١٤,٥	—	٩٢,٣	
يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	السنة	الاسكندرية
—	—	١	٦	٣٥	٦٦	٢٠٤	بور سعيد
—	—	—	—	٢٤	٤٢,٦	٩٢,٣	

ومنه يتضح أن أشهر الصيف جافة تماماً ، ويبدأ سقوط المطر قليلاً جداً  
في نهاية سبتمبر ثم يزيد في أكتوبر ونوفمبر ليصل الى القمة في ديسمبر  
حيث يسقط من المطر ٦٦ مم في الاسكندرية أى ضعف ما يسقط في القاهرة  
طوال العام ، ثم يقل المطر بعد ذلك حتى يكاد ينعدم في الربيع . ويسقط المطر  
في هذه الفترة بفعل الرياح الغربية والشمالية الغربية والشمالية ، وهذه تنقل  
من البحر الأبيض الى الساحل وأرض الدلتا ، أو بعبارة أخرى من جهات  
أدفاً نسبياً الى جهات أبعد نسبياً مما يساعد على تكاثف بخار الماء وسقوط  
الأمطار .

وبلاحظ أن كمية الأمطار قليلة جداً ولذلك تعتمد الاسكندرية على ترعة  
المحمودية التي تغذيها بالمياه اللازمة . وتأخذ ترعة المحمودية من فرع رشيد

Mahmoud Hamed : The Climate of Alexandria p. 52 (١)

بملاحظة : تمثل هذه الأرقام متوسط الفترة من سنة ١٨٨٩ الى ١٩٢٢

عند العطف. ثم تتجه نحو الجنوب الغربي حتى نقطة اتصالها بترعة الخندق الشرقي. ويعدّها تغير اتجاهها صوب الشمال الغربي نحو الاسكندرية . وتقوم محطة طلبليات العطف بتغذية ترعة الحمودية بالمياه اللازمة ولا سيما في فصل الصيف قبل موسم الفيضان (١) . وتعتمد بورسعيد على ترعة الاسماعيلية ، ويعتمد الاقليم عامة على مياه النيل ومياه الآبار عند الكشبان .

هذه هي العناصر الرئيسية لمناخ الاقليم . وقد تضافرت لتقدم مناخاً معتدلاً مشجعاً للنشاط البشرى طول العام . وقد شجع هذا المناخ حركة الاصطيفات في مدن الساحل وذلك للعوامل الآتية :

١ - الحرارة معتدلة ولا سيما اذا قورنت بمدن القطر الأخرى . كما أن انعدام الأمطار في الصيف يزيد في الرغبة للاصطيفات للتمتع بشمس ساطعة غنية بالأشعة فوق البنفسجية مما لا يظهر له في السواحل الشواطئ الأوربية الشهيرة .

٢ - ان حالة البحر في معظم أيام الصيف تسمح بمزاولة رياضة السباحة . ويوضح هذه الحقيقة الجدول الآتي :





وقد استغلت بلدية الاسكندرية مزايا هذا المناخ في دعايتها لتشجيع الاصطيف في مصيف المدينة الذي يمتد من سيدى بشر حتى العجمى . وأنشأت البلدية أرصفة من الخرسانة تبلغ مساحتها ٢٠,٠٠٠ متر مسطح ، وأقامت عليها أكشاك استحمام من الخشب أو من المبانى بأحجام مختلفة ، كما أقامت أكشاكاً على طيقتين أو ثلاثة كما هى الحال فى شواطئ سيدى بشر وجليمونوبولو واستانلى ، وكذلك أقامت البلدية أكشاكاً فى الشواطئ الشعبية خصصت لخلع الملابس دون أجر حتى تنال الطبقات الفقيرة نصيبها من التمتع والصحة ، وقد عنيت البلدية بتزويد الشاطئ بمقاصف جميلة لتساهم فى الترفيه عن المقيمين والمصطافين . ولذلك كله ازداد الاقبال على الاصطيف بالاسكندرية فقفز عدد الأكشاك من ٢٤٠٠ سنة ١٩٤٩ الى أكثر من ٤٥٠٠ سنة ١٩٦٢ . وأصبحت المدينة مزدحمة بالمصطافين الذين يزيد عددهم على نحو مائى ألف نسمة . ولذلك يجدر بالبلدية أن توسع فى اعداد شواطئ أبى قير والدخيلة والعجمى حتى تقابل أفواج المصطافين فى الأعوام القادمة . وقد رأت البلدية فعلاً أن توجه عنايتها الى شاطئ العجمى فأنشأت طريقاً جديداً بمنطقة العجمى عند الكيلو ١٧,٤٠٠ يصل ما بين الطريق الموصل الى مرسى مطروح وشاطئ البحر مما يسر لمرتادى الاسكندرية التمتع بشاطئ العجمى بعد أن كانت جميع الطرق فى هذه المنطقة طرقاً خاصة لا يمكن ارتيادها الا بعد دفع أتاوة معينة لصاحب الأرض التى يمر فيها الطريق الخاص .

(ثانياً) اقليم الدلتا : وهو أقل اعتدالا من الاقليم السابق ويمتاز بدفئه شتاء وحره صيفاً ، ولكن تلطف من مناخه الرياح الشمالية ومياه الفيضان عندما تملأ الترع وتغمر الحقول . وتتمثل عناصر مناخ الاقليم فيما يأتى :

#### (١) الحرارة والضغط :

ويبدو من هذا الجدول أن درجة الحرارة تأخذ فى الانخفاض تدريجياً ابتداء من أغسطس حتى يناير ثم ترتفع ثانية من فبراير حتى يولييه .

المنطقة						متوسط درجات الحرارة بالقياس التري					
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه
١١,٨	١١,٩	١١,٥	١٨,٦	٢٣	٢٥,٧	...	...	...	...	...	...
١١,٥	١٣	١٦	١٩,٨	٢٣,٤	٢٦,١	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
٢٦,٦	٢٦,٦	٢٤,٨	٢٢	١٨,٥	١٣,٨	...	...	...	...	...	...
٢٧,٢	٢٧	٢٤,٥	٢٢,١	١٧,٨	١٣,٣	...	...	...	...	...	...

وهذا الانسجام الطبيعي في توزيع درجات الحرارة يناسب نمو النباتات التي تمكث أكثر من فصل واحد في الأرض كالقطن والقصب والقمح ، وكذا النباتات التي تتأثر كثيراً بدرجة الحرارة كالكتان .

هذا ويلاحظ أن شهر يناير هو أبرد شهور السنة وأن شهر يولي هو أحرها ، والفرق بين متوسط درجات الحرارة في هذين الشهرين هو ١٥,٧ درجة مئوية في جنوب الدلتا و١٤,٨ درجة في وسطها . فتناخ الاقليم حار في الصيف ومعتدل في الشتاء .

### (ب) الرياح :

يبين الجدول الآتي متوسط سرعة الرياح بالكيلومترات في الساعة .

المنطقة						المنطقة					
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه
٣	٤	٣,٥	٤	٤,٥	٤	...	...	...	...	...	...
٨	١٠	١٠,٥	١٠,٥	١٠,٥	١٠,٥	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
٤	٣	٢,٥	٢,٥	٢	٢,٥	...	...	...	...	...	...
٧	٦	٦,٥	١٠,٥	٨	٧	...	...	...	...	...	...

ويتضح من هذا الجدول أن سرعة الرياح في جنوب الدلتا أعظم منها في شمالها (١) ، ومع ذلك فهذه السرعة ليست في جملتها كبيرة . وتبدو الرياح طول السنة هادئة لاتتصرف نحو النبات ، والأيام العاصفة نادرة الوقوع بصفة عامة .

والرياح السائدة هي ريح الشمال المتعشة التي تطفئ الجو وتزيده اعتدالاً وهي تمثل أعظم نسبة بين الرياح الهابة الا في فترات مرور الأعاصير . وتمثل رياح الشمال بأقسامها الثلاثة أكثر من ٥٠ ٪ من أنواع الرياح الهابة في السنة . كذلك يلاحظ أن فترة هدوء الرياح طويلة وهذه ظاهرة هامة لأنها تساعد على أن يحفظ النبات قوامه ولا يساقط اذا كان في بدىء أدوار نموه .

#### (ج) الرطوبة النسبية :

يتضح من هذا الجدول أن الرطوبة النسبية في وسط الدلتا أعظم منها

المنطقة									
توزيع الرطوبة النسبية في كل شهر من السنة									
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه	وسط الدلتا			
٨٢٪	٧٥	٧٤	٦٦	٥٩	٥٩	...			
٧٥	٧٠	٦٦	٥٨	٥٣	٤٣	جنوب الدلتا			
يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	وسط الدلتا			
٦٨	٧٢	٧٤	٧٧	٨١	٨٠	...			
٥٩	٦٥	٧١	٧٤	٧٤	٧٥	جنوب الدلتا			

في الجنوب : ومعنى هذا أن ظهور الضباب أكثر احتمالاً في وسط الدلتا . كما أن الرطوبة النسبية في نصف السنة الشتوى أعظم منها في نصف السنة الصيفى . وأخيراً يظهر الجدول أن الرطوبة النسبية تصل الى أعظم درجاتها في شهرى ديسمبر ويناير ، وتقل جداً في شهرى مايو ويونيه . ولهذا النتائج أهميتها الخاصة من ناحية الاستغلال الزراعى لأنها تدل على تركيز احتمال ظهور الضباب في فصل الخريف والشتاء ، أى في أثناء نمو النباتات الشتوية التي تحتاج عادة الى الضباب ليعوضها بعض النقص في كمية المياه في أثناء

(١) لد هذا راجع الى ارتفاع مرصد العباسية .

الشهور الأولى من نموها ، وأكثر النباتات احتياجاً للضباب هو الكنان في الأشهر الأولى من نموه .

ويلحظ أيضاً أن الرطوبة النسبية تنخفض كثيراً في أشهر الربيع أى في وقت تمام نمو النباتات الشتوية حيث تعظم الحاجة الى الجفاف . ويرجع سبب انخفاض الرطوبة النسبية في أشهر الربيع الى مرور بعض الأعاصير من الغرب ، وفي حالة حدوث الانخفاضات الخماسينية تهب الرياح الشرقية والجنوبية ويرتب على ذلك أن يكون الجفاف شديداً .

#### (د) الأمطار :

المنطقة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه	المجموع
وسط الدلتا	١٠	١٠	٢	٦	٣	-	
جنوب الدلتا	٩	٥	٤	٣	١	-	
وسط الدلتا	يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
وسط الدلتا	-	-	-	-	٥	٦	٤٢
جنوب الدلتا	-	-	-	٢	٣	٧	٣١

نستنتج من الجدول السابق أن مقدار ما يسقط من الأمطار في وسط الدلتا أكبر مما يسقط في جنوبها نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة النسبية في الأولى . غير أن الكمية ضئيلة جداً في كلتا الحالتين ولا يمكن الاعتماد عليها في الزراعة . كما أن فترة سقوط الأمطار تنحصر بين أكتوبر ومايو ، وهي رذاذ في معظم الأحيان فلا تقصر الزراعات الشتوية التي تكون قد قاربت على النضوج .

ويندر سقوط الأمطار (الغزيرة الشديدة التي تضر النبات المزروع ، وهذه تسمى عادة نتيجة لوجود انخفاض جوى شديد على شبه جزيرة سيناء أو جنوب فلسطين ، ويجذب هذا الانخفاض العواصف الرعدية التي تسبب كل هذه الأمطار الغزيرة) أكبر كمية سجلها مرصد العباسية كانت ٣٥,٥ ملمتراً في ١٧ يناير سنة ١٩٠٠ وأكبر كمية سجلها مرصد طنطا كانت

٤٢ ملليمترًا في ٣٠ أكتوبر ١٩٣٠<sup>(١)</sup>. وهذه المنطقة انتقالية بين الاقليم الصحراوي جنوباً واطليم البحر الأبيض المتوسط شمالاً ، والمطر في شطرها الجنوبي أقل منه في شطرها الشمال فقدر المطر في القاهرة ٣٤ ملليمترًا ، وفي طنطا ٤٢ ، وفي كفر الزيات ٥٦ . ويتراوح ما يسقط من المطر في هذا الاقليم بين ٢٥ ملليمترًا و ١٠٠ مم . والحد الشمال لهذا الاقليم هو خط مطر ١٠٠ ملليمترًا الممتد من جنوبي دمنهور الى غربي بور سعيد بانحراف الى الشمال الشرق .

(ثالثاً) اقليم الصعيد : ومناخه صحراوي قارى فادر المطر ، فان ما يسقط فيه من المطر لا يزيد على ٢٥ ملليمترًا . وهذا الاقليم واقع جنوب خط ممتد من جنوبي السويس الى بحيرة قارون واتجاهه من الغرب الى الشرق بانحراف قليل الى الشمال الشرق .

ويتأثر القسم الشمالى من هذا الاقليم حتى المنيا بأعاصير البحر المتوسط في الشتاء فيسقط بعض المطر كما يبدو من الجدول الآتى :

المجموع	متوسط المطر بالملليمتر (٢)						المنطقة
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه	
٣٣	٩	٥	٥	٢	١	-	مصر الوسطى
	يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
	-	-	-	٢	٢	٦	

(١) راجع : ١ - اللوحة رقم ٢٥ وهي تبين توزيع الأمطار السنوى في الدلتا .

Meteorological Atlas of Egypt, Cairo 1931

٢ - راجع مقالة : "Les pluies aux environs du Caire" R. Fourtau :

Bulletin de l'Institut d'Egypte, II, 1918-1919

٣ - مصلحة الطبيعيات Meteorological Report for the years 1945-47

Cairo 1950

(٢) محمود حماد محمد : مناخ الشام - القاهرة ١٩٣٦ - ص ٢٤٨

أما باقى الاقليم فلا ينزل فيه شيء من المطر الا القليل الشاذ النادر الذى قد يحدث عاماً ثم ينقطع سنين عديدة حتى يتناساه الناس الى أن تجد حالة شاذة أخرى فتعيد ذكرى نظيرتها التى نسيت . ومثل هذا المطر يأتى نتيجة زوينة اعصارية تخرج عن طريقها المألوف فتنزل ما بها من مطر غزير هطال ثم ينقطع فجأة ويصحو الجو وتقع السحب . ولا يبقى من ذكر ذلك الوابل القصير المدى سوى سيول تجرى فى الأودية الصحراوية على جانبي وادى النيل كما حدث فعلا فى اقليم قنا عام ١٩٥٤ . هذا هو المطر الصحراوى الذى يغذى أعشاب الصحراء فينعشها من ذبولها وجفافها .

أما عن النظام الحرارى فيوضحه الجدول الآتى :

البلدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه	السنة
القاهرة ...	١١,٥	١٣	١٦	١٩,٨	٢٢,٤	٢٦,١	٢٠,١
المنيا ...	١٣,٢	١٤,٤	١٨,٢	٢٢,١	٢٤,٨	٢٧,٩	٢١,٨
أسيوط ...	١١,٦	١٢,٢	١٧,٢	٢٢,١	٢٦,٠	٢٨,٨	٢١,٦
قنا ...	١٤,٩	١٧,٧	٢١,٧	٢٥,٦	٢٨,٤	٣١,٦	٢٤,٧
أسوان ...	١٥,٠	١٧,٠	٢٠,٩	٢٥,٧	٢٩,٤	٣٢,١	٢٥,٢
البلدة	يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	السنة
القاهرة ...	٢٧,٢	٢٧	٢٤,٥	٢٢,١	١٧,٨	١٣,٢	٢٠,١
المنيا ...	٢٨,٨	٢٨,٥	٢٥,٩	٢٤,١	١٩,٥	١٤,٤	٢١,٨
أسيوط ...	٢٩,٤	٢٩,١	٢٦,٣	٢٢,٥	١٨,٢	١٣,٥	٢١,٦
قنا ...	٣٢,٣	٣١,٧	٢٩,٥	٢٦,٢	٢١,٢	١٦,٤	٢٤,٧
أسوان ...	٣٢,٨	٣٢,٤	٣٠,٤	٢٧,٦	٢٢,١	١٦,٧	٢٥,٢

وينطق هذا الجدول بحقيقة مناخية هامة وهى أن الحرارة متشابهة فى نظامها فى كل هذا الاقليم . فشهر يناير أقلها حرارة بينما شهر يوليو أشدها حرأ . والحرارة أكثر فى الجيوب وتقل تدريجياً نحو الشمال .

أما عن النظام الحرارى فى الليل والنهار فيوضحه الجدول الآتى على سبيل المثال :

البلدة	يناير		يوليو	
	نهاية كبرى	نهاية صغرى	نهاية كبرى	نهاية صغرى
أسيوط ...	٢٠.١	٥.٨	٢٧.١	٢٢.٦
أسوان ...	٢٢.٧	٩.٦	٤١.٨	٢٥.٦
				الفرق
				١٤.٥
				١٦.٢

ويظهر أن النظام الحرارى متشابه فى الحالتين وإن اختلف فى المقدار ، ففي الشتاء ترتفع الحرارة نهاراً الى أن تصل الى نهايتها الكبرى حوالى الساعة الثانية بعد الظهر ، ثم تنخفض ليلاً الى أن تصل الى نهايتها الصغرى قبيل الفجر كما يبدو من الجدول . وهذه الحرارة المعتدلة فى النهار هى التى تجذب السائحين الى الأقصر وأسوان ويصحبها برودة فى الليل بحيث يصل الفرق الى نحو ١٤ درجة مئوية .

وفى الصيف ترتفع درجة الحرارة نهاراً فى أسيوط الى أن تصل الى ٣٧° وتعددها فى أسوان الى ٤٢° وهى درجة مرتفعة للغاية ولولا جفاف الهواء لكانت أكثر مما تتحملة طاقة البشر . ثم تنخفض الحرارة فى الليل فى أسيوط الى ٢٢.٦° ، وفى أسوان الى ٢٥.٦° فيكون الاختلاف اليومى ١٤.٥° فى الأولى ونحو ١٦° فى الثانية . فعنى هذا أن مناخ هذا الإقليم مناخ صحراوى قارى .

ويبدو من هذا العرض المناخى أن مصر تتمتع بمناخ صحراوى معتدل والتيل يقدم للبلاد ما ينقصها من مياه الأمطار كما يدل على ذلك الجدول الآتى :



الشهر (١)	تصرف النهر بملايين الأمتار المكعبة عند أسوان بعد بناء خزان أسوان ١٩١٢	ما يتقابل هذا التصرف من الأمطار على الوادي والدلتا
يناير	٢,٩٩٠	٥,٨ بوصة
فبراير	٢,٩٩٠	٤,٤٤
مارس	٢,٠٤٠	٤,٠
أبريل	١,٨٤٠	٣,٦
مايو	٢,١٣٠	٤,٠٨
يونيه	٢,٦٥٠	٥,١٦
يوليه	٤,٥٩٠	٨,٥٨٤
أغسطس	١٦,٩٠٠	٣٣,٠٠
سبتمبر	٢٠,٣٠٠	٣٩,٦
أكتوبر	١٤,٦٠٠	٢٨,٤
نوفمبر	٧,٢٦٠	١٤,١٦
ديسمبر	٣,٩٥٠	٧,٦٨

هذا ويلاحظ أن تقديرات المطر لفترة الفيضان مبالغ فيها لأن قدرأ  
كبيراً من مياه الفيضان يضيع في البحر المتوسط . وهذا الجدول ترجمة صادقة  
لقول هيرودوت أن مصر هبة النيل (١) .

A) Izzedin Ferid : The introduction of perennial irrigation in Egypt and (١)  
its effects on the rural economy and population problems of the country p. 21  
B) Mohamed Ibrahim Hassan Physical elements of agricultural Land use in the  
Delta : (Extrait du Bulletin de la société de géographie d'Egypte T.26 P230)

## **الفصل الثامن**

### **سكان مصر**

### **وتطورها الاقتصادى**

## **المحتويات**

أولا : زيادة الانتاج

ثانيا : تنوع الانتاج

ثالثا : الثروة الحيوانية

رابعا : تطور مصر الاقتصادى

خامسا : التنمية الزراعية فى وادى النيل الادنى

## سكان مصر وتطورها الاقتصادي

تتجه السياسة الاقتصادية الحديثة في مصر الى تحقيق أهداف رئيسية وهي زيادة الانتاج الزراعي وتنوع الانتاج الزراعي والعناية بالثروة الحيوانية وتنظيم الملكية الزراعية وتشجيع الصناعة وكل هذه الأهداف الرئيسية المتنوعة تتعاون لرفع المستوى الاقتصادي للسكان.

### أولاً: زيادة الانتاج:

#### ١- التوسع الزراعي:

ان المساحة الزراعية في مصر لم تزد كثيراً منذ أوائل هذا القرن بينما تضاعف عدد السكان كما يبدو من الجدول الآتي الذي يوضح مدى التناقص المستمر في نصيب كل فرد من المساحة المنزرعة اذ بلغ هذا النقص حوالي ٤٠٪ في مدى الخمسين سنة الأخيرة مما أدى الى الاهتمام الكبير بالتوسع الزراعي الأفقي والرأسي<sup>١</sup>.

١ د. طه، "المصري، مستقبل انتموسم"، رأي في مصر، د. محمد حسين فهماني، ص ١٩٠، ٤٢-٤١.

التعدادات	١٩٠٧	١٩١٧	١٩٢٧	١٩٣٧	١٩٤٧	١٩٦٠	١٩٧٣	١٩٩٦
عدد السكان (بالمليون)	١١,٣٠	١٢,٨	١٤,٢	١٥,٩	١٩,٠٤	٢٦,٠	٣٥,٠	٦٠
المساحة المزروعة (مليون فدان)	٥,٤	٥,٣	٥,٥	٥,٣	٥,٧٣	٦,١	٧,٠	٧,٥
المساحة التي تخص الفرد (بالفدان)	٠,٤٨	٠,٤٠	٠,٣٩	٠,٣٣	٠,٣٠	٠,٢٨		

<sup>١</sup> يقدر تعداد سكان مصر عام ٢٠٠٠م بحوالي ٦٦ مليون نسمة - جريدة الأهرام  
١٤/١٢/١٩٩٣ - ص ٧

## ٢- انتخاب البذور:

يجدر بالزراع أن يستعملوا بذورا منتقاة في الزراعة وقد نفذ هذا البند في زراعة القطن إلى حد كبير ولكنه صعب التنفيذ فيما يختص بزراعة الحبوب إذ أن المتبع عادة هو أن يحتفظ صغار الزراع بجزء من محصولهم لتقاوي السنة القادمة فإذا كانت حاصلاتهم من أنواع غير جيدة أنتجت زراعتهم القادمة محصولا ضعيفا في نوعه وكميته فلا مفر إذا من تدخل وزارة الزراعة لتهيمن على توزيع التقاوي المنتقاة ويحسن أن تسبق هذا الاجراء بحوث علمية تحدد الجود الأصناف التي تصلح في أجزاء مضر المختلفة، ومتى أثبتت التجارب جودة صنف من الأصناف ووفرة محصوله وقوة مقاومته للأمراض وسهولة تصريفه في الداخل أو في الخارج عمم استعماله وحرم استعمال غيره.

ولا يقتضي هذا أن تحتكر الوزارة بيع التقاوي المختلفة بل يكفي أن تعين في كل مركز عددا من التجار الذين يمكنهم أن يحصلوا على الكميات اللازمة من أنواع التقاوي المختارة ولن تراقبهم المراقبة الفعالة وقد بدأ تنفيذ هذا المنهج منذ ١٩٥٤ ويسير التنفيذ بتقدم ملحوظ.

## ٣- الدورة الزراعية والأسمدة:

تنتشر في مصر الدورة الثانية ومن أهم عيوبها أن فترة الشراقي قصيرة فلا تعطى الأرض المدة المناسبة للراحة كما أن هذه الفترة لا تظهر الا في السنة الثانية من الدورة ومن الأفضل

أن تستخدم الجورة الثلاثية التي تتميز باطالة مدة الشراقي وبالتوسع في زراعة البقوليات.<sup>١</sup>

وتستهلك مصر كميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية. ومصادر الأسمدة في مصر كثيرة تتمثل في نترات الصودا التي تنتشر في الوجه القبلي على جانبي وادي النيل ما بين أسبوط وأسوان شرقا وما بين أسبوط وجرجا غربا والفوسفات الذي يكثر في سفاجة والقصر والسباعية في جنوب اسنا وآزوت الهواء الذي إذا ركز وحول الى تشادر وظظ بنالجيز أعطى سمادا جيدا وهذا من السهل تنفيذه بعد أن تم مشروع كهرياء خزان أسوان والسد العالي إذ أمكن انتاج كميات كبيرة من الأسمدة سنويا. ولما أن القطر المصري يستهلك سنويا نحو مليون طن من الأسمدة أمكن الاحتفاظ بقدر كبير من الثروة القومية من أن تتسرب الى الخارج. وهناك مصادر أخرى للسماد تتمثل في القمامة وهي متوفرة في كل مدن القطر وتعتبر مصدرا للأمراض وفي روث الماشية وهو مصدر هام للسماد البلدي والنفايات العضوية من المصانع وهي مصدر غني للسماد الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الآزوت. وبدأت وزارة الزراعة تشرف اشرفا مباشرا على توزيع الأسمدة بحيث يصل الى الفلاح النوع المناسب من السماد لزراعته ولا يقع تحت تأثير الدعايات الواسعة لشركات السماد ولا شك أن صناعة الأسمدة الحديثة غطت حاجة الاستهلاك.

<sup>١</sup> راجع في هذا الموضوع الفصل السادس من هذا الكتاب عن الدورة الزراعية وأثرها في التنمية الزراعية

#### ٤- تجديد الأساليب الزراعية:

من أكبر متاعب الفلاح عملية نقل المياه من الترعة الى الأرض، وهو يستعمل لذلك الساقية التي تتعب دابته طول السنة أو الشادوف وهو أيضا متعب ولذلك يحسن أن تتولى الحكومة إنشاء طلمبات كبيرة على الترع وتسقي للفلاحين أرضهم بأجر معقول ولقد قامت بعض الشركات بهذا العمل وأقبل الفلاحون عليها.

وكذلك يحسن تشجيع استعمال الآلات الزراعية الحديثة عن طريق الجمعيات التعاونية وهذه الآلات على اختلاف أنواعها وأغراضها تسهل كثيرا من الأعمال الزراعية المختلفة وقد بدأت بعض الجمعيات التعاونية في تحقيق هذا الهدف.

#### ثانيا: تنويع الانتاج:

كان القطن عماد الانتاج الزراعي والمتحكم في الدخل القومي وكانت مساحة الأراضي المنزرعة قطننا حوالي ثلث الأرض المزروعة كما يصل القطن ومنتجاته الى نحو ٨٠٪ من مجموع الصادرات ولا شك أن هذا الاعتماد الكبير على محصول رئيسي واحد قد عرض مصر لأخطار عديدة منها:

١- يتعرض الدخل الأهلي لهبوط شديد اذا انخفضت أسعار القطن لسبب من الأسباب أو فتكت الآفات بجزء كبير من المحصول.

٢- يتأثر القطن المصري من مناهضة الأقطان الأجنبية الطويلة التيلة وكذلك من مناهضة المواد الجديدة التي بدأت تراحم القطن كالحرير الصناعي.

٣- إن الاعتماد على القطن وحده يقسم السنة إلى فصلين: فصل رواج وهو موسم القطن وفصل كساد وهو ما عدا هذا من شهور السنة وهذا يؤدي إلى عدم استقرار الحالة الاقتصادية على مدار السنة ولهذا الوضع أضراره إذ يشجع الفلاح على الاستدانة في فصل الكساد ليسدد في فصل الرواج ثم اسراف الفلاحين في هذا الفصل اسرافا يدفعهم إلى الاستدانة بعده مباشرة وإذا تنوعت المحصولات وزرعت غلات أخرى في أهمية القطن لحصل الفلاح على دخله مقسما على مرتين أو ثلاث كل سنة وهذا أجدى عليه وأدعى إلى استقرار الحالة الاقتصادية.

وغالبا ما يقوم تنويع الانتاج لتقليل المخاطر الاقتصادية التي يتعرض لها الزراع والتي تنجم عن التقلبات الجوية أو اصابة بالآفات أو تغيير في أحوال السوق يؤدي إلى انخفاض الأسعار. ومن البديهي أن هبوط الأسعار لا يطراً في وقت واحد لكل الحاصلات فتتويع الانتاج يؤدي إلى توزيع المخاطر.

وقد كان لتغير التعريفات الجمركية سنة ١٩٣٠ أثر كبير في تشجيع سياسة تنويع الانتاج بعد أن تمكنت الحكومة من رفع الضرائب لحماية الانتاج القومي.

ووفقا لتعرض مصر لهذه الأخطار السابقة رأت الحكومة توجيه السياسة الزراعية نحو تنويع الانتاج الزراعي وقد نجحت



هذه السياسة فالتسعت زراعة القمح بهدف أن تسد حاجة السوق المحلية وكذلك أدت زيادة الضرائب الجمركية على الفواكه الى تشجيع زراعتها محليا وحاصلات الفواكه تسد حاجة السوق المحلية في معظم الأحوال وأحيانا تسمح بالتصدير . كذلك نشطت زراعة الأرز بفضل تحسين الري والصرف. وتتجه الرغبة في تنويع الغلات الى تقليل الاعتماد على القطن والي توجيه الانتاج الزراعي نحو الاكتفاء الذاتي كلما سمحت الظروف الجغرافية بذلك ونتيجة لهذه السياسة صدر بعض الفائض. ولا شك أن اقامة مشروع السد العالي تمثل ضمانا وعونا للتوسع الزراعي فالمعروف أن مياه النيل تتذبذب كمياتها من سنة الى أخرى فقد هبط المعدل المائي الى ٤٣ مليار متر مكعب في عام ١٩٤٣ كما ارتفع هذا المعدل الى ١٥٠ مليار في عام ١٨٧٨. ومن هنا نشأت نظرية التخزين المستمر ممثلة في خزان السد العالي وقدرته التخزينية ١٥٧ مليار متر مكعب من المياه لصالح مصر والسودان.

### ثالثا: الثروة الحيوانية:

ولا شك أن الثروة الحيوانية تتعرض لمشكلات كثيرة أهمها:

(أولا) انتشار الأمراض بين الحيوانات وكثيرا ما تظهر على شكل أوبئة فتاكة مما يؤدي الى اضطراب عمليات التربية واضعاف الرغبة في نفوس المربين ومما يؤسف له ألا توجد احصاءات شاملة تبين حقيقة الخسائر السنوية التي تسببها أمراض الحيوان ولكن هذه الخسائر تقدر بنحو ٢٠٪ من قيمة الثروة الحيوانية وقد أغفلت المصادر الاحصائية ذكر عدد

المواليد الشهرية أو السنوية من الحيوانات كما أغفلت ذكر ما ينفق منها وما ينبح خارج السلخانات مما يضعف القيمة الإحصائية للأرقام الخاصة بالنزوة الحيوانية.

(ثانيا) عدم الاهتمام بأصل السلالة فالفلاحون لا يعرفون مبلغ إنتاج حيواناتهم لكي يحتفظوا ويعتوا بعالية الإنتاج منها. كما أنهم لا يعيئون باختيار فحول النزوة الجيدة بل يستعملون للنزوة على حيواناتهم في غالب الأحيان فحول مجهولة الأصل أو الرديئة النوع ما دامت قريينة ميسورة. ولا شك أن الفحل الضعيف ينتج نرية ضعيفة. ويجهل الفلاحون تسجيل الحيوانات وقد أخذ بهذا النظام في كثير من الدول المتقدمة في تربية الحيوان كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وهولندا وغيرها. ولم تسجل الحيوانات إلا في المزارع الكبيرة أو الوحدات الزراعية النموذجية ومنذ فترة قصيرة بدأت مصر تهتم بنظام تسجيل الحيوانات وأولته وزارة الزراعة عناية خاصة ستظهر نتائج هذه العناية في المستقبل القريب.

(ثالثا) عدم العناية بنوع الغذاء وكميته مما يؤدي إلى قلة النسل وضعف ادرار اللبن والمعروف أن متوسط ما تدره الجاموسة من اللبن في السنة هو ٣٠٠٠ رطل بنسبة دهن تصل إلى ٦,٥٪ كما أن متوسط ما تدره البقرة في السنة هو ٢٠٠٠ رطل بنسبة دهن تصل إلى ٤٪، ومتوسط ادرار اللبن من الجاموس والبقرة البلدي يبدو منخفضا إذا قارناه بمتوسط ادرار أبقار الفريزيان الذي يصل إلى ٩٠٠٠ رطل في السنة بنسبة دهن تصل إلى ٢,٥٪، ومتوسط ادرار أبقار الجرسى الذي يصل إلى ٥٥٠٠ رطل في السنة بنسبة دهن تصل إلى ٥,٥٪، ومما يزيد في قلة ادرار اللبن أن الماشية في مصر هي في الواقع حيوان العمل

الزراعي مما يؤدي الى انتهاكها المتواصل، هذا فضلا عن سوء حال الزرائب التي تبعد كثيرا عن الأوصاف العلمية الحديثة.

(رابعاً) عدم خبرة الفلاح بطرق تربية الحيوان فلا يهتم بالحيوان الا ليساعده في خدمة الأرض ويندر أن يخصص بعض حيواناته لتربي لحما أو تترك لبناء، والماشية في مصر قد تعودت العمل الزراعي منذ آلاف السنين ولسنا نشك في أن مرور هذا الزمن الطويل أدى الى ظهور بعض صفات جيدة للعمل بطريقة الانتخاب غير المحسوس. ويجب أن نحافظ على هذه الصفات الجيدة وفي الوقت نفسه أن ننتفع بما يمدنا به العلم الحديث من وسائل لتحسين ماشة العمل بأضمن السبل وأسرعها حتى تتحسن السلالة وترتفع كمية ما تدره هذه الماشية من لبن.

ويلاحظ أن المزارع الصغير يفضل الحيوان في العمل إذ يستفيد منه نتاجاً وانتاجاً، بينما المزارع الكبير يفضل الحيوان لحاجته الى السماد البلدي، ولاستخدام الحيوان في مختلف الأعمال التي تجد بالمزرعة. أما عن نوع الحيوانات فالزراع المصري على العموم لم يألف عمل الخيول والبغال في الحقول فضلاً عن أنه لا يظهر استعداداً لبذل ما تستدعيه من النفقات في الغذاء والخدمة وهذا مما يؤكد لنا ضرورة العناية بالماشية المصرية من أبقار وجاموس.

ومصر من أفقر بلاد الوطن العربي في الثروة الحيوانية إذا وضعنا في الاعتبار أن مصر من أشد أجزاء الوطن العربي ازديحاما بالسكان. ودراسة الجداول الخاصة بتوزيع كل من الثروة الحيوانية والسكان تبرز هذه الحقيقة بصورة واضحة فمثلاً يبدو من دراسة الجداول الخاصة بتوزيع الثروة الحيوانية

والسكان في وحدات الوطن العربي أن السودان يمتلك نحو خمسة أضعاف ما يمتلكه مصر كذلك يلاحظ أن المغرب يمتلك ضعف ما يمتلكه مصر من الأبقار بينما يزيد عدد سكانه قليلا على ثلث عدد سكان مصر. تفسير ذلك أن مصر تقع في نطاق المناخ الصحراوي فهي فقيرة جدا في حشائش الرعي التي تظهر في مساحات بسيطة في اقليم مريوط وشمال سيناء. وأما أراضي الدلتا والوادي فهي تستغل في الانتاج الزراعي. ويمتد اقليم مريوط على شكل شريط من السهول الساحلية بين الاسكندرية والسلوم ويتسع نوعا ما في الشرق ويضيق كلما اتجهنا غربا. وهو فقير في ثروته الرعوية لقلة الأمطار وتبدو الأغنام والماعز والابل هزيلة ضعيفة. ويمتاز هذا الاقليم بظهور أشربة من الكتبان الرملية التي تحتضن أودية طويلة تغطيها الأعشاب والحشائش الصحراوية مما يساعد كثيرا على تربية الحيوان في هذا الاقليم. وقد اهتم المؤتمر الزراعي الأول ١٩٣٦ في الجزء الثاني من أبحاثه بتوجيه العناية نحو هذا الاقليم<sup>١</sup> ولكن انتشار الأمراض وعدم العناية بأصل السلالة وبالتغذية المناسبة أضعف ظاهرة الرعي. وتقوم بعض التجارب في الوقت الحاضر لمحاولة الوصول الى نوع من الحشائش يلائم ظروف الاقليم الطبيعية ويلتئم تربية الأغنام<sup>٢</sup>. وشمال سيناء هو الآخر فقير جدا في ثروته الرعوية وتظهر بعض الحشائش الصالحة للرعي على طول السهل الساحلي الى الشرق من العريش وتزداد هذه

<sup>١</sup> أحمد فضل الخشن: تربية الحيوان في مصر (المؤتمر الزراعي الأول ١٩٣٦ - الجزء الثاني) ص ٨٠ ومليدها

<sup>٢</sup> Omar Draz Some Desert Plants and Their Uses in Animal Feeding - Publications de L'Institut du Desert d'Egypte - No ٢ - ١٩٥٤, P ٨٣

المراعي في غناها بالحشائش كلما اتجهنا نحو الشرق والشمال الشرقي أي كلما أخذت الأمطار في الريادة في هذا الاتجاه.

وهكذا يبدو واضحا أننا في حاجة ماسة الى العناية بالثروة الحيوانية لأسباب منها:

أولاً- ان التوسع في تربية الحيوان يؤدي الى وفرة الأسمدة ولا شك أن زيادة خصب الأرض سيساعد على تحسين الانتاج الزراعي.

ثانياً- ان تشجيع تربية الماشية سيؤدي الى تغطية الاتسهلاك المحلي فلا تحتاج البلاد الى الاستيراد من الخارج.

هذه هي أهم المميزات التي تجنيها مصر من تشجيع تربية الحيوان وتهتم السياسة الحيوانية الحديثة بالأسس الرئيسية الآتية:

أولاً: الاهتمام بتحسين النسل:

ولاسيما بين الجاموس، ذلك لأن الجاموس يتوافر فيه مزايا عدة تجعله حيوان اللبن الممتاز وفي مقدمة هذه المزايا كثرة الاررار وارتفاع نسبة الدهن في اللبن هذا فضلاً عن احتماله للمعيشة الخشنة وقلة تعرضه للأمراض. وتهتم وزارة الزراعة بتشجيع انتشار مراكز رعاية الحيوان المجهزة بالأدوية وأدوات الجراحة. ومد أن بدأ العمل في مراكز رعاية الحيوان عام ١٩٥٦ أولت الهيئات المسئولة كثيراً من الرعاية نحو الناحية التناسلية لما لها من أثر اقتصادي على الدخل القومي. ومن أبرز المشاكل هنا مشكلة العقم اد دلت الدراسة أن ٤٠٪ من الماشية

المصرية تعاني اضطرابات تؤثر على تولدها مما يؤدي الى ضعف انتاج اللحوم واللبن كثيرا ولم تجر أبحاث وافية تتعلق بالعقم. ويلاحظ أنها ظاهرة عامة في كل المراعي العربية وقد ناقشتها وزارة الزراعة في الاقليم المصري كما في التقرير السنوي في الشئون البيطرية ١٩٥٨ (القاهرة ١٩٥٩ - ص ٤٥ وما بعدها). وتهتم الهيئات الفنية بتتبع هذه المشكلة. هذا فضلا عن عدم انتظام التغذية وقلة فحول الملائق وانتشار الطفيليات بين الماشية.

وخير طريقة لتحسين النسل هي استعمال فحول ممتازة تنتحر من سلالات جيدة وفيرة الادرار اذ أن الفحل الردي قد يفسد نسل عدد كبير من الجاموس. وقد بدأت الوزارة في تنفيذ هذا المشروع بتربيتها فحول ممتازة لغرض النزو، ومتى توافر لدى وزارة الزراعة العدد المناسب من هذه الفحول الممتازة تستخدمها دون غيرها لتلقيح الجاموس في المناطق الزراعية المختلفة حتى يعم التحسين جميع المناطق.

لما البقر المصري فهو أيضا من السلالات الضعيفة وقد بدأ التهجين بسلالات أجنبية جيدة للوصول الى فحول نزو تحمل المناعة ضد الأمراض المتوطنة مع القدرة على الادرار العالي. ولبن البقر مهم للأطفال والمرضى وقد نجحت التجارب في تحقيق هذه الناحية وهي لا تزال مستمرة وعلى الرغم من أن تربية الأغنام لا تحتاج الا لرأس مال قليل ولا تتكلف تغذيتها وزرايتها غير البسير من المال لأن معظم تغذيتها بحشائش القنوت وفضلات المحاصيل فان تربيتها في مصر لا تلقى ما تستحق من عناية وهذا على الرغم من أننا نفضل لحوم الأغنام ونفضل جبن الضأن المصنوع من لبن الأغنام. وهكذا يبدو أن

الأغنام المصرية في حاجة الى تحسين سلالتها حتى تنتج لحما جيدا وصوفًا ممتازًا. ومما يؤسف له أن الصوف المصري لا يزال من الأنواع الرديئة الضعيفة.

وتساهم الجمعيات الزراعية التعاونية والوحدات الزراعية بقدر كبير في تحسين مستوى الثروة الحيوانية. ودلت التجارب أنه يمكن أن يضل ادرار الجاموسة الى ٢٥ رطلا من اللبن يوميا في المتوسط. وهذا قدر كبير إذ أن متوسط ما تدره الجاموسة من اللبن لا يزيد على عشرة أرطال يوميا ويقوم المرشد الزراعي والاجتماعي بدراسة الأخطاء الشائعة في تربية الحيوان وتغذيته ويرشد الفلاح الى خير الطرق لتربية الماشية والاكثر منها. وقد بدأنا نسجل نسب ادرار الماشية المختلفة في بعض الوحدات الزراعية حتى يوجد أساس عادل للانتخاب في المنطقة.

### ثانيا: تشجيع الدورة الزراعية الثلاثية:

تشجيع الدورة الزراعية الثلاثية من ناحية، واستزراع الأراضي البور من ناحية أخرى وتخصيص جزء من هذه الأراضي الصالحة للاكثار من الماشية والدواجن وتهجينها لزيادة انتاجها. وتتمثل هذه الأراضي المستصلحة في شمال الدلتا وشرقي مريوط، وذلك لتشجيع تربية الماشية واقامة الزرائب وفقا للطرق العلمية الحديثة. وقد تنبه بعض الأجانب لاهمية هذا المشروع فاستصلحوا بعض الأراضي واقاموا عليها زرائب حديثة ومصانع لمستخرجات الالبان.

هذه بعض جوانب السياسة الاقتصادية الحديثة بالإضافة إلى التوسع الكبير في التصنيع والثروة المعدنية لرفع المستوى الاقتصادي لسكان مصر.

ويمتد الوطن العربي من جبال زاجروس وكردستان في شرق الغزاق شرقاً حتى السواحل المغربية المطلّة على المحيط الأطلسي غرباً وذلك في مسافة ٥٠٠٠ كيلومتر تقريباً كما يمتد من جبال طوروس شمالاً حتى جنوب السودان جنوباً في مسافة ٣٠٠٠ كيلومتر.

وأقاليم هذا الوطن العربي الكبير تختلف في مدى استثمارها للأرض القابلة للزراعة فبينما تستغل مصر أكثر من ٧٥٪ من أراضيها القابلة للزراعة إذا بالعراق لا يستثمر أكثر من ٢٥٪ من مساحة أرضه القابلة للزراعة. وتفسر هذه الظاهرة يتمثل أساساً في التباين الكبير في توزيع السكان فبينما ترتفع الكثافة السكانية إلى أكثر من ٩٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع في مصر إذ بها لا تتجاوز مائة نسمة في العراق.

ولاشك أن قلة الماء مع قلة الأيدي العاملة هما العاملان الرئيسيان في أن مساحة الأرض المزروعة في الوطن العربي لا تتعدى ٤٠٪ من مساحة الأراضي القابلة للزراعة.

والمشكلة السكانية الأساسية التي تواجه الوطن العربي هي سوء توزيع السكان ويكمن الحل الأمثل لهذه المشكلة في خلق نوع من التكمّل السكاني بين الأقاليم العربية في ظل تفاهم عربي ملّيم.



## (ابعا - تطور مصر الاقتصادي

أ- من ١٩٨١-١٩٩٣: الصورة تمثل لقطات مجمعة لما تحقق لمصر والمصريين من إنجازات في مختلف المجالات على مدى الـ ١٢ عاما الماضية.

• بلغ اجمالي الاستثمارات في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية نحو ١٧٥ مليار جنيه، وزاد الناتج المحلي بذلك من ٢٠,٦ مليار جنيه في عام ٨١ الى ٣٤,٣ مليار جنيه في العالم الحالي ٩٣، وارتفع بذلك عدد العاملين من ١٠ ملايين و٥٢٢ ألفا الى ١٥ مليوناً ٦٠٠ ألف، بمعدل نمو سنوي ١٣,٧٪.

• في مجال الزراعة زادت الرقعة المزروعة من ٥,٨ مليون فدان الى ٧,٤ مليون فدان وبلغت مساحة الأراض المستصلحة في الـ ١٢ عاما ما تم استصلاحه خلال الـ ٥٠ عاما الماضية وارتفع الناتج الزراعي بنسبة ٢٨٠٪ وبلغت قيمة الصادرات الزراعية وحدها الى ١١٢٣ مليون جنيه بعد أن كانت ٣٦٤ مليون جنيه فقط.

• في مجال الصناعة تحقق معدل نمو سنوي حقيقي قدره ٦٪ في المتوسط وتم تجهيز ٩ مناطق صناعية جديدة استوعبت ٣٦٩٠ مشروعا وزاد اجمالي الصادرات الصناعية من ٣٩٥,٦ مليون جنيه الى ٥٧٦ مليون جنيه.

• في مجال البترول عقدت ١٢٩ اتفاقية مع الشركات العالمية للتقيب عن البترول وتحقق لأول مرة الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والغاز.

• في مجال الانشاء والتعمير تم انفاق ١٩٨ مليار جنيه على البنية الأساسية وتم انشاء مليون و٧٨٢ وحدة سكنية، الى جانب انشاء ١٢ مدينة جديدة.

• في مجال النقل والمواصلات بلغ طول شبكة السكك الحديدية ٨٦٠٠ كيلومترا وتم انشاء ٨ مطارات دولية بعد أن كان هناك مطار واحد. وأرتفع عدد الموانئ المصرية الى ٦ موانئ بعد أن كانت أربعة، وزاد عدد الخطوط التليفونية من ٥١ ألف خط الى مليونين و ٧٠٠ ألف خط.

• وفي مجال السياحة زادت الطاقة الفندقية الى ٦٥٠ فندقا، وكانت من قبل ٢٩٤ فندقا، وأرتفع عدد السائحين من ١,٥ مليون سائح الى ٣ ملايين سائح، وبذلك قفز الناتج السياحي من ٤٩٦,١ مليون جنيه الى ١٠٢٠,٥ مليون جنيه.

• في مجال الصحة امتد التأمين الصحي الى ٤,٦ مليون مواطن مقابل ٢,٧ مليون قبل ذلك وأرتفع عدد المستشفيات العامة للمركزية من ١٧٦ الى ٢٠٦ مستشفيات.

• وفي مجال التعليم تم افتتاح ٣١ ألفا و ٩٨ فصلا ابتدائيا جديدا و ٤١٨٧ فصلا جديدا اعدادي و ٤٩١٧ بالثانوي و ١٥٥٨ بالأزهر.

في مجال الاعلام تم انشاء ٩ محطات وبلغت ساعات إرسالها ٩٩ ألفا و ٣٩٨ ساعة مقابل ٦٥ ألفا و ٥٥٤ ساعة قبل ذلك وتستخدم ٣٣ لغة عالمية ويضم التليفزيون ٥ قنوات منفصلة وأول قناة دولية تغطي الدول العربية وإفريقيا ومعظم دول أوروبا وأول قناة معلومات في الشرق الأوسط وحقت مصلحة الاستعلامات طفرة هائلة في أداء رسالتها عن طريق ٤٣ مكتباً اعلامياً خارجياً و ٥٨ مكتباً داخلياً.<sup>١</sup>

ب- ان انتشار الوعي الثقافي وتحسين المستوى الاقتصادي للأمة في مصر أدى الى انخفاض معدل الزيادة السكانية وتحسين مستوى الخدمات كما توضحه الأرقام التالية:

- انخفض معدل الزيادة السكانية من ٣,٠٤٪ عام ١٩٨٥ واصبحت ٢,٣٨٪ عام ١٩٩٣.
- زاد متوسط عمر المواطن المصري من ٥٦,٥ سنة عام ١٩٨٢ وأصبح ٦١ سنة عام ١٩٩٢.
- انخفض عدد الأطفال التي تتجههم المرأة المصرية من ٥ أطفال عام ١٩٨٢ الى ٣,٩ طفل عام ١٩٩٢.
- انخفض معدل وفيات الأطفال من ١١٩ في الألف عام ١٩٨٢ الى ٦١ في الألف عام ١٩٩٢.

<sup>١</sup> جريدة الأهرام: ١٠/١/١٩٩٣. ص ٩

١٩٩٢	١٩٨٧	١٩٨٢	البيان
٦١ سنة	٥٩ سنة	٥٦,٥ سنة	متوسط عمر المواطن
٣,٩ طفل	٤,٤ طفل	٥ طفل	عدد الأطفال التي تتجههم المرأة المصرية
٦١ في الألف	٧٣,١ في الألف	١١٩ في الألف	معدل وفيات الأطفال أقل من سنة

١٩٩٢	١٩٨٧	١٩٨٢	البيان
١٢,٢ أسرة لكل سيارة	١٢,٦ أسرة لكل سيارة	١٧ أسرة لكل سيارة	عدد الأسر التي تملك سيارة خاصة
٤ أسرة لكل تليفون	٧ أسرة لكل تليفون	١٦ أسرة لكل تليفون	عدد الأسر التي لديها خط تليفون
١٠٠٠ ك.و.س	٦٨٦ ك.و.س	٤٩٢ ك.و.س	متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء سنويا
٥٩٨ كجم مكافئ بتروول	٥٧٧ كجم مكافئ بتروول	٤٤٨ كجم مكافئ بتروول	متوسط استهلاك الفرد من الطاقة سنويا

<sup>١</sup> مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري: أنتاج ١٩٨١-١٩٩٩ - ص ١٢, ١١

ج- ومما ساعد على تحسين دخل الأسرة النمو الصناعي السريع  
وزيادة انتاج النفط والغاز الطبيعي كما يبدو من الأرقام  
التالية:

#### أ- الانتاج الصناعي:

المؤشر	الزيادة	١٩٩٣	١٩٨٢	البيان
ضاعف الانتاج الصناعي ٧ مرات	٥٢,٩٩٥ مليار جنية	٦١,٨ مليار جنية	٨,٨ مليار جنية	الانتاج الصناعي بالأسعار الجارية
أكثر من ثلاث مشروعات كل يوم	١٢٨٤٢ مشروعا			المشروعات الصناعية الجديدة التي تمت الموافقة على انشائها ١٩٩٢-١٩٨٢
استثمارات في الصناعة كل يوم ١٠,٧ مليون جنية	٣٩١١٦,٦ مليون جنية			الاستثمارات في الصناعة ١٩٩٢-١٩٨٢

## ب- إنتاج البترول:

المؤشر	لزيادة	١٩٩٣	١٩٨١	البيان
زيادة في الإنتاج بمقدار ٥٠٪ الآن	١٨,٢ مليون طن	٥٤,٩ مليون طن	٣٦,٧ مليون طن	إنتاج البترول والغاز
تضاعفت أطوال شبكات الغاز ٢,٤ مرة	١٥١٨ كيلومتر	٢١٦٣ كيلومتر	٦٤٥ كيلومتر	أطوال شبكات الغاز الطبيعي
زاد الاحتياطي بنحو ٥٠٪ رغم زيادة الإنتاج	٩ مليار برميل	٦ مليار برميل	٤,١ مليار برميل	احتياطي البترول
متوسط الاستثمارات ١٩٩٠ مليون جنيه سنوياً	١٩,٨٩٥ مليون جنيه			الاستثمارات في البترول ١٩٨٢-١٩٩٢

د- نسبة قوة العمل الى مجموع السكان في مصر: ويوضحها الجدول الآتي:

نسبة قوة العمل الى مجموع السكان في مجموعة مختارة من دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا	
الدولة	نسبة قوة العمل الى عدد السكان ١٩٩٣
سنغافورة	% ٥٦,٣
تاييلاند	% ٥٥,٧
هونج كونج	% ٥٠,١
قبرص	% ٤٨,١
كوريا	% ٤٣,٩
اندونيسيا	% ٤٢,٦
اليونان	% ٣٩,١
ماليزيا	% ٣٧,٦
تركيا	% ٣٧,٥
اسرائيل	% ٣٥,٦
الهند	% ٣٤
مصر	% ٢٦,٢

لذلك نقول: ان الدول الساعية الى التقدم والدول المجتهدة من أجل حصول مواطنيها على المزيد من الخدمات والدول المتجهة الى تطوير مستوى خدمات مواطنيها، خططت ونفذت من أجل زيادة قوة العمل، أي زيادة عدد المشتغلين.

ولنقرأ معا ما أعطاه العامل في المتوسط خلال عام ١٩٩٣ في هذه الدول<sup>١</sup>:

نتائج المشتغل سنويا في مصر مقارنة ببعض دول حوض البحر الأبيض المتوسط عام ١٩٩٢			
الدولة	عدد المشتغلين (مليون نسمة)	حجم الانتاج المطي الاجمالي (مليار دولار)	متوسط إنتاجية المشتغل (دولار) امريكي (الوعاء الذي تدفع منه الأجر)
مصر	١٢,٩	٣٣,٢	٢٧٠٠
تركيا	١٦,٢٠	٩٦,٥	٥٩٥٧
اليونان	٣,٧٠	٥٧,٨	١٥٦٤٩
تونس	١,٨٤	١١,١	٦٠٢٣
اسرائيل	١,٤٥	٥٣,٢	٣٦٦٩٠
فهرص	٠,٢٤	٥,٧	٢٣٧٣٨

وهذه الأرقام جميعا تؤكد لنا حقيقة واحدة لا تتغير وهي أن ثروتنا الحقيقية في عمالنا، إذا زادوا إنتاجيتهم زادت ثروتنا، وإذا زادت قيمة انتاجهم زاد المنبع الذي يتفق منه الخير ليصب في جيوبهم ويصب أيضا في الخدمات الراقية التي تقدم لهم. وأرجو أن يسمع وقت محترفي العمل السياسي ورفاق التنوير الاعلامي، وزملاء العمل النقابي وأعضاء أسرة مصر، لمناقشة تجارب الدول في تنمية هذه الثروة ليعرفوا أين نقف وكيف نتلمس الطريق الصحيح للتقدم ونخطي الصعاب.

<sup>١</sup> ابراهيم نافع: جريدة الأهرام - ١١ مارس ١٩٩٤ - ص ٢



خاماً: التنمية الزراعية في وادي النيل الأدنى:

١- ومصر من أكثر البلاد العربية اهتماماً بالدورة الزراعية:

فالنيل، ذلك النهر الذي خلق الوادي وكون في قاعه هذا السهل الخصيب واقتطع من البحر تلك الدال الفسيحة يحمل لها وللوادي في كل عام الطمي الموسمي الذي يجدد خصب التربة، هذا فضلاً عن الماء الوفير الذي يزيد في قدرة البلاد على الإنتاج. ذلك هو النيل الذي خلق الدورة الزراعية الأولى في مصر منذ أقدم العصور.

فالنيل كان فيفيض في أواخر الصيف وأوائل الخريف فيغذي التربة بالماء والغرين ثم ينحسر عنها في وقت ملائم لزراعة المحاصيل الشتوية من قمح وشعير، ثم يسقط مطر الشتاء فيغذيها حتى نهاية موسم نموها وحلول فصل الحصاد في أواخر الربيع، وعندما يتوقف الفلاح عن الزراعة في الصيف في وقت لم يعرف فيه نظام الري الدائم تشقق أشعة الشمس الحارة سطح التربة فتسمح بنفاذ الهواء إليها وتغذيتها بعناصرها المفيدة وتطهيرها من الآفات. وهكذا يتجلى مبلغ تعاون عناصر البيئة المختلفة من تربة خصبة ونظام جريان المياه والمناخ. وهكذا ظهرت الدورة الزراعية الأولى.

واعتمدت هذه الدورة على نظام الري الحوضي وكان نظاماً سائداً في الوادي قبل ادخال نظام الري الدائم. فكانت الأرض مقسمة إلى أحواض تتراوح مساحة الواحد منها بين ٥٠٠ فدان و ٣٠٠٠ فدان. وقد كانت هذه الأحواض محاطة بجسور عريضة استخدمت كطرق زراعية وفي وقت الفيضان تملأ

الأحواض بالمياه ثم تتحسر عنها بعد أن تترك عليها طبقة من طمي النيل الخصب<sup>١</sup>. ولنظام الري الحوضي مزايا كثيرة منها راحة الأرض مدة الشراقي<sup>٢</sup>، فبعد أن يجمع المحصول في إبريل أو مايو تترك الأرض بدون زراعة حتى تغمرها مياه الفيضان من جديد. وأثناء فترة الشراقي التي تسبق الفيضان تجف الأرض فتتشقق وتتسرب إلى باطنها أشعة الشمس مما يؤدي إلى ارتفاع الأملاح إلى السطح بفعل الجاذبية الشعرية حتى إذا ما جاء الفيضان التالي غسل هذه الأملاح وجدد خصوبة التربة وهكذا كانت الأرض دائمة الخصوبة قليلة الأملاح<sup>٣</sup>. كما أن نظام ري الحياض أعطى فرصة لنوع من الهجرة الداخلية إلى مناطق الري الدائم قرب مجرى النهر وذلك لتطهير الترع وتجفيف المستنقعات وجني المحصول والعمل في البناء والصناعة وغير ذلك. وقد كانت الأراضي العالية تزرع أثناء الفيضانات العالية فقط، أما الأراضي المجاورة للترع فكانت تزرع على مدار السنة.

ومنذ أوائل القرن التاسع عشر ظهرت غلات جديدة كالقطن وقصب السكر مما أدى إلى تنفيذ مياحة مائية جديدة استمر العمل بها حتى الوقت الحاضر. وترمي هذه السياسة إلى ضبط ماء النيل وإدخال نظام الري الدائم ليحل محل نظام ري الحياض

<sup>١</sup> ب. من. جبران: الأحوال الزراعية في القطر المصري في أثناء حملة نابليون بونابرت، ص ١٦١ (قام بتعريب هذا الجزء من كتاب وصف مصر كل من يوسف نحاس وظليل مطران تحت إشراف الجمعية الزراعية المصرية وقد نشر ١٩٤٢)

<sup>٢</sup> محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي - من منشورات الجامعة الليبية - بنغازي - الطبعة الأولى ١٩٧٢ - ص ١٥٨ وما بعدها

<sup>٣</sup> ماكينزي تيلور وشلي بيرنز: النشرة الفنية رقم ٢٥ عن أساس الفلاحة المصرية وعلاقته بنقص متوسط محصول القطن من القطن (وزارة الزراعة - تعريب عبدالعزيز نصر - ص ١٥٦)

الذي عرفته مصر منذ أن عرفت الزراعة. وقد أمر محمد علي في ذلك الوقت بحفر ترع السرساوية والباجورية والنعاية وتطهير بحر شبين في وسط الدلتا، ثم انتشرت الترع بعد ذلك في معظم جهات الدلتا الأخرى<sup>١</sup>. وكانت تعمق الترع في وقت التحريق إلى منسوب يسمح بدخول المياه المنخفضة، أما عملية تطهير هذه الترع فكانت تتم وفقا لنظام للسخرة. ولاشك أن ادخال زراعة القطن والمحصولات الجديدة الصيفية الأخرى ابرز شدة الحاجة إلى تطهير الترع وتعميقها مما أدى إلى استخدام آلاف من العمال وتكليف الخزنة نفقات كثيرة. لذلك اتجه التفكير إلى إنشاء القناطر الخيرية التي تعتبر النواة الأولى لمشروعات الري المختلفة في مصر<sup>١</sup>.

ويظهر هذه المحصولات الجديدة حدث هذا الانقلاب الكبير في نظام الري كما ظهرت الدورة الزراعية الثنائية. وكانت تنتشر في الدلتا والوادي هذه الدورة الثنائية التي من أبرز عيوبها أن فترة الشراقي قصيرة قلما تعطى الأرض الفرصة المناسبة للراحة وتجديد خصوبتها. كما أن هذه الفترة القصيرة من الشراقي لا تظهر إلا في السنة الثانية من الدورة كما يبدو ذلك من التوزيع الآتي:

١- الواس الأيوبي: تاريخ مصر في عهد الخديوي اسماعيل (المجلد الأول ص ٧٠ وما بعدها)

ب- خريطة ترع الدلتا كما وضعها لينان دي بلنوف سنة ١٨٥٨ (من محفوظات الجمعية الجغرافية بالقاهرة. النسخة الفرنسية)

Linant de Bellefonds: Principaux Travaux d'utilite Publique en <sup>١</sup> Egypte (Paris ١٨٧٣, P ٣٤١-٣٨١)

نوع المحصول	المدة
قطن	من فبراير الى أكتوبر
قمح أو برسيم	من نوفمبر الى مايو
شراقي <sup>١</sup>	من مايو الى يوليو
ذرة	من أغسطس الى نوفمبر
برسيم	من نوفمبر الى ديسمبر

وهكذا مهدت عوامل أساسية مختلفة منها انتشار الدورة الزراعية الثنائية ونظام الري بالراحة تخفيفاً للمجهود البشري مع عدم اتباع نظام دقيق للصرف الى رفع مستوى الماء الباطني في كثير من المناطق ولاسيما النطاق الشمالي للدلتا الذي يعرف بالأراضي الغدقة. ولقد ساعدت هذه المياه الباطنية على تخفيض درجة حرارة باطن الأرض والحاق الضرر بكثير من الغلات ولاسيما القطن.

وازاء هذه المشكلات اتجهت السياسة المائية والزراعية الحديثة الى خلق نوع من التوازن بين نظامي الري والصرف، مع العناية بتشجيع الدورة الزراعية الثلاثية، لما لها من مزايا عديدة في التنمية الزراعية. ويمكن أن نلخص الأهداف الرئيسية لهذه السياسة على النحو الآتي:

أولاً:

يراعى في مشروعات الري المستقبلية أن تكون الترع عميقة بحيث يكون مستوى الأراضي الزراعية أعلى من مستوى الماء

<sup>١</sup> الفترة التي تترك فيها الأرض بدون زراعة للراحة

في الترع بما لا يقل عن متر ونصف متر في زمن الفيضان. وأن هذا المبدأ سيؤدي إلى تخفيض مستوى الماء الأرضي<sup>١</sup> إلى عمق متر ونصف على الأقل، وهو عمق يسمح بنمو معظم الغلات الزراعية بنجاح، كما أن فيه خير وقاية لخصوبة التربة. وسيشجع مثل هذا المشروع الاهتمام باستخدام الآلات الرافعة التي ستعلم الزراعة الاقتصاد في استهلاك المياه، وأنه من الصعب تغيير نظام الترع الحالية المرتفعة المنسوب إذ أن هذا العمل يتطلب خفض القناطر الحالية. غير أنه لوقاية الأراضي الواقعة على جانبي هذه الترع، يمكن أن تحفر مصارف موازية لها، يتراوح عمقها بين مترين ومترين ونصف على طول امتداد الأراضي التي لحقها الضرر. ويؤدي هذا إلى خفض مستوى الماء الباطني تدريجياً.

ولقد تأثرت بعض أراضي جنوب الدلتا بارتفاع مستوى الماء الباطني، مما أدى إلى ظهور بعض بقاع ملحية وشدة تماسك ذرات التربة، ومثل هذه الأراضي في حاجة ماسة إلى اصلاح سريع حتى يعود إليها ما أشتهرت به من خصب قديم.

هذا ويتجه الاهتمام أيضاً إلى تعميق المصارف الرئيسية إلى مترين ونصف متر عن سطح الأرض المجاورة، وكذلك تعمق المصارف الحقلية، وذلك حتى ينخفض مستوى الماء الباطني بحيث تصبح الأرض صالحة للزراعة ولا سيما في المناطق التي تأثرت كثيراً بالمياه الأرضية.

وتهتم هذه السياسة أيضا بدقة الاشراف على المقننات المائية، فالمعروف أن النيل يمثل المصدر الرئيسي للري في الوادي المصري وذلك، ويبلغ المتوسط السنوي للتصريف النهري في مصر في نصف القرن الماضي ٩٢ مليار متر مكعب في السنة.

وتستغل مصر من هذا المقدار نحو ٥٨ مليار متر مكعب، أما الباقي وهو ٣٤ مليار متر مكعب فيضيع في البحر المتوسط أثناء الفيضان وذلك قبل مشروع السد العالي جنوب اسوان. وخلاصة القول أن كميات كبيرة من المياه تفتقد سنويا دون أن يستفاد بها في أغراض الزراعة. ويوضح الجدول الآتي الكميات:

٣٤ مليار متر مكعب	أولا: يفقد من مياه الفيضان
٢٠ مليار متر مكعب	ثانيا: يفقد من مياه حوض النيل الأعلى
١٠ مليارات متر مكعب	ثالثا: يفقد من مياه المقننات المائية
١٥ مليار متر مكعب	رابعا: يفقد من مياه الصرف
١٠ مليارات متر مكعب	خامسا: يفقد من المياه الجوفية
٨٩ مليار متر مكعب	المجموع

وإذا وفرت هذه الكمية الكبيرة من المياه، وذلك بطرق المحافظة والمشاريع المختلفة، أمكن زراعة ١٢ مليون فدان تضاف الى المساحة المزروعة حاليا، وهي نحو ستة ملايين من الأكنة، فيصل مجموع المساحة المزروعة الى ١٨ مليون فدان.

<sup>١</sup> مصطفى الجبلي: مستقبل التوسع الزراعي في مصر - مجلة المهندسين - فبراير ١٩٥١ ص ٤٣

## ثانيا:

تشجيع استخدام دورة ثلاثية ويمثلها الجدول الآتي:

السنة	المحصول	المدة
السنة الأولى	من نوفمبر الى مارس من مارس الى أكتوبر	برسيم قطن
السنة الثانية	من نوفمبر الى يونيو من يوليو الى سبتمبر	خضر شراقي
السنة الثالثة	من أكتوبر الى مايو من مايو الى يونيو من يونيو الى أكتوبر	حبوب شتوية شراقي ذرة

هذا، وهناك علاقة قوية بين أنواع التربة وأنواع المحاصيل في الدورة، ويبين الجدول الآتي أنواع الأرض بجمهورية مصر العربية الملائمة لزراعة الحاصلات المختلفة:


المحصول	نوع الأرض				
	طينية	طينية صفراء	صفراء	صفراء رملية	رملية
ذرة	*	*	*		
ارز			*		
برسيم مصري	*	*	*	*	*
برسيم حجازي	*	*	*	*	*
بنجر			*	*	*
بصل			*	*	

المحصول	نوع الأرض			
	طينية	طينية صفراء	صفراء رمالية	رمالية
بطاطس			*	
تريش				*
حمص		*		
حلبة	*	*	*	
سمسم			*	*
شعير			*	*
عذس			*	
فول سوداني			*	*
قطن	*	*		
قصب		*	*	
قمح	*	*	*	
كتان		*		

فالتربة الصفراء تجود بها غلات كثيرة من جبوب وخضراوات وفلكهة وموالح. ومن التربة الصفراء تتزايد نسبة الصلصال كلما بعدنا عن مصدر الماء، ممثلا في النيل وفروعه وترعه وذلك لطبيعة الارساب، فبينما نجد أن هذه النسبة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠٪ على جوانب المجاري المائية، اذا به تصل الى ٦٠٪ في التربة السوداء.<sup>١</sup>

<sup>١</sup> حمد إبراهيم حسن: الدورة الزراعية - من أحداث المؤتمر الجغرافي العربي الأول - القاهرة - ١٩٦٢ - ص ٢١٣ وما بعدها





خريطة: أنواع التربة في شرق الدلتا.

### - نتائج الدراسة:

وهكذا يتجلى تعاون عناصر البيئة الصحراوية من تربة ونظام جريان المياه والمناخ. وهكذا ظهرت الدورة الزراعية الأولى منذ أقدم العصور، واستمرت حتى أواسط القرن الماضي، حيث ظهرت غلات جديدة كالقطن وقصب السكر، مما أدى إلى لدخال نظام الري الدائم ليحل محل ري الحياض الذي عرفته مصر منذ أن عرفت الزراعة.

ويظهر هذه المحصولات الجديدة حدث هذا الانقلاب الكبير في نظام الري كما ظهرت الدورة الزراعية الثانية التي من أبرز عيوبها أن فترة الشراقي قصيرة، قلما تغطي الأرض الفرصة المناسبة للراحة وتجديد خصوبتها، كما أن هذه الفترة القصيرة من الشراقي لا تظهر إلا في السنة الثانية من الدورة. وترتب على ذلك رفع مستوى الماء الباطني وضعف التربة في كثير من المناطق.

وازاء هذه المشكلة اتجهت السياسة المائية والزراعية الحديثة الى خلق نوع من التوازن بين نظامي الري والصرف، مع العناية بتشجيع الدورة الزراعية الثلاثية، لما لها من مزايا عديدة في التنمية الزراعية. ومن أهم مزاياها:

أ- اتساع مساحة الحاصلات البقولية في الدورة الثلاثية، مما يؤدي الى زيادة الأروت في التربة التي تقتصر الى هذا العنصر الهام.

ب- فترة الشراقي في الدورة الثلاثية تبدو طويلة، وهي الفترة التي تترك فيها الأرض بدون زراعة للراحة فيعود إليها نشاطها وخصبها. هذا فضلا عن هبوط مستوى الماء الباطني ومهولة الصرف.


ج- تمتاز الدورة الثلاثية بزيادة مساحة ما يزرع من حاصلات العلف مما يساعد على نمو الثروة الحيوانية وما يتبعه من زيادة في كميات الأسمدة التي تسهم في زيادة خصوبة التربة وارتفاع متوسط انتاج الفدان.


هذا، وهناك علاقة قوية بين أنواع التربة وأنواع المحاصيل في الدورة الزراعية. فالتربة الصفراء تجود بها غلات كثيرة من حبوب وخضراوات وفاكهة وموالمح، والتربة السوداء هي أنسب أنواع التربة لزراعة القطن والحبوب. وترتفع نسبة الأملاح في تربة الأطراف الشمالية من الدلتا ومنخفض الفيوم لضعف انحدارها ولقربها من مسطحات ملحية تتمثل في البحيرات المجاورة، ولذلك تغسل هذه التربة جيدا قبل أن تستغل في زراعة الأرز بنوع خاص.

والارتباط وثيق أيضا بين متوسط انتاج الفدان وتتابع المحاصيل في الدورة الزراعية، فتجود زراعة القمح مثلا بعد بور أو قطن. وأقل محصول من القمح ينتج من زراعته بعد ذرة نيلية لأسباب منها: التأخير في الزراعة، وفقر التربة من الغذاء الأزوتي بعد الذرة النيلية.

وليست كل الأراضي في الدلتا والوادي تمثل تربة طينية خصبة، إذ يظهر بقاع من التربة الرملية الفقيرة، كما هو الحال

في الجزر الرملية التي تنتشر في دلتا النيل. ويمكن استثمار هذه الجهات إذا توفرت مياه النيل اللازمة وإذا نقل إليها بعض الطمي الخصب من الجهات المجاورة لمزجه بالطبقة الرملية السطحية.





٢- وإذا كانت تربة الوادي والدلتا ترجع في تكوينها الى أصل واحد هو طمي النيل، غير أنها تختلف في نظام تركيبها من جهة لأخرى بسبب أثر الظروف المحلية كنظام الارساب وذبذبة فروع الدلتا وظهور بعض الترع الحديثة وانتشار نظام الري الدائم. فالتربة الصفراء التي تبلغ نسبة الصلصال فيها حوالي ٣٠٪ والباقي مواد رملية، تظهر على جوانب الترع والمجاري القديمة نتيجة لطبيعة الارساب. وتمثل التربة السوداء معظم تربة الوادي والدلتا. وتبلغ نسبة الصلصال فيها أكثر من ٦٠٪، وهي تربة متماسكة وتحتفظ برطوبتها مدة طويلة. وهذه التربة بأقسامها المختلفة فقيرة في عناصرها العضوية ولاسيما كما يبدو من الجدول الآتي:

٠,٥٣	حامض الكربونيك	٠,٧٣	بوتاسا
٠,٥٧	أكسيد المنجنيز	٠,٢٥	صودا
٣,٠٧	أكسيد الحديد	٢٥,٥٦	جير
٢,٦٨	مواد عضوية	٨,٨٢	مغنيسيا
٠,٢٥	مواد غير ذائبة	٥٧,٥٤	جامض الفسفوريك
	ورمال		
١٠٠			المجموع =

وهكذا تبدو أهمية الدورة الثلاثية في تعويض هذا النقص في المواد العضوية عن طريق التوسع في زراعة الحاصلات البقولية.

٣- تخلو الأراضي عادة من الحاصلات الشتوية في شهر مايو وبقي خالية من الزرع بعض الوقت ونظرا لشدة الحرارة

في هذا الوقت يحدث بالتربة شقوق متسعة تفيد كثيرا في تهوية التربة. ولا شك أن هذه الحرارة التي تتخلل التربة تعيد إليها نشاطها. ولما كانت مساحة الحاصلات الشتوية في الدورة الثلاثية أكبر منها في الدورة الشتوية فإن مساحة الشراقي تكون في الدورة الثلاثية أكبر تبعا لذلك فتعظم الفائدة.

٤- يلاحظ أن كلا من القطن والأرز يحتاج إلى تكرار الري في شهور الصيف الحارة. ولا شك أن زيادة مساحته في الدورة الشتوية تكون من أسباب عجز الماء صيفا مما يؤثر على الأخص في الزراعات الواقعة عند نهايات الترع.

٥- تؤثر الريات المتوالية في ارتفاع منسوب الماء الباطني مما يؤثر في نمو النبات. ولا شك أن اطالة فترات الشراقي كما هو الحال في الدورة الثلاثية تساعد على تخفيض مستوى الماء الباطني وسهولة الصرف. هذا وتهتم الهيئات المسؤولة في الوقت الحاضر بالعمل على تخفيض مستوى الماء الباطني وذلك بالتوسع في حفر شبكة المصارف ومحطات الصرف.

وتبدو مشكلة ارتفاع مستوى الماء الباطني أكثر وضوحا في النطاق الشمالي من الدلتا حيث الأراضي الغدقة ذات التربة الرسوبية التي ارتفعت فيها نسبة الأملاح. ويظهر أحيانا غطاء نباتي من الحشائش والأعشاب المحلية. ويحدد نوع

النبات الأملاح الموجودة<sup>١</sup> هذا وقد ارتفعت نسبة الأملاح في هذه الأراضي لعوامل منها قرب هذه الأراضي من البحيرات المجاورة؛ وضعف الانحدار مما يسهل انتشار المستنقعات في وقت الفيضان، وانتشار الدورة الثنائية في بعض جهاتها. هذا فضلا عن عامل الهبوط الذي حدث في العضور التاريخية والذي ساهم في زيادة مساحة البحيرات والمستنقعات وتجلت هذه الظاهرة خاصة في بحيرة المنزلة بكثرة جزرها وأثار البلاد التي كانت مزدهرة قديما وأصبحت الآن داخل حدود البحيرة أو ما حولها من المستنقعات.

وهذه الظاهرة نذكرنا بأهوار جنوب العراق ومستنقعات جنوب السودان.

٦- تمتاز الدورة الثلاثية بزيادة مساحة ما يزرع من حاصلات العلف مما يساعد على نمو الثروة الحيوانية وما يتبعه من زيادة في كميات الأسمدة التي تسهم في زيادة خصوبة التربة وارتفاع متوسط إنتاج الفدان.

وتهدف السياسة الحيوانية الحديثة الى تشجيع انتشار الدورة الثلاثية لما يترتب على انتشارها من زيادة كبيرة في حاصلات العلف ونمو الثروة الحيوانية، إذ أن القطر فقير في ثروته الحوانية مما أدى الى استيراد كميات كبيرة من الماشية واللحوم

١ - مصطفى الجبلي: الزراعة والأراضي والري في شبه جزيرة سينا - (الموسم الثقافي لجامعة الاسكندرية - ١٩٥٧ - ص ٢٠)

ب- محمد ابراهيم حسن: دراسة في تغير فروع النيل في الدلتا (مجلة البحوث الزراعية بجامعة الاسكندرية - المجلد السابع ١٩٥٩ - ص ٢٧ وما بعدها)



المحفوظة والألبان المحفوظة وغيرها من مواد الصناعات الحيوانية.

ويبدو من دراسة الجداول الخاصة بالواردات من الحيوانات الحية ومنتجاتها أن البلاد تستورد قدرا كبيرا من الحيوانات والمنتجات الحيوانية. ومن الأفضل أن توفر هذه المبالغ بدلا من إنفاقها في شراء مواد استهلاكية يمكن أن يعوض معظمها محليا. وتشجيع الثروة الحيوانية سيؤدي بطبيعة الحال الى تغطية الاستهلاك المحلي من ناحية ووجود فائض للتصدير الى الخارج ولاسيما الى بعض أجزاء الوطن العربي الكبير من ناحية أخرى.

وترتفع نسبة الأملاح في تربة الأطراف الشمالية من الدلتا ومنخفض الفيوم لضعف انحدارها ولقربها من مسطحات ملحية تتمثل في البحيرات الشمالية وبحيرة قارون وما حولها من مستنقعات. وبعد أن تجف هذه المستنقعات تترك خلفها بقايا ملحية تضر التربة وتقلل من خصبها، ولذلك تغسل هذه التربة جيدا قبل أن تستغل في الزراعة. وتتركز في هذه الأراضي زراعة الأرز الذي يمثل غلة رئيسية في الدورة الزراعية.

هذا، والارتباط وثيق بين التسميد ومتوسط إنتاج الفدان في الدورة الزراعية كما يبدو من الجدول الآتي:

الغلة	متوسط انتاج الفدان					
	١٩٣٩	١٩٤٥	١٩٤٧	٦٠/٥٤	٩٣/٩٢	٩٦/٩٥
القمح (بالاردب)	٦,١٥	٤,٧٩	٤,٢٧	٦,٤٢	١٤,٧٢	١٧
الذرة الشامي (بالاردب)	٧,٠٣	٦,٤٦	٦,٢١	٦,٤٥	١٨,٤٢	٩٠
الأرز (بالضريبة)	١,٧٤	١,٤٥	١,٧٤	١,٩٧	٣,٤ طن	٤

ومن هذا الجدول يتضح أن متوسط انتاج الفدان قد هبط كثيرا أثناء فترة الحرب الثانية لصعوبة استيراد الأسمدة، ثم بدأ متوسط الانتاج يتحسن بعد ذلك نتيجة للتوسع في انتاج الأسمدة محليا واشتيرادها من الخارج. فضلا عن التوسع في التقنية الحديثة.

والارتباط وثيق أيضا بين متوسط انتاج الفدان وتتابع المحاصيل في الدورة الزراعية. فالقمح يزرع عقب بور بعد شتوي أو بعد قطن وفي الحالة الأولى تقل حاجة القمح للتسميد ومعظم المساحة القمحية تزرع بعد القطن. وباقى المساحة تزرع بعد ذرة رفيعة صيفية أو ذرة شامية نيلية أو رفيعة ويوجد القمح بعد الأولى عن الثانية كما قد يزرع جزء منه بعد الخضرا وأقل محصول من القمح ينتج من زراعته بعد ذرة نيلية لعدة أسباب منها:

١ أحمد اسماعيل عبدالرؤف: القمح في مصر (من لبحاث تحسين أصنافه وزيادة انتاجه مصر، ٦٥، وزارة الزراعة - المصحبة الزراعية الشهرية - أكتوبر ١٩٥٣م)

- ١- التأخير في الزراعة إذ تكون عادة في أوائل ديسمبر.
- ٢- ضيق الوقت مما يؤدي الى عدم اتقان تجهيز الأرض رغم تماسكها وكثرة الحشائش بها.
- ٣- فقر التربة في الغذاء الأزوتي بعد الذرة النيلية.

كما يلاحظ أيضا أن الزراعة المتأخرة للقمح في شمال الدلتا كثيرا ما تتعرض للاصابة الشديدة بمرض الصدأ.

ووفقا لبرامج التوسع الزراعي في شمال الدلتا ومديرية التحرير فسيتم استصلاح ٣٧٥ ألف فدان في مناطق مختلفة منها أراضي رملية وأراضي طينية ملحية ووضعت الدورات الزراعية بحيث لوحظ جيدا نوع التربة وتتابع المحاصيل.

وليست كل الأراضي في الدلتا والوادي تمثل تربة طينية خصبة، إذ تظهر بها بقاع من التربة الرملية الفقيرة<sup>١</sup> فتوجد جزيرتان رمليتان بين قليوب وبنها وواحدة جنوب فاقوس، وخمس في جنوب السنبلوين، وأربع حول قويسنا بالمنوفية وتتكون هذه الجزر من الرمال والحصى وبعض المواد الجيرية المفتتة، وتمثل الأجزاء الصلبة المتماسكة البارزة من الرواسب الرملية التي تنتشر أسفل رواسب الدلتا الطينية. ويمكن استثمار هذه الجهات إذا توفرت مياه النيل اللازمة وإذا جلب بعض الطمي الخصب من الجهات المجاورة لمزجه بالطبقة الرملية السطحية وتستخدم في هذه الجهات دورة زراعية ثلاثية من أهم حاصلاتها الخضراوات وبعض الفاكهة وكذلك الموالح وأشجار

<sup>١</sup> خريطة الجزر الرملية المرفقة بهذا البحث: محمد إبراهيم حسن: الزراعة والتوسع الزراعي في الجمهورية العربية المتحدة (من مطبوعات جامعة الدول العربية - معهد الدراسات العربية للعالمية - ١٩٦٢ - لمام ص ٥٠)

المانجو. ولا شك أن أي توسع زراعي في هذه الجهات سيعتمد على توفير مياه الري النيلية.

والخلاصة أن النيل هو الذي خلق الدورة الزراعية الأولى في هذه البلاد فكان ولا يزال يفيض في أواخر الصيف وأوائل الخريف فيغذي التربة بالماء والغرين، ثم ينحسر عنها في وقت ملائم لزراعة المحاصيل الشتوية من قمح وشعير ثم يسقط مطر الشتاء فيغذيها حتى نهاية موسم نموها وحلول فصل الحصاد في أواخر الربيع. وعندما يتوقف الفلاح عن الزراعة في الصيف في وقت لم يعرف فيه نظام الري الدائم تشقق أشعة الشمس الحارة سطح التربة فتسمح بنفاد الهواء إليها وتغذيتها بعناصرها المفيدة وتطهرها من الآفات. وهكذا يتجلى مبلغ تعاون عناصر البيئة المختلفة من تربة خصبة ونظام جريان الماء والمناخ. وهكذا ظهرت الدورة الزراعية الأولى منذ أقدم العصور واستمرت حتى أواسط القرن الماضي حيث ظهرت غلات جديدة كالقطن وقصب السكر مما أدى إلى إدخال نظام الري الدائم ليحل محل ري الحياض الذي عرفته مصر منذ أن عرفت الزراعة.

ويظهر هذه المحصولات الجديدة حدث هذا الانقلاب الكبير في نظام الري، كما ظهرت الدورة الزراعية الثانية التي من أبرز عيوبها أن فترة الشراقي قصيرة قلما تعطي الأرض الفرصة المناسبة للراحة وتجديد خصوبتها كما أن هذه الفترة القصيرة من الشراقي لا تظهر إلا في السنة الثانية من الدورة وترتب على ذلك رفع مستوى الماء الباطني وضعف التربة في كثير من المناطق.

وازاء هذه المشكلات اتجهت السياسة المائية والزراعية الحديثة إلى خلق نوع من التوازن بين نظامي الري والصرف، مع العناية بتشجيع الدورة الزراعية الثلاثية، لما لها من مزايا عديدة في التنمية الزراعية ومن أهم مزاياها:

١- اتساع مساحة الحاصلات البقولية في الدورة الثلاثية، مما يؤدي إلى زيادة الأزوت في التربة التي تفتقر إلى هذا العنصر الهام.

٢- فترة الشراقي في الدورة الثلاثية تبدو طويلة، وهي الفترة التي تترك فيها الأرض بدون زراعة للراحة فيعود إليها نشاطها وخصبها. هذا فضلا عن هبوط مستوى الماء الباطني وسهولة الصرف.

٣- تمتاز الدورة الثلاثية بزيادة مساحة ما يزرع من حاصلات العلف مما يساعد على نمو الثروة الحيوانية وما يتبعه من زيادة في كميات الأسمدة التي تسهم في زيادة خصوبة التربة وارتفاع متوسط انتاج الفدان.

هذا، وهناك علاقة قوية بين أنواع التربة وأنواع المحاصيل في الدورة الزراعية. فالتربة الصفراء تجود بها غلات كثيرة من حبوب وخضراوات وفلكهة وموالح، والتربة السوداء هي أنسب أنواع التربة لزراعة القطن والحبوب. وترتفع نسبة الأملاح في تربة الأطراف الشمالية من الدلتا ومنخفض الفيوم لضعف انحدارها ولقربها من مسطحات ملحية تتمثل في البحيرات المجاورة، ولذلك تغسل هذه التربة جيدا قبل أن تستغل في زراعة الأرز بنوع خاص.

والارتباط وثيق أيضا بين متوسط انتاج الفدان وتتابع المحاصيل في الدورة الزراعية، فتجود زراعة القمح مثلا بعد يور لوقطن. وأقل محصول من القمح ينتج من زراعته بعد ذرة نيلية لاسباب منها: التأخير في الزراعة، وفقر التربة من الغذاء الأزوتي بعد الذرة النيلية.

وليست كل الأراضي في الدلتا والوادي تمثل تربة طينية خصبة، إذ تظهر بقاع من التربة الرملية الفقيرة، كما هو الحال في الجزر الرملية التي تتأثر في دلتا النيل. ويمكن استثمار هذه الجهات إذا توفرت مياه النيل اللازمة وإذا نقل إليها بعض الطمي الخصب من الجهات المجاورة لمزجه بالطبقة الرملية السطحية.

### التوسع الزراعي وحرية اختيار المحاصيل في الدورة الزراعية:

وفي مصر فإن المزارع أصبح حرا في زراعة المحاصيل وفقا للسعر وأن الدراسات التي قام بها قطاع الشؤون الاقتصادية بالوزارة في شأن تحديد مساحات التركيب المحصولي "التأثيري" للسنة الزراعية ٩٤/٩٣ توضح أن هناك زيادة في الزمام الكلي مقدارها ١٦٠ ألف فدان بنسبة ٢,١٪ وزيادة في المساحة المحصولية مقدارها ١٣٥ ألف فدان بنسبة ١٪، وعن قضية التركيب المحصولي والآثار الناجمة عن جعله اختياريا على انتاج المحاصيل الاساسية كالأرز والذرة والبقول وبنجر السكر والفاكهة والخضراوات وكذلك أثر ذلك على مصلحة المزارع والدولة. فإن التركيب المحصولي كان في الماضي اجباريا، يتم عرضه على مجلس الوزراء لاقراءه، أما الآن ومنذ

أكثر من خمس سنوات فقد توقف ذلك، ويقوم وزارة الزراعة باصدار التركيب المحصولي التأشيرى وهو توجيهى وغير ملزم، وترسله الى كافة المحافظات حتى يسترشد به المزارعون، حيث أن العامل الأساسى لدى المزارع والمحدد لنوعية التركيب المحصولى هو السعر. ويعلن عنه مسبقاً.

وعلى سبيل المثال، ففي العام الحالى ٩٤/٩٣ لا توجد مشكلة فى زراعة الأرز، بل إن غالبية المزارعين أتموا زراعة المشاتل، والزراعة فى المكان المستديم، فى المواعيد المناسبة، والسبب لأن الأرز كان ثمنه مجزياً، ولأن حرية التجارة أدت الى تشجيع المزارعين على استمرار زراعته، بالاضافة الى تصدير ما يزيد على ١٢٠ ألف طن أرز الى الخارج.

أما الأذرة فإن زراعتها فى العام الحالى جاءت متأخرة بعض الشيء، وذلك لأن الدولة لم تتسلم الأذرة من المزارعين بسعر ٧٠ جنيها للأردب فكان أن انخفض سعره الى ٤٠ جنيها فى أوائل الموسم مما أثر على زراعته.

بيان التركيب المحصولي للتأشيرى ١٩٩٤/٩٣	
المساحة "فدان"	المحصول
	١ - مجموعة الحبوب:
	أ - الزروع الشتوية:
١٩٠٠,٠٠٠	القمح
٨٠,٠٠٠	الشعير
	ب - الزروع الصيفية:
٢١٠٠,٠٠٠	ذرة شامية صيفي ونيلي
٢٢٠,٠٠٠	ذرة رفيعة صيفي ونيلي
١٠٠٠,٠٠٠	أرز صيفي ونيلي
٣٠,٠٠٠	ذرة صفراء
٥,٣٣٠,٠٠٠	جملة
	٢ - مجموعة البقوليات:
٣٥٠,٠٠٠	فول بلدي
٢٠,٠٠٠	عدس
١٥,٠٠٠	حمص
٨,٠٠٠	ترمس
١٥,٠٠٠	حلبة
٤٠٨,٠٠٠	جملة



بيان التركيب المحصولي التأسيري ١٩٩٤/٩٣	
المحصول	المساحة "فدان"
٣ - مجموعة الألياف:	
قطن	٩٠٠,٠٠٠
كتان	٣٠,٠٠٠
جملة	٩٣٠,٠٠٠
٤ - مجموعة البذور الزيتية:	
فول سوداني	٣٠,٠٠٠
فول صويا	٨٠,٠٠٠
سمسم	٥٠,٠٠٠
عباد الشمس	٨٠,٠٠٠
جملة	٢٤٠,٠٠٠
٥ - مجموعة المحاصيل السكرية:	
قصب السكر	٢٧٠,٠٠٠
بنجر السكر	٤٠,٠٠٠
جملة	٣١٠,٠٠٠


بيان التركيب للمحصولي التاشيري ١٩٩٤/٩٣	
المحصول	المساحة "فدان"
٦ - مجموعة الخضار:	
خضر مثوية	٣٢٥,٠٠٠
خضر صيفية	٤٨٠,٠٠٠
خضر تنيلية	١٥٠,٠٠٠
بطاطس نيلي	١٥٠,٠٠٠
جملة	١١٠٥,٠٠٠
٧ - مجموعة الأعلاف:	
برسيم مستديم	١٦٩٥,٠٠٠
برسيم تحريش	٨٠٠,٠٠٠
جملة	٢٤٩٥,٠٠٠
٨ - البصل	٥٠,٠٠٠
٩ - الثوم	٢٠,٠٠٠
١٠ - الحذاق	٥٦٣,٠٠٠
١١ - محاصيل اخرى	٤٩٦,٠٠٠
اجمالي للمساحة المحصولية	١١٩٤٧,٠٠٠

٩٣/٩٢	٩٤/٩٣	التركيب المحصولي التأشير
فدان	فدان	
		أولاً: الزمام المستهدف:
		الزمام المستهدف في
٦,١٥٠,٠٠٠	٦,٢٦٥,٠٠٠	الأراضي القديمة
		الزمام المستهدف في
١,٣٥٠,٠٠٠	١,٣٩٥,٠٠٠	الأراضي الجديدة
٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,٦٦٠,٠٠٠	الزمام الكلي
		ثانياً: المساحة المحصولية:
		المساحة المحصولية
١١,٧٦٢,٠٠٠	١١,٩٤٧,٠٠٠	بالأراضي القديمة

٩٣/٩٢	٩٤/٩٣	التركيب المحصولي التأشير
فدان	فدان	
		المساحة المحصولية
٢,١٦٥,٠٠٠	٢,١١٥,٠٠٠	بالأراضي الجديدة
		قمح بالساحل الشمالي
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	وسيناء
		إجمالي المساحة
١٤,١٢٧,٠٠٠	١٤,٢٦٢,٠٠٠	المحصولية

مما سبق يتضح أن هناك زيادة في الزمام الكلي مقدارها  
١٦٠,٠٠٠ فدان (٢,١٪) وزيادة في المساحة المحصولية  
مقدارها ١٣٥,٠٠٠ فدان (١٪)

جريدة الأهرام: بتاريخ ١٠/٧/١٩٩٣ ص ٢٠





## الفصل التاسع

### حوض البحر الأحمر





## حوض البحر الاحمر

### مقدمة

- أ- أريتريا تساهم في الاشراف على المنخل الجنوبي للبحر الأحمر كما تساهم في تغذية حركة الملاحة البحرية بالنشاط التجاري وخدمات السفن.
- ب- لفتشتر جنس البحر المتوسط في كل حوض البحر الأحمر وما تبعه من نشاط تجاري وتغلغل ديني ولغوي.

- أولاً: التكامل التضاريسي في حوض البحر الأحمر ممثلاً في:
- ١- المجموعات الجزرية.
  - ٢- السهل الساحلي الضيق.
  - ٣- ظاهرة المرتفعات الأخدودية والهضاب الخلفية.
  - ٤- ظاهرة التقطع بشبكات الأودية الجافة.

ثانياً: التكامل مناخياً ونباتياً في أنماط التربة لحوض البحر الأحمر:

- ١- النظام المناخي.
- ٢- الغطاء النباتي.

## ٢- أنماط التربة.

- أ- التربة الصحراوية.
- ب- تربة المرتفعات.
- ج- تربة الأودية الجافة.
- د- التربة الرسوبية النهرية.
- هـ- التربة السبخية.
- و- تربة التفتتات القوقعية والمرجانية.
- ز- التربة البركانية.

ثالثاً: التكامل بين الموارد الاقتصادية لحوض البحر الأحمر  
ومجالات التوسع الاقتصادي:

- ١- موارد الاقليم.
- ٢- مشكلات للتربة.
- ٣- قلة الأيدي العاملة.
- ٤- مشكلات الثروة الحيوانية والسّمكية.
- ٥- مشكلات النقل.
- ٦- الثروة المعدنية.
- ٧- مجالات التوسع الاقتصادي.
- أ- التوسع في زراعة الأودية الجافة والأخوار النهرية  
والسهول المجاورة وذلك عن طريق:
  - ١- حفر الآبار العميقة.
  - ٢- إقامة سدود على الأودية الجافة لتخزين مياه  
المسيول.
  - ٣- إقامة سدود على الأودية النهرية للتخزين المائي.
  - ٤- حفر شبكة من قنوات الري والصرف.
  - ٥- تطبيق سياسة زراعية عامة حديثة.

ب- تحويل المنحدرات الى مدرجات في حوض البحر الأحمر. وهو يمتاز جغرافيا:

- ١- التباين في النظم التضاريسية.
- ٢- التباين في الأقاليم المناخية والنباتية وفي أنماط الثروة مما يدعم التكامل الاقتصادي.

ج- التوسع في مزارع العلف لتنمية الثروة الحيوانية:

- ١- لدوره الزراعية الثلاثية وزيادة مساحة محاصيل العلف.

٢- نمو الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأسمدة العضوية.

٣- تغطية الاستهلاك المحلي مع فائض للتصدير.

د- المزارع السمكية: البحر الأحمر غني في ثروته البحرية لما يلي:

- ١- تغذية هذه الثروة البحرية بامدادات من المحيط الهندي والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
- ٢- مياه البحر الأحمر غنية بتنوع طحالبها وأعشابها البحرية.

- ٣- انتشار الشطوط المرجانية وتكثر الأسماك.
- ٤- تنوع الأعماق وتنوع الثروة البحرية.
- ٥- انتشار الخلجان الضيقة والمزارع السمكية.
- هـ- التنقيب عن الثروة المعدنية: ومما يمهدها:

- ١- انتشار الشقوق والفوالق في كل النطاق الأخدودي.
- ٢- التمثيل الجيومورفولوجي للكتوينات الصخرية.
- ٣- المسح الجيولوجي الدقيق خرائطيا.
- ٤- خرائط خطوط الانكسارات والتشيلات المحببة

والمفرد.

٥- المسح الجيولوجي لقاع البحر الأحمر وأعماق المياه.

٦- توفير الأجهزة العلمية الحديثة للكشف الجيولوجي حقليا ومعمليا.

و- تدعيم شبكات النقل بأنواعها المختلفة:

١- حركة الملاحة بالبحر الأحمر هي قلب الخط الملاحي العالمي ما بين الشرق الأقصى والمحيط الأطلنطي.

٢- التوسع في مد شبكات الطرق والسكك الحديدية وخطوط الملاحة الجوية بهدف:

أ- تنشيط حركة التجاره بين فوض البحر الأحمر والأقاليم المجاوره ولاسيما السوق الإفريقيه.

ب- تنشيط حركة السياحه بأنواعها من سياحه دينيه وأثرية والتمتع بالمظاهر الطبيعية الجميلة ومعالجة الاستشفاء.

## مقدمة:

أ- أريتريا منذ فجر التاريخ تساهم في الاشراف على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر الذي يربطه بالمحيط الهندي فالمحيط الهادي. فهي بحكم موقعها الجغرافي يمر بأرضها أهم وأقدم وأطول طريق ملاحى فى العالم مبتدأ من موانئ المحيط الهادى مثل ميناء سان فرانسيسكو وميناء فانكوفر بغرب أمريكا الشمالية، كذلك موانئ الشرق الآسيوى مثل فلافيفسك وبكين وطوكيو. وبعد أن يمر الطريق الملاحى بموانئ جنوب و جنوب شرقى آسيا يصل الى عدن عند مدخل البحر الأحمر ليلتقى به الطريق الملاحى الأفريقى الشرقى. ويخترق الطريق البحر الحمر نحو قناة السويس خالفا نشاطا تجاريا ضخما فى كل حوض البحر الحمر وموانئه التى منها مصوع وعصب وبورسودان والحديدة وجدة والسويس. ويخترق الطريق بعد ذلك حوض البحر الأبيض المتوسط نحو مضيق جبل طارق اذ تتصل به شعب من كل موانئ الجنوب الأوروبى والغرب الآسيوى والشمال الأفريقى. ويخترق الطريق الملاحى العظيم الضخم مياه المحيط الاطلسى نحو قناة بنما بأمريكا الوسطى. وتنتهى اليه فروع ملاحية من كل موانئ الغرب الأوروبى والغرب الأفريقى والشرق الأمريكى. ويمتد الطريق بعد ذلك نحو المحيط الهادى. فهذا المد الملاحى الضخم المتشعب فى كل

بحار العالم ومحيطاته تشكل موانئ أريتريا جزءا منه لتغذيته بالنشاط التجاري وخدمات السفن والنقل البحري.

ب- وانتشر جنس البحر المتوسط في كل حوض البحر الأحمر متوغلا حتى أواسط إفريقيا والجنوب الآسيوي مواكبا للنشاط التجاري والتغلغل الديني ليلتقي بالدماء المغولية الصينية في آسيا والدماء الزنجية في أواسط وشرق إفريقيا. وانعكس ذلك على التركيب الجنسي لسكان أريتريا فسادت ملامح جنس البحر المتوسط مع بعض تأثيرات زنجية. كما انتشر الدين المسيحي والدين الاسلامي بين السكان متأخين. وانتشر ايضا التأثير اللغوي فسادت اللغة العربية في كل حوض البحر الأحمر والأراضي المجاورة. وأثرت كثيرا في اللغات واللهجات المحلية الاقليمية.

أولا: التكامل التضاريسي في حوض البحر الأحمر:

فالمظاهر التضاريسية في أريتريا هي استمرار لها في كل حوض البحر الأحمر. وقد جاءت كرد فعل للمد الأخدودي العظيم الذي بدأ يتكون منذ أواخر الزمن الجيولوجي الثاني. مبتدأ في نطاق أخدودي مركب حيث ارتفعت الجوانب مكونه جيالا أخدودية وهبط قاع الأخدود في خط متموج من الجنوب الى الشمال. ويمتد هذا النطاق الأخدودي الكبير من شمال نهر زمبزي بالجنوب الافريقي متجها صوب الشمال حيث تمتد بحيرة

ملاوي<sup>١</sup>، وبعدها يتفرع الأخدود الأفريقي إلى شعبتين رئيسيتين هما:

- أ- الشعبة الغربية أو النيلية متضمنة بحيرات إفريقيا الوسطى
- ب- الشعبة الشرقية أو الأثيوبية والتي تتفرج محتضنة أريتريا وكل حوض البحر الأحمر حتى مرتفعات لبنان الأخدودية وهذا التكامل التضاريسي يتمثل في:

#### ١- المجموعات الجزرية:

ممثلة في مجموعة الجزر الأريتيرية أمام ميناء مصوع، ومجموعة جزر باب المنذب أو المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. والمجموعات الجزرية أمام مدخل خليجي السويس والعقبة. وكل هذه المجموعات الجزرية جيمورفولوجيا تشكل أسنة من الساحل المجاور قطعت وتحولت إلى جزر بفعل الأمواج والتعرية البحرية.

#### ٢- السهل الساحلي الضيق:

يمتد موازيا لسواحل البحر الأحمر ممثلا في السهل الأريتيري وتهامة الحجاز والعسير واليمن. وترجع ظاهرة ضيق السهل الساحلي جيمورفولوجيا إلى طبيعة نشأة اخدود البحر الأحمر كأخدود مركب ارتفعت فيه الجوانب كجبال أخدودية انكسارية وعرة معقدة بينما هبط قاع الأخدود كرد فعل لهذه الحركة

<sup>١</sup> الجماهيرية الليبية: الأطلس التعليمي - خريطة إفريقيا والأخدود الأفريقي العظيم

الانكسارية هبوطا عميقا مما صعب معه نمو السهل الساحلي بالرواسب التي تتجمع على جانبي قاع الأخدود.

## ٢- ظاهرة المرتفعات الأخدودية والهضاب الخلفية:

اذ تمتد المرتفعات أو الجبال الأخدودية على جانبي البحر الأحمر ممثلة في جبال أريتريا والسودان ومصر على الجانب الأفريقي. ويواجهها مرتفعات اليمن والعسير والحجاز على الجانب الآسيوي. وتشترك كلها في أصلها الأخدودي كجبال تدفعية شديدة الانحدارات. وقد ظهرت هذه المنحدرات أحيانا على شكل مدرجات سلمية. وتمتد الهضاب الداخلية خلف المرتفعات. وقد تموج سطحها في أحواض صغيرة داخلية يتوسط بعضها بحيرات صغيرة.

## ٤- ظاهرة التقطع بشبكات الأودية الجافة:

اذ تتساقط هذه الأودية الجافة على المنحدرات الأخدودية في اتجاهين متضادين. أحدهما نحو البحر الأحمر والثاني نحو الهضاب الخلفية. وتنتهي هذه الأودية بمراوح دلتاوية. وهي غنية بترتبتها الرسوبية ومياهها الجوفية. لأنها كانت تشكل شبكات نهريّة في العصر المطير بأواسط الزمن الجيولوجي الرابع. ولما سادت ظروف المناخ الصحراوي بعد ذلك جفت هذه النهار وتحولت إلى أودية جافة ولكنها غنية بمخزوناتها من المياه الجوفية. وأصبحت هذه الأودية الجافة في كل حوض البحر الأحمر تشكل مناطق حديثة للتوسع الزراعي. كما شرحنا تفصيلا في العرض التضاريسي التحليلي لأراضي أريتريا.



ومن تتبعنا لهذا التكامل التضاريسي لحوض البحر الأحمر يتضح أن أريتريا تضاريسيا تمثل حوض البحر الأحمر تمثيلا جيدا. فهي جزء رئيسي من الكيان التضاريسي للحوض.

ثانيا: التكامل مناخيا ونباتيا وفي أنماط التربة لحوض البحر الأحمر.

## ١- النظام المناخي:

فحوض البحر الأحمر يقع بين ثلاث كتل صحمة من الضغط الجوي ممثلة في:

- أ- الضغط الجوي الأوراسي.
- ب- الضغط الجوي الأفريقي.
- ج- الضغط الجوي المرتفع الدائم على المحيط الهندي.

ففي نصف السنة الشتوي تهب رياح جافة من الضغط المرتفع الممتد على وسط آسيا وأيضا من الضغط المرتفع على الصحراء الكبرى الأفريقية متجهة نحو حوض البحر الأحمر. وهي تلتقط الأبخرة من المسطحات المائية التي تمر عليها كبحر قزوين والبحر الأسود والبحر المتوسط والبحر الأحمر وتسقط بعض الأمطار الشتوية القليلة على السهول الساحلية لحوض البحر الأحمر.

وأما في نصف السنة الصيفي فيسود ضغط منخفض على أوراسيا من ناحية والصحراء الكبرى الأفريقية من ناحية أخرى.

وتهب رياح من الضغط المرتفع على المحيطات المجاورة ممثلة في المحيط الأطلسي الشمالي والجنوبي والمحيط الهندي متجهة نحو مناطق للضغط المنخفض. وتلتقي في حوض البحر الأحمر مسقطاً لمطار صيفية. فالرياح الغربية من المحيط الأطلسي تسقط أمطاراً على هضبة الحبشة والأراضي الأريتيرية المجاورة ثم تعبر البحر الأحمر نحو شبه الجزيرة العربية فتصل إليها شبه جافة. ولما الرياح التي تهب من المحيط الهندي نحو حوض البحر الأحمر فهي تسقط أمطاراً على هضبة اليمن ثم تواصل رحلتها كرياح جافة على شبه الجزيرة العربية.

## ٢- الغطاء النباتي:

فوفقاً للنظام المناخي المشار إليه بسود حوض البحر الأحمر مناخ شبه جاف. وما يترتب عليه من غطاء نباتي فقير. ويتباين هذا الغطاء النباتي من جهة إلى أخرى وفقاً لعلامي الموقع الجغرافي ومظاهر السطح. فتسود أعشاب الصحراء في صحراء دنكاليا الأريتيرية والصحاري العربية المجاورة. كما تنتشر الأشجار والشجيرات بين الحشائش على المرتفعات والهضاب المختلفة.

## ٣- أنماط التربة:

فالتربة هي ثمرة التفاعل بين الاشتقاق الصخري والعوامل المناخية والنباتية. وأنماط التربة الرئيسية التي تسود في كل حوض البحر الأحمر يمكن أن تمثل في:

### أ- التربة الصحراوية.


- ب- تربة المرتفعات.  
 ج- تربة الأودية الجافة.  
 د- التربة الرسوبية النهرية.  
 هـ- التربة السبخية الملحية حول البحيرات وعلى طول الشواطئ في الأراضي المنخفضة وحول الخلجان المتعمقة في الداخل على شكل السنة بحرية.  
 و- تربة التفتتات القوقية والمرجانية أمام الخطوط المرجانية الساحلية.  
 ز- التربة البركانية وهي تربة الحارات حيث للواظف أو البقايا البركانية القديمة.

ثالثا: التكامل بين الموارد الاقتصادية لحوض البحر الأحمر ومجالات التوسع الاقتصادي:

#### ١- موارد الأقليم:

فحوض البحر الأحمر يتوسط أضخم نطاق صحراوي حار في العالم ما بين الصحراء الأفريقية الكبرى غربا وصحراء الربع الخالي وشبه جزيرة العرب شرقا. وتمتد أطرافه ما بين المحيط الهندي المداري جنوبا وحوض البحر المتوسط بمناخه المعتدل الدافئ شمالا. فحوض البحر الأحمر في جملته ينتمي الى المناخ المداري شبه الجاف. ولذلك فإن موارده الاقتصادية الزراعية الرئيسية من حبوب وتمور وتين وزيتون وبعض الحمضيات تروى بالمياه الجوفية وبيعض مياه الأمطار القليلة. بالإضافة الى المراعي المتناثرة في بطون الأودية وعلى المنحدرات الجبلية وفي الأحواض الهضبية لتربية الابل والماعز

والأغنام وبعض الأبقار. وهذا بالإضافة إلى الثروة السمكية البحرية التي تنجود بها مياه البحر الأحمر وخليجته المتناثرة.



وهذه الموارد الاقتصادية لم تستثمر على الوجه الأكمل لعدم توفر وسائل التقنية الحديثة. إذ أن الانتاج الزراعي والرعي يعاني من مشكلات متنوعة منها:

## ٢- مشكلات التربة ممثلة في:

- أ- ارتفاع نسبة الأملاح في التربة لسوء الري وضعف الصرف للتخلص من المياه الزائدة مما يؤدي الى ترسيب الأملاح.
- ب- شدة تماسك ذرات التربة لاستخدام الحرث السطحي الضعيف.
- ج- ضعف القدرة الانتاجية للأرض لعدم استخدام دورات زراعية علمية وقلة استخدام الأسمدة المناسبة. فضلا عن انتشار الآفات الزراعية والنباتات المتطفلة.

## ٣- قلة الأيدي العاملة المدربة فنيا:

مع ظاهرة هجرة العمال الزراعيين للعمل في المدن وحقول النفط والمناجم لاستخراج المعادن.

## ٤- مشكلات الثروة الحيوانية والسمكية:

- أ- انتشار الأمراض بين الحيوانات.
- ب- عدم الاهتمام بأصل السلالة. يجهل المربي نظام تسجيل الحيوانات الا في المزارع الكبيرة النموذجية.
- ج- عدم العناية بنوع الغذاء وكميته. مما يؤدي الى قلة النسل وضعف ادرار اللبن.

كما تعتبر الفترة ما بين أوائل يوليو وأواخر أكتوبر فترة قاسية على الرعاة وقطعان الماشية لشدة الحرارة وقلّة المياه وفقر المرعى. فتضعف الحيوانات وتبدو أجسامها هزيلة. ولهذه الحيوانات القدرة على تحمل مثل هذه الظروف. وعند ادخال أصناف جديدة لتحسين الثروة الحيوانية يجب أن يراعى فيها القدرة على تحمل مثل هذه الظروف المناخية القاسية<sup>١</sup>.

وأما الثروة السمكية فهي مهمة الى حد كبير اذ تستخدم الوسائل البدائية في الصيد البحري مع انخفاض كبير في مستوى الصيادين فنيا واقتصاديا واجتماعيا.

#### ٥- مشكلات النقل ومن أهمها:

- أ- ضعف شبكات الطرق لربط اقاليم الحوض المختلفة.
- ب- ضعف الملاحة المحلية بين موانئ حوض البحر الأحمر.
- ج- على الرغم من أن البحر الأحمر يشكل طريقا مهما لحركات الملاحة العالمية بين المحيط الهادي والمحيط الهندي والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي الا أن خدمات النقل البحري تكاد تنحصر بين ميناء عدن عند المدخل الجنوبي وموانئ قناة السويس عند المدخل الشمالي للبحر الأحمر.

١.د. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط الاسكندرية - ١٩٨٩ ص ٦٩

د- حركة الملاحة الجوية بين مدن حوض البحر الأحمر تبدو ضعيفة جدا. وتكاد تتركز في ميناء عدن وميناء جدة.

#### ٦- الثروة المعدنية في حوض البحر الأحمر:

وهي تتركز اقتصاديا في انتاج النفط بحوض خليج السويس. ولكن توجد لمكانيات للتقيب والتوسع في استخراج معادن اخرى مثل الفحم والحديد والذهب والفوسفات وبعض المعادن الاخرى الا أن عقبات جوهريّة تعرقل هذا الاستثمار منها:

أ- ضعف شبكات النقل.<sup>١</sup>

ب- التعقّد التضاريسي في مناطق المناجم.<sup>٢</sup>

ج- قلة الخبرة الفنية في وسائل التقيب المعدني للاستثمار وفقا للمكانيات المتاحة.

هـ- ارتفاع تكاليف التقيب المعدني وقلة رأس المال.

#### ٧- مجالات التوسع الاقتصادي:

ولتدعيم التكامل الاقتصادي بين اقاليم حوض البحر الأحمر يراعى ما يأتي:

١. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط

- الاسكندرية - ١٩٨٩ ص ٦٩

٢. صبحي عبدالحكيم وآخرون: أطلس لشرق الأوسط ص ٢٠ ، ص ٢٦

## أ- التوسع في زراعة الأودية الجافة والأودية أو الأخوار النهرية والسهول المجاورة لها:

فحوض البحر الأحمر غني بشبكات الأودية الجافة. وهي تتساب في اتجاهين أحدهما نحو البحر الأحمر. والثاني نحو الأحواض والهضاب الداخلية. وكلها غنية بمياهها الجوفية والتربة الرسوبية الطفلية الخصبة المعتدلة النسيج وذات قطاع معتدل يسمح بتوغل جذور النباتات. وقد استغلت بعض هذه الأودية استغلالاً جيداً مثل الأودية التي تتساب نحو الهضبة الأريتيرية، وكذلك الأودية التي تتساب نحو وادي النيل في مصر والسودان. بالإضافة إلى أودية شبه جزيرة سيناء ولاسيما وادي العريش وكذلك أودية شبه جزيرة العرب مثل وادي الدواسر ووادي الرمة ووادي جيزان.

وأما عن الأودية أو الخيران النهرية فنخص بالذكر: خور بركة وخور القاش في كل من أريتريا وشرق السودان. وكذلك وادي نهر عطبرة. وهذه الأودية تمتاز بجريان المياه، وبترية رسوبية خصبة بنية أو سوداء ترتفع فيها نسبة المواد العضوية المتحللة وذات قطاع سميك.

ويمكن التوسع زراعياً في هذه الأودية وما يجاورها من سهول متسعة. ونخص بالذكر السهول الممتدة بين مصوع واسمره شمال ووسط أريتريا. وكذلك سهول شمال شرق السودان حتى سواكن وبورسودان بالإضافة إلى سهول التهامة في الحجاز والعسير واليمن. ونشير خاصة إلى السهول الممتدة على جانبي قناة السويس وشمال سيناء.



ويمكن التوسع في توفير مياه الري عن طريق:

١- حفر آبار عميقة تصل إلى الطبقة الثانية أو الثالثة الخائنة للمياه الجوفية مع وضع الخزانات الجوفية تحت رقابة دقيقة للحفاظ على المخزون المائي.

٢- إقامة سدود في المواقع المناسبة على الأودية الجافة لتجميع مياه الأمطار والسيول. وهذه السدود تحقق في أنشائها ثلاثة أهداف هامة هي:

أ- تكوين بحيرة تخزين مائي تأخذ منها قنوات للري.

ب- حماية المدن من أضرار السيول العارمة.

ج- تغذية الخزانات الجوفية مائيا.

٣- إقامة سدود على المواقع المناسبة من المجاري النهرية المشار إليها لتخزين مياه الفيضان بهدف استخدامها للتوسع الزراعي. وبالإضافة إلى إمكانية توليد طاقة كهربائية تستخدم في المدن والنشاط الصناعي.

٤- حفر شبكة من قنوات الري لنقل المياه إلى مناطق التوسع الزراعي ولاسيما في السهول الشرقية والشمالية الغربية من أريتريا. وإيضا إلى إقليم قناة السويس حيث وضع مشروع يهدف إلى نقل مياه النيل إلى الأراضي الجيدة السوداء على جانبي قناة السويس وشمال غرب سيناء.

وهنا نشير إلى أن السياسة الزراعية في حوض البحر الأحمر بجميع أقاليمه يجب أن تهدف إلى تحقيق:

أ- توفير مياه الري على النحو الذي شرحنه.

ب- التوسع في الزراعة البعلية على مياه الأمطار.

ج- حفر شبكات من المصارف لسحب المياه الزائدة من التربة حتى لا تتكون أراضي سبخية ملحية وتستمر التربة في نشاطها الوظيفي. وفي نفس الوقت تجمع مياه المصارف وتعالج كيميائياً لاعادة استخدامها للري. وقد نفذ هذا النظام في اقليم قناة السويس.

د- استخدام دورة زراعية بهدف رفع القدرة الانتاجية للأراضي وعدم اجهادها.

هـ- التخلص دورياً من الآفات الزراعية والحشائش المتطفلة على للزراعة.

و- استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري كنظام الري بالرش أو التقيط للحفاظ على مصادر المياه العذبة.

ز- استخدام الأسمدة العضوية والكيميائية لتحسين جودة الأرض وتعويض عناصرها.

ح- التوسع في زراعة أشجار السنط والكافور والكزورينا حول المزارع كمصدات للرياح ضد زحف الرمال ومهاجمة التصحر. بالإضافة الى اضافة ثروة خشبية قيمة.

ب- تحويل المنحدرات الى مدرجات:

ويلاحظ أن الجوانب الاخدودية لحوض البحر الأحمر في كثير من مواقعها تبدو منحدره باعتدال في تدرج سلبي المظهر مما يسهل تحويلها الى مدرجات متسعة مثل المنحدرات الأريترية وكذلك منحدرات العسير واليمن. وقد حولت فعلاً بعض هذه المنحدرات الى مدرجات نقلت اليها التربة وزرعت ببعض الأشجار مثل أشجار البن والكافور والسنط وبعض أنواع من أشجار الشاي.

وهذه ظاهرة عامة في الاخود الاقريقي الآسيوي. وهو أهم وأضخم اخود في العالم اذ يمتد ما بين مرتفعات لبنان الاخودية التي تحتضن وادي البقاع الطولي شمالا حتى جنوب افريقيا جنوبا محتضنا كل حوض البحر الأحمر والشرق الاقريقي لطول يزيد على ٣٠٠٠ ميلا.

وأهم ما يميز هذا الاخود الاقريقي الآسيوي العظيم أنه:

- ١- تتمثل فيه مظاهر تضاريسية مختلفة يكمل بعضها بعضا فالجوانب الاخودية تبدو في سلاسل مرتفعة تحتضن قاع الاخود الذي يتموج في سطحه ما بين بحيرات حوضية طولية وأراضي سهلية.
- ٢- في امتداده الاخودي الطولي العظيم يحتضن عددا كبيرا من الاقاليم المناخية النباتية وأنماط مختلفة من التربة أشرنا اليها سابقا. وذلك يدعم التكامل الاقتصادي بين اقاليمه المختلفة.

ج- التوسع في مزارع العلف وتنمية الثروة الحيوانية:

- ١- فالدورة الزراعية الثلاثية هي التي تسود في المزارع الحديثة في حوض البحر الأحمر. ويقصد بها أن المحصول الرئيسي كالقطن أو الحبوب يزرع مرة واحدة في نفس قطعة الأرض مرة كل ثلاث سنوات. مع ملاحظة التوسع في زراعة حاصلات العلف.

١ W. G. Moore: A Dictionary of Geography - London - ١٩٦٧ - P1٨٤.

B. Bunting: The Geography of Soil - London - ١٩٦٩ - P١٠١-١١٤

- ٢- مما يساعد على نمو الثروة الحيوانية وما يتبعه من زيادة كبيرة في كميات الأسمدة العضوية التي تساهم في زيادة خصوبة التربة ورفع القدرة الانتاجية للأراضي.
- ٣- كما أن تشجيع تربية الثروة الحيوانية يؤدي الى تغطية الاستهلاك المحلي مع فائض للتصدير.

#### د- المزارع السمكية:

فالبحر الأحمر غني في ثروته البحرية المتنوعة كما يأتي:

- ١- تغذي هذه الثروة البحرية بامدادات من المحيط الهندي المداري جنوبا ومن البحر المتوسط والمحيط الأطلسي بثروته السمكية التي تنتمي الى المناخ المعتدل الدفئ والبارد شمالا. وتتحرك هذه الامدادات السمكية البحرية مع حركة التيارات البحرية عبر البحر الأحمر.
- ٢- تمتاز مياه البحر الأحمر بغناها في الطحالب والأعشاب البحرية والتي تغذى بما تنقله اليها مياه الأنهار والسيول من رواسب محمله بالبقايا العضوية التي تصلح لتغذية الثروة البحرية. وهي تشكل بقايا نباتية وحيوانية متحللة.
- ٣- انتشار الشطوط المرجانية على جوانب البحر الأحمر أمام شواطئه. وهي تشكل مناطق لنمو وتكاثر الأسماك.
- ٤- التدرج في أعماق مياه البحر الأحمر مما يؤدي الى تنوع في الثروة البحرية وفقا لتباين الأعماق.
- ٥- انتشار الخجان الضيقة المتعمقة في السهول الساحلية وبطون الأودية. وهي محمية بتجمعات جزرية. مما يجعلها تشكل مناطق مناسبة لتربية الأسماك.

وكل هذه العوامل الجغرافية المتنوعة تتكامل في خلق ثروة بحرية غنية متنوعة. يجنر رعايتها وتنميتها عن طريق التوسع في إنشاء المزارع السمكية من ناحية وتنظيم الصيد البحري من ناحية أخرى. وذلك وفقاً لأساليب الصيد الحديثة واستخدام أساطيل الصيد البحري المنظمة. وبذلك تساهم هذه الثروة السمكية في تغطية الاستهلاك المحلي من الأسماك، وسد العجز في نقص الثروة الحيوانية في بعض مناطق حوض البحر الأحمر. مع وجود فائض كبير للتصدير الى الخارج، وتنمية صناعات الأسماك بأنواعها المختلفة في موانئ الصيد الكثيرة على جانبي البحر الأحمر. وهكذا تساهم هذه الصناعة الهامة في تنمية الأمن الغذائي وحمايته في كل اقاليم حوض البحر الأحمر.

#### هـ- التنقيب عن الثروة المعدنية:

اذ يمهّد لهذا التنقيب عوامل جغرافية من أهمها:

- ١- انتشار الشقوق والفوالق في كل النطاق الاخدودي لحوض البحر الأحمر مما يسهل الكشف عن الخامات المعدنية.
- ٢- التمثيل الجيومورفولوجي لكل التكوينات الصخرية على مدى العصور منذ ما قبل الزمن الأول حتى الزمن الرابع. وهي التكوينات الحاملة للخامات المعدنية في أجزاء منها.
- ٣- المسح الجيولوجي الدقيق لمعظم أجزاء حوض البحر الأحمر في لوحات خرائطية تفصيلية. وهي تبين أنواع الصخور وأعمارها.
- ٤- خرائط تفصيلية تبين خطوط الانكسارات الرئيسية والتوزيع الجغرافي للثنيات المحببة والمقعدة مع دراسة تحليلية لها.

٥- المسح الجيومورفولوجي لقاع البحر الأحمر وخلجانه وتدرج أعماق المياه وحركات التيارات المائية البحرية.  
٦- توفير الأجهزة العلمية الحديثة للكشف عن مواقع الثروة المعدنية وأعماقها وكمياتها. وتوفير الأجهزة المعملية لتحديد نوع الخام المعدني ودرجة نقاءه.

وبلّت الدراسات الحديثة على وجود كميات من الخامات المعدنية بالإضافة الى حقول النفط والغاز الطبيعي والحديد والفحم والمنجنيز والنحاس والفوسفات وغيرها.

#### و- تدعيم شبكات النقل بأنواعها المختلفة:

فحوض البحر الأحمر يفتقر الى تدعيم التكامل بين شبكات النقل بأنواعها المختلفة مع التوسع في مدها الجغرافي وذلك على النحو الآتي:

١- ان حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر تشكل القلب بالنسبة لحركة الملاحة على طول الخط الملاحي العالمي ما بين الشرق الأوسط والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي. ولكن على الرغم من هذه الأهمية الجوهرية للموقع الجغرافي للبحر الأحمر ما بين مدخله الجنوبي عند باب المندب والجزر المحيطة به، وقناة السويس وخليج السويس عند الطرف الشمالي، الا أن حركة خدمات السفن والملاحة تكاد تكون قاصرة على ميناء عدن وموانئ قناة السويس. أما الموانئ الأخرى على جانبي البحر الأحمر فنشاطها الملاحي يبدو ضعيفا. وهي من الموانئ الصغيرة. وهنا نؤكد أن الموقع الجغرافي الممتاز بين أوروبا وآسيا وإفريقيا يعطي

مثالا جيدا لتنوع مظاهر التغيير الجغرافي ما تم منها فعلا وما هو قيد البحث والدراسة تمهيدا للتنفيذ على مراحل متوالية. وإن من مظاهر التغيير الجغرافي على سبيل المثال ظاهرة هامة هي ربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط بعد حفر قناة السويس مما أدى الى خلق أطول وأهم طريق ملاحى في العالم ممتدا عبر المحيط الهادى حتى ميناء سنغافورة التى تلقب ببوابة المحيط الهادى عند الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الملايو. ثم يخترق هذا الخط الملاحى المحيط الهندي فالبحر الأحمر عند باب المندب. ويستمر شمالا حتى قناة السويس والبحر المتوسط الى مضيق جبل طارق. ويخترق المحيط الأطلسى حتى قناة بنما بأمريكا الوسطى ليعود الى المحيط الهادى. وتصب فى هذا الخط الرئيسى شبكة ضخمة من الطرق الملاحية عبر كل محيطات العالم. وهنا نشير بنوع خاص الى حركة نقل النفط عبر قناة السويس. فالمسافة بين لندن والكويت عبر طريق جنوب افريقيا تبلغ ١٣٤٣٧ ميلا تنقص الى ٧٤٨٨ ميلا اذا استعمل طريق قناة السويس. فلا مجال للمناقشة بين الطريقين؛ فقناة السويس تنقل ١٤٪ من تجارة العالم البحرية. وقد عمقت ووسعت القناة بحيث تسمح بعبور أضخم ناقلات النفط فى العالم بحمولة تصل الى أكثر من ٥٠٠ ألف طن.<sup>١</sup>

١- د. محمد إبراهيم حن: دراسات فى جغرافية الوطن العربى وحوض البحر

المتوسط - الاسكندرية - ١٩٨٩ ص ٤٩٧-٤٩٩

ب- مجلة آخر ساعة المصرية: العدد ٢٧٠١ - عدد ممتاز ٣٠ يوليو ١٩٨٦ - ثلاثون

عنا فى تاريخ قناة السويس من ١٩٥٦ الى ١٩٨٦ ص ٣٤، ٣١

فموانئ البحر الأحمر الأخرى مثل عصب ومصروع وسوانكن وبورسودان على الجانب الأفريقي، وموانئ الحديد وجدة وينبع على الجانب الآسيوي، في حاجة ماسة إلى التوسع الكبير في هيكلها البنائي لتساهم في النشاط الملاحي وخدمات السفن على طول الطريق الملاحي الرئيسي وفروعه. ونخص بالذكر:

- أ- زيادة الأرصفة البحرية في أطوالها وأنواعها.
- ب- التوسع في بناء المخازن لاستقبال حركة التجارة.
- ج- تجهيز الميناء بالأجهزة الحديثة لنقل التجارة من وإلى السفن المختلفة.
- د- ربط هذه الموانئ بشبكات من الطرق الداخلية والخارجية.

٢- التوسع في مد شبكات الطرق والسكك الحديدية وخطوط الملاحة الجوية. وذلك لربط مدن وموانئ حوض البحر الأحمر بالشرق الأوسط والوطن العربي وحوض البحر المتوسط وشمال ووسط أفريقيا. بهدف تحقيق ما يأتي:

أ- تنشيط حركة التجارة بين حوض البحر الأحمر والأراضي المجاورة. ولاسيما مع السوق الأفريقية التي بعد اتمام تكوينها تشكل تكتلاً اقتصادياً ضخماً. فافريقيا من أغنى قارات العالم في المواد الخام ومصادر الطاقة الكهربائية والنفطية. فضلاً عن موقعها المتوسط بين قارات العالم والقدرة الاستهلاكية لسكانها الذين يزيدون على ٥٠٠ مليون نسمة. وستكون هذه السوق الأفريقية



بتكامل عناصرها الاقتصادية أقوى منافس لكل التكتلات الاقتصادية الأخرى.

ب- تنشيط حركة السياحة بأنواعها المختلفة من:

- ١- سياحة لزيارة الأماكن الدينية المقدسة.
- ٢- سياحة لزيارة المعالم التاريخية ذات الشهرة العالمية.

٣- سياحة للاستمتاع بالمظاهر الطبيعية الجميلة المتنوعة من شواطئ رملية مع شمس ساطعة طول العام ومياه دقيئة للغطس والسباحة وتسلق على الجبال واستمتاع بالمياه المعدنية وشفاء بها.



## الفصل العاشر

### اريتريا وحوض البحر الأحمر



## أريتريا وحوض البحر الأحمر

### المحتويات

#### القسم الأول

### أريتريا أرضا وشعبا دراسة تحليلية لمقوماتها الجغرافية

#### مقدمة

- أ- إلى أي حد تؤثر أوضاع الزراعة على النمو الديموغرافي.
- ب- آثار التغيرات السكانية على الانتاج الزراعي.

١- الزراعة البدائية المتنقلة.

٢- الزراعة البدائية المستقرة.

٣- الزراعة الكثيفة للاستهلاك المحلي.

٤- الزراعة الواسعة التجارية.

#### الموقع الجغرافي

- أ- أهمية الموقع الجغرافي بين مضيق باب المندب وقناة السويس على جانبي البحر الأحمر جنوبا وشمالا مما جعل أريتريا تشرف على أهم طريق تجاري عالمي ما بين المحيط الهادي والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
- ب- الموقع الجغرافي والهجرات البشرية.

ج- الموقع الجغرافي وتطور الاستعمار الأجنبي.

### القسم الثاني

### مظاهر السطح

#### مقدمة

المد الأخدودي وظاهرته التضاريسية

- ١- ظاهرة الأحواض البحرية.
- ٢- ظاهرة البحيرات والأحواض الداخلية.
- ٣- ظاهرة المرتفعات والمدرجات الاخدودية.

- ١- السهل الساحلي الشرقي.
- ٢- إقليم الهضبة.
- ٣- التقطع النهري.
- ١- خور بركه.
- ٢- خور القاش.
- ٣- نهر سينيت.
- ٤- شبكات الأودية الجافة.
- أ- نطاق الدلتاوات المروحية الموازي لساحل البحر الأحمر.
- ب- نطاق الدلتاوات المروحية عند مقدمات الهضبة الأريترية.

### القسم الثالث

## الأقاليم المناخية والنباتية وتنوع أنماط التربة

### مقدمة

#### نظم الأمطار الرئيسية:

- أ- أمطار صيفية ما بين يونيه الى سبتمبر على الهضبة التي تشكل امتدادا لهضبة الحبشة بأطوارها الموسمية الصيفية.
- ب- أمطار شتوية ما بين ديسمبر الى مارس على طول السهل الساحلي للبحر الأحمر بسبب الرياح الشمالية الشرقية العابرة لمياه البحر الأحمر.
- ج- أمطار دائمة على طول الحافة الاخدودية المطلة على البحر الأحمر لموقعها الجغرافي بين نظامي المطر المشار اليهما سابقا.

#### ١- إقليم شبه جاف:

- على طول السهل الساحلي للبحر الأحمر. فالغطاء النباتي شبه صحراوي.
- أ- نباتات حوليه قصيرة الأجل مثل البلبونج والشعير البري والخرذل.
  - ب- نباتات معمرة تقاوم الجفاف مثل البلوز وشجر الأكاشيا.

## ٢- إقليم صحراوي جاف:

ممثلاً في صحراء دنكاليا في السهل ما بين الشريط الساحلي ومقدمات هضبة أريتريا الداخلية. والحياة النباتية فقيرة جداً وتتكون من

أ- نباتات قصيرة العمر جداً تنتهي دورة حياتها في أقل من شهر عقب الأمطار.

ب- نباتات خازنة للمياه مثل الصبير Cactus.

ج- نباتات شجيرية قصيرة تمتد جذورها نحو المياه الجوفية كالسنط.

## ٣- إقليم مناخ معتدل ممطر على مدار السنة:

وتمتد على طول الحافة الاخدودية الجبلية وتنحدر سلمياً نحو السهل الساحلي شرقاً والهضبة الأريتيرية غرباً. بمعدل أمطار أكثر من ألف ملمترا سنوياً. وتنتشر الأشجار التي تتأثر بينها شجيرات من أنواع مختلفة. وفي مقدمة الثروة الغابية تأتي أشجار السنط الجبلي والبن والموز والزيتون البري ومن أهم مشاكل هذا الإقليم:

أ- مشكلة الرعي الجائر للحشائش البرية بين الأشجار والشجيرات.

ب- مشكلة التمدد في قطع الأشجار دون استقراغ البديل لها.

ج- مشكلة تعرية التربة كنتيجة طبيعية للمشكلتين المشار إليهما مما أدى إلى انكماش المساحة الغابية.



#### ٤- إقليم مداري داخلي وحشائش السفانا:

على الهضبة التي تمتد بين هضبة الحبشة وهضاب شرق السودان وتتراوح الأمطار الموسمية الصيفية ما بين ٣٧٥ مم في الشمال الى أكثر من ٦٥٠ مم حتى باقي الاقليم. ويطول فصل الجفاف ما بين خمسة الى ثمانية أشهر ويتميز بشدة جفافه. والمظهر النباتي السائد هو حشائش قصيرة تتخللها شجيرات متأثرة في شمال الهضبة. بينما تسود سفانا السنط الطويلة بين أشجار شوكية ومقاطحة القمة في باقي الاقليم. ومن أهم أنواع السنط شجر الهاشاب وشجر الطلح. وتُحترق أو تجف الحشائش في فصل الجفاف ويسود الفقر في الاقليم. وفي بطون الأودية تنتشر أشجار البوباب والدوم والزيتون البري وبعض الحشائش لوفرة المياه الجوفية.

هذا التباين الجغرافي تضاريسيا ومناخيا ونباتيا أدى الى تباين أنماط التربة التي تخضع في تصنيفها للعوامل الأتية:

- أ- تنوع الاشتقاق الصخري.
- ب- انتشار الأودية النهرية وشبكات الأودية الجافة.
- ج- انتشار البحيرات والسبخات الشاطئية والدخلية.
- د- تباين توزيع الأمطار وتذبذب سقوطها.
- هـ- التباين في التوزيع الحراري وفقا للموقع الجغرافي ومدى الارتفاع.
- و- النشاط البشري التكنولوجي.

### أنماط التربة الرئيسية:

- ١- التربة الرسوبية الفيضية النهرية.
- ٢- التربة السبخية الجيرية.
- ٣- تربة الجزر الشاطئية.
- ٤- تربة للكتبان الرملية.
- ٥- التربة المفتتة محليا.
- ٦- تربة الأودية والندلات الجافة.
- ٧- التربة البركانية.

### القسم الرابع

#### السكان والنشاط الاقتصادي

- ١- نمو السكان:
- ٢- هجرة السكان.
- ٣- أنماط الهجرة.
- أ- هجرة موسمية.
- ب- هجرات قصيرة الأجل.
- ج- الهجرات الدائمة.
- ٤- الملكية الزراعية وحيازة الأرض.
- ٥- تطور النشاط الزراعي في فترتي الاحتلال الإيطالي والبريطاني:
- ١- موارد أريتريا.
- ٢- حاجات أريتريا.
- ٣- الجهود التي بذلت والأساليب التي استخدمت حتى تتناسب الموارد مع الخامات.

- ٤- الأرض والموارد الطبيعية.
- ٥- الزراعة وأنواع الملكية الزراعية.
- ٦- الثروة المعدنية والطاقة في فترتي الاحتلال الإيطالي  
والبريطاني:  
أ- المناجم.  
ب- مصادر الطاقة.

### القسم الخامس

أريتريا ونشاطها الاقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية  
الى فجر الاستقلال (ابريل ١٩٩٣)

- ١- مقدمة.
- ٢- الزراعة والثروة الحيوانية.  
أ- زراعة المحاصيل الرئيسية.  
ب- المشكلات الزراعية.  
١- تعرية التربة.  
٢- اجهاد التربة.  
أ- التوسع في زراعة البقوليات.  
ب- نظام تتابع المحاصيل.  
٣- ارتفاع نسبة الأملاح.  
ج- الثروة الحيوانية.  
١- مناطق الرعي الرئيسية.  
٢- مشكلات تربية الثروة الحيوانية.  
٣- النمو الصناعي ومشكلاته.  
أ- تطور النمو الصناعي.  
ب- الصناعات الأريترية وتاريخ نشأتها وارتباطها بالمعادن الرئيسية.  
ج- المواصلات وارتباطها بمظاهر السطح.  
د- التقسيم الإداري



## القسم الأول أريتريا وحوض البحر الأحمر دراسة تحليلية لمقوماتها الجغرافية

### مقدمة:

منذ أمد بعيد أهتم رجال الاقتصاد بتجاهات المجتمعات البشرية مركزين أساساً على مشكلة جوهرية تتمثل في العلاقة المتبادلة بين نمو السكان والأمن الغذائي، وتتأقش هذه المشكلة من زوايتين:

- أ- إلى أي حد تؤثر أوضاع الزراعة على النمو الديموغرافي.
- ب- آثار التغيرات السكانية على الإنتاج الزراعي.

وهنا نشير إلى رأي مalthus ولتباعه أن نمو السكان مرتبط بمدى توفير الغذاء. وأي اضطراب في الأمن الغذائي قد يؤدي إلى حدوث مجاعة تهدد النمو السكاني وتغير مجراه (كما حدث في السنوات الأخيرة في أريتريا والقرن الأفريقي)، إلا أن مalthus قد بالغ كثيراً في جعله أن الغذاء هو أساس نمو السكان. بل يبدو أن النمو السكاني هو المتحكم الأول في نمو الإنتاج الزراعي وتطوره. والنمو السكاني السريع عقب الحرب العالمية الثانية لم يفسر بنمو للإنتاج الزراعي فقط بل توجد عدة عوامل أخرى هلمه جداً ومنها تحسين المستوى الصحي للسكان والتقدم التكنولوجي المتطور في مجالات الصناعة ونمو شبكات النقل على المستوى العالمي، مما أدى إلى تغيير جوهرى في البناء الاجتماعي للمجتمعات البشرية.

وقد توجد عوامل مضاده تعرقل بطبيعة الحال النمو الاقتصادي وما يترتب عليه من تراجع في نمو السكان واضطراب في حياتهم كالكوارث الطبيعية وكذلك التدخل الأجنبي الاستعماري وخير مثال على ذلك ما كان يحدث في شرق إفريقيا وإسبانيا والصومال وأريتريا في ظل الاستعمار الأجنبي. هذا ويلاحظ أن النمو السكاني في الدول المتقدمة قد صاحبه تغيير في أنماط الزراعة، سواء من حيث مدى التخصص في الإنتاج من ناحية أو مدى إدخال التقنية الحديثة من ناحية أخرى. وهذه الظاهرة تبدو ضعيفة في دول العالم الثالث وإسبانيا على المستوى الإفريقي. كذلك نلاحظ أن التوسع الزراعي الأفقي كان كبيرا في العالم الجديد وما يترتب عليه من تقدم في الزراعة التجارية الواسعة وتنشيط حركة تجارة فائض الإنتاج. وهذه الظاهرة تقريبا لا وجود لها في الدول القديمة الزراعية حيث الغذاء يوجه إلى الاستهلاك المحلي بل ويستورد بعضا منه كالقمح والحبوب.

ويجب أن نفرق على المستوى الإقليمي بين أنماط الزراعة ومدى النمو السكاني والكثافة السكانية وذلك على النحو الآتي:

- ١- الزراعة البدائية المتنقلة وتظهر في بقاع متناثرة في الغابات الاستوائية الكثيفة التي يغطيها بعض الأحواض النهرية مثل حوض الكنفو وحوض الأمزون حيث الكثافة السكانية منخفضة في ظل تخلف اقتصادي كبير.
- ٢- الزراعة البدائية المستقرة وتنتشر في مناطق المناخ الموسمي الحار - مثل السودان الجنوبي والمناطق الداخلية من جزر أندونيسيا. وهذه في دور الانكماش التدريجي.
- ٣- الزراعة الكثيفة للاستهلاك المحلي وهي أوسع الأنواع انتشاراً. ولاسيما في العالم الثالث. وتتوكل مع ضغط سكاني شديد في كثير من المناطق ولاسيما في الأودية النهرية مثل وادي النيل الأدنى وأودية الشرق الأفريقي.
- ٤- الزراعة الواسعة التجارية ولاسيما في غرب أوروبا والعالم الجديد. وهي مناطق الزحف الزراعي الحديث حيث الوفرة في فائض الانتاج للتصدير. وهي مناطق ليست مزدهرة بالسكان.

وهنا نشير أن التقنية الحديثة آخذة في الانتشار في أراضي الزراعة الكثيفة والزراعة الواسعة ولاسيما استخدام الدورات الزراعية والتقنين المائي في الري مع الأسمدة المناسبة والتوسع في شبكات صرف المياه. وعلى مستوى العالم القديم تنتشر هذه الظاهرة في حوض البحر المتوسط والجنوب والشرق الآسيوي. وبدأت تنتشر هذه الظاهرة في الشرق الأفريقي مع الاستقرار السياسي التدريجي في السودان وأريتريا ومدغشقر. والارتباط وثيق بين هذه التقنية الحديثة والنمو السكاني.

وفي دراستنا لمدى الارتباط بين النمو السكاني وأستثمار الأراضي يجب أن نشير الى أن المشكلة الجوهرية تكمن في الى أي حد ترتبط اقتصاديات التغير السكاني بظاهرة الاستقرار الاقتصادي والسياسي للأقليم أو بعبارة أخرى الى أي حد يطمئن المالك على أرضه ولتأجه. ومعنى هذا أن الاستقرار سياسيا واقتصاديا يشكل عاملا من أهم العوامل في مدى النمو الاقتصادي وما يرتبط به من نمو السكان جغرافيا وديموغرافيا في أي اقليم من الأقاليم. وهذه الحقيقة الهامة تنطبق تماما على اقليم أريتريا والقرن الأفريقي فعلم الاستقرار السياسي و الاضطرابات الداخلية في الفترة الأخيرة أدى الى الاضمحلال الاقتصادي والتفكك السكاني وما ترتب عليه من توالي الهجرة الخارجية.١.



وأريتريا التي أخذناها في هذه المقدمة كمثال رئيسي لمدى الارتباط بين التطور الاقتصادي والنمو السكاني تشكل اقليما في الشرق الافريقي يمتاز بشخصية جغرافية متكاملة في ظل المقومات الأتية:


- ١- موقع جغرافي استراتيجي مطلا على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
- ٢- تكامل تضاريس بين السهل الساحلي والمرتفعات الداخلية.
- ٣- تباين في الأقاليم المناخية وأثره على تنوع الغطاء النباتي وتنوع الانتاج الزراعي والرعي.
- ٤- التوزيع السكاني ومدى ارتباطه بالنمو الاقتصادي والتطور السياسي للأقاليم.
- ٥- شبكات الطرق وارتباطها بنشأة المدن والموانئ الرئيسية.

### المقومات الجغرافية

#### أولا: الموقع الجغرافي:

تقع أريتريا بمساحتها الصغيرة التي تتمثل في نحو ١٩٩ ألف كيلومتر مربع (٥٠٠,٠٠٠ ميل مربع) مطلة على القسم الجنوبي من حوض البحر الأحمر في الشرق الافريقي ما بين خط عرض ١٨° شمالا وحتى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حيث مضيق باب المنذب الذي يربط ما بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. وتحدها جنوبا بجيبوتي وغربا بأثيوبيا أو هضبة الحبشة وشمالا وشمالا بغرب بالسودان. وهي في هذا الموقع

الاستراتيجي الدقيق في ظل العروض المدارية الحارة تطل على البحر الأحمر بساحل يصل طوله الى نحو ١٠٠٠ كيلومترا. أمام هذا الساحل تنتشر مجموعات من الجزر أهمها وكبرها جزيرة "دهلك كبير" أمام ميناء مصوع. كما أن هذا الساحل يمتاز بعدد كبير من الخلجان المتعمقة في السهل الساحلي مما أدى الى خلق عدد كبير من موانئ الصيد البحري وأهمها ميناء مصوع وهو الميناء الأول للأريتريا متوسطا الشريط الساحلي وكذلك ميناء عصب عند الطرف الجنوبي لهذا الساحل مشاركا في الاشراف على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر من جانبه الافريقي أمام ميناء عدن المطل على هذا المضيق من جانبه الآسيوي. وميناء عصب الذي يمر به خط عرض ١٣° شمالا يفصله عن الساحل الآسيوي للبحر الأحمر مسافة ٢٨ ميل. وهو يساهم مع ميناء مصوع في استقبال حركة التجارة لجنوب حوض البحر الأحمر فضلا عن وجود مصفاة لتكرير النفط وخدمات البواخر والخطوط الملاحية ما بين المحيط الهندي وقناة السويس.



وهنا نشير الى أن موقع مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر وموقع قناة السويس الى الشمال منه جعل هذا البحر مع البحر المتوسط أهم ممر تجاري في العالم مما رفع قيمته التجارية لكل موانئ البحرين، بفضل هذا الطريق الملاحي العالمي الذي يمتد من شرق آسيا في المحيط الهادي عابرا المحيط الهندي عند ميناء سنغافوره ثم يمر بمدخل البحر الأحمر عند مضيق باب المندب ويعبر البحر الأحمر مارا بقناة السويس ثم يخترق مضيق جبل طارق متشعبا الى ثلاث شعب رئيسية تتمثل في شعبه تتجه نحو الشمال الأوروبي والثانية عبر المحيط الأطلسي الى أمريكا الشمالية والثالثة تخترق قناة بنما الى المحيط الهادي وغرب الأمريكتين. وتجدر الإشارة الى ابراز أهمية حركة نقل النفط عبر قناة السويس فالمسافة بين لندن والكويت عبر طريق جنوب افريقيا تبلغ ١٣٤٣٧ ميلا تنقص الى ٧٤٨٨ ميلا بطريق قناة السويس والبحر الأحمر فلا مجال للمنافسة بين الطريقين<sup>١</sup>.

الموقع الجغرافي لأريتريا والأقاليم المجاورة وارتباطه بتنوع مظاهر السطح  
ومن هذه الزاوية تظهر الخريطة ما يأتي:

- ١- موقع أريتريا مطلا على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
- ٢- المجموعات الجزرية أمام سواحل البحر الأحمر الجنوبي وأهميتها استراتيجية واقتصادية.

١- د. محمد ابراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض

ب- البحر المتوسط، الاسكندرية ١٩٨٩، ص ٤٩٩

Librairie Generale Francaise: Atlas de Poche

الطبعة السابعة ١٩٧٦ ص ١٢٠-١٢١

- ٣- التكامل التضاريسي بين السهول والمرتفعات والتقطع النهري.
- ٤- مواقع المدن الرئيسية وارتباطها بشبكات الطرق.<sup>١</sup>

وهذا الموقع الجغرافي الممتاز استراتيجيا واقتصاديا هو الذي جلب الهجرات البشرية إلى إقليم أريتريا منذ ما قبل التاريخ فتقدمت موجات السكان من السودان شمالا بدمائها التي تنتمي إلى جنس البحر المتوسط كما زحفت جماعات زنجية وحامية من لواسط أفريقيا وهضبة الحبشة. واختلطت هذه الدماء مكونة سكان أريتريا في تعاون مستثمرين أرض بلادهم حتى بلغوا نحو ثلاثة ملايين نسمة.<sup>٢</sup>

الآن هذا الموقع الجغرافي الهام هو أيضا الذي جاذب الاستعمار الأجنبي إلى الإقليم منذ فجر التاريخ حتى الوقت الحاضر فاسم "أريتريا" مشتق من الاسم اليوناني القديم للبحر الأحمر "سينوس ارتريوس".<sup>٣</sup> فقد امتد النفوذ المصري منذ

<sup>١</sup> د. عبدالمرشد عزلوي وآخرون: لطلس سوريه والعالم ص ٦٢

<sup>٢</sup> د. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط، الاسكندرية ١٩٨٩ ص ٤٩٥ وما بعدها

<sup>٣</sup> جبهة التحرير الأريتريّة: موجز تاريخ أريتريا الحديث ١٩٨٨ ص ٧

العصر البطلمي وتلاه الفرس والرومان. واستمرت غزوات الحبشة بين وقت وآخر للنهب والسلب من الامارات الوطنية<sup>١</sup>

وتحت ذريعة حماية الكنيسة الأثيوبية سيطرت البرتغال على شواطئ أريتريا عام ١٥٢٠م في ظل التوسع الاستعماري والكشوف الجغرافية أتته من الجنوب الافريقي بحرا الى مضيق باب المندب في مدخل البحر الأحمر الجنوبي. ووصلت البرتغال الى هضبة الحبشة .

وأمام توسع الامبراطورية العثمانية وقعت معارك عنيفة بين البرتغال والعثمانيين انتهت بطرد البرتغال وانتشار النفوذ الاستعماري العثماني في عام ١٥٥٧م . ومنذ ضعف الامبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر تخلت عن أريتريا للحكم المصري من ١٨٦٥ الى ١٨٨٥.

وظهرت إيطاليا في ظل الاستعمار الأوروبي فاحتلت الأراضي الأريتيرية عام ١٨٩٠ احتلالا كاملا. وقد تصاعد الرفض الجماهيري لهذا الاستعمار الاجرامي اذ استولى المستعمر على كل مصادر الثروة القومية للأهالي.

وبهزيمة المحور في الحرب العالمية الثانية دخلت بريطانيا الى أريتريا عام ١٩٤١. واستمر الاحتلال البريطاني حتى عام ١٩٥٠. وقد بدأ ينمو النفوذ الاستعماري الأثيوبي مدعما من كل من بريطانيا وأمريكا. وقد انتشرت الفوضى والنهب والسلب في

<sup>١</sup> عبدالقادر جيلاني أريتريا القصية والتحدى ١٩٨٨ ص ٦٣ وما بعدها

ظل التدخل الأثيوبي كما صيفت العباسر الوطنية لحركة المقاومة الوطنية.

وبعد انسحاب بريطانيا نتيجة لشدة المقاومة الشعبية قررت الأمم المتحدة نظام الحكم الفيدرالي بين إثيوبيا وأريتريا في عام ١٩٥٠. وقبل هذا القرار قد طلبت المنظمة الدولية من إيطاليا التعبير عن رأيها حول مستقبل أريتريا<sup>١</sup> وأن تزود لجنة التحقيق بما تعتقد أنه مفيد من المعلومات المكتسبة خلال إدارتها المباشرة للأريتريا لنحو ٧٠ عاما. وقد أبدت إيطاليا اهتماما كبيرا فهي التي حكمت أريتريا لفترة طويلة كما أن الشعب الأريتري يضم بينه الآلاف من الإيطاليين والمنحدرين من سلالات إيطالية عاشت في هذه البلاد. وأكدت أن رغبة الشعب الأريتري في تقرير مصيره يجب أن تكون موضع احترام تام. كما أكدت أيضا حماية المصلحة المشتركة بين أريتريا وإثيوبيا ليعيش الشعبان في سلام. كما أوضحت إيطاليا ضرورة بقاء أريتريا كقطر قائم بذاته بفضل التكامل الجغرافي الكبير بين المرتفعات والمنخفضات حيث يقوم سكان المرتفعات بالزراعة الموسمية في الأراضي المنخفضة لسد النقص في محاصيل مناطقهم الجبلية الوعرة فضلا عن الرعي في السهول الواسعة مما يقوي التكامل الاقتصادي بين السكان في أريتريا الموحدة.

وقد عارض الشعب الأريتري قرار الأمم المتحدة مطالبا بالاستقلال وقد نص القرار الاممي أن تتمتع أريتريا باستقلالها الذاتي في إطار الاتحاد مع إثيوبيا فيكون لها دستورها الخاص

<sup>١</sup> جبهة التحرير الأريترية: موجز تاريخ أريتريا الحديث - مرجع سابق - ص ٧٥ ومابعد

وعلمها ومجلسها الشعبي التشريعي وحكومتها الخاصة بالإضافة إلى حكومة اتحادية تهتم بالدفاع والشؤون الخارجية والنقد والتجارة الخارجية والمواصلات. والرجوع إلى المنظمة الدولية في حالات الاختلاف. ودخل القرار حيز التنفيذ في عام ١٩٥٢. ولكن أثيوبيا لم تنقيد بينود القرار الأممي بل بدأت تلغي هذه البنود تدريجيا. فأوقفت صحف المعارضة وحلّت الأحزاب السياسية واتحاد نقابات العمال. وألغت اللغتين الرسميتين وهما العربية والتجريدية وانزلت العلم الأريتري عام ١٩٥٨ دون تحرك من الأمم المتحدة.

وفي عام ١٩٦٢ أنهت أثيوبيا النظام الفيدرالي إلا أن الشعب الأريتري تحدى هذا الضغط الاستعماري واتجه نحو المقاومة السرية. ففي عام ١٩٥٨ تأسست نواه حركة تحرير أريتريا من العمال الأريتريين في السودان. ووجدت تجاوبا واسعا في أريتريا، بين الأهالي متجاوزين خلافاتهم الدينية التي كانت تثيرها أثيوبيا للفرقة بين السكان. وكانوا أكثر وعيا في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية من أهالي أثيوبيا في ظل نظام امبراطوري اقطاعي يشبه نظام الاقطاع في أوروبا في العصور الوسطى.

وأستخدمت أثيوبيا أقصى انواع الضغط الاستعماري بقتل الأهالي وحرق مزارعهم وتشريدهم فقد نشردهم وهاجر إلى السودان أكثر من ١٥٠ ألف من السكان.<sup>١</sup>

<sup>١</sup> جبهة التحرير الأريتريّة: موجز تاريخ اريتريا الحديث - مرجع سابق - ص ٥٨ وما بعدها، ص ٦٤ وما بعدها

واستمرت هذه الظروف السيئة في ظل الحكم العسكري الذي أطاح بالنظام الاميراطوري في عام ١٩٧٤ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية<sup>١</sup>. الا أن انتشار الجفاف في أثيوبيا ضاعف من التدهور الاقتصادي فانكمش النفوذ الأثيوبي في أريتريا وأصبحت جبهة التحرير تسيطر على البلاد، وفي انتظار قرار هيئة الأمم المتحدة باجراء الاستفتاء الشعبي لتقرير مصير أريتريا السياسي<sup>٢</sup>. وبفضل موقعها الجغرافي تتمتع أريتريا بمقومات الدولة ممثلة في التكامل الاقتصادي بين سهولها ومرفعاتها، التماسك السكاني، ونمو العلاقات التجارية والاقتصادية مع العالم الخارجي، وحسن الجوار مع جيرانها.

### القسم الثاني مظاهر السطح

#### ثانيا: مظاهر السطح:

فالقلم أريتريا لموقعه مطلا على البحر الأحمر يشكل جزءا من الحدود الأفريقي العظيم الذي يمتد في الشرق الأفريقي ما بين وادي نهر زمبيزي جنوبا الى شبه جزيرة سيناء شمالا ويواصل امتداده في الغرب الآسيوي المطل على البحر المتوسط مخترقا وادي نهر الأردن وسهل البقاع بجانيه ومرفعات لبنان الشرقية والغربية حتى جنوب هضبة الأناضول.

<sup>١</sup> جبهة التحرير الأريتريّة: موجز تاريخ أريتريا الحديث - مرجع سابق - ص ٥٨ وما بعدها، ص ٦٤ وما بعدها

<sup>٢</sup> آتم الاستفتاء الشعبي بأشراف الأمم المتحدة في أبريل ١٩٩٣ وأصبحت أريتريا دولة مستقلة ذات سيادة (جريدة الأهرام ٢٥ أبريل ١٩٩٣)



والأخدود العظيم في قسمه الأفريقي يواصل مسيرته مخترقاً  
هضبة الحبشة وحوض البحر الأحمر إلى خليجي العقبة  
والسويس على جانبي شبه جزيرة سيناء شرقاً وغرباً نحو  
الشمال. وذلك منذ أواخر الزمن الثاني وطوال الزمن الثالث  
معاصراً المد الألباني الجبلي العظيم في حوض البحر المتوسط  
والخليج العربي الآسيوي. وقد تأثر كل الشرق الأفريقي والغرب  
الآسيوي بهذا المد الأخدودي الكبير الذي أدى إلى خلق  
الظواهرات الجغرافية الأتية:

#### ١- ظاهرة الأحواض البحرية:

ممثلة في البحر الأحمر بفرعيه الرئيسيين وهما خليج العقبة  
وخليج السويس بالإضافة إلى الخلجان المنتشرة في السهول  
الساحلية على الجانبين الأفريقي والآسيوي متعمقة في الداخل  
فأدت إلى خلق موانئ مهمة مثل مصوع وعصب في السهل  
الأريتري وكذلك ميناء جده بالسعودية وميناء الحديدة وعدن  
باليمن. وأمام هذه الخلجان انتشرت المجموعات الجزرية  
الساحلية الهامة. وقاع البحر الأحمر يشكل الجزء المنخفض  
العميق من هذا الأخدود الأفريقي المركب حيث نتجه الانكسارات  
في خطوط متشعبة وانخفضت الأجزاء العميقة وارتفعت  
الجوانب على شكل مرتفعات أخدودية.

١

L. King: The Morphology of the Earth - London ١٩٦٧ - P. ٨٢. -١

٩١

ب- A. K. Wells and J. F. Kirkaldy: Outline of Historical Geology -

London ١٩٦٦ - P. ٤٥٥-٤٦٨

كما أن الخليج العربي الآسيوي هو الآخر تأثر بهذا المد الأخدودي فهو يمتد بين كتلتين قديمتين ترجعان إلى الزمن الجيولوجي الأول وهما الكتلة العربية الأفريقية غربا والكتلة الإيرانية الآسيوية شرقا. وقد تصدعت هذه الكتلة الضخمة كرد فعل للمد الأخدودي الألبى فهبط الجزء الأوسط للضعيف ممثلا في الخليج العربي. وفي الزمن الرابع تشكلت التضاريس على جوانب هذه الأحواض البحرية. وهنا نشير إلى ما تمتاز به هذه الأحواض البحرية من مضائق هامة ممثلة في مضيق باب المندب بجنوب البحر الأحمر ومضيق هرمز بالخليج العربي. كما أن قناة السويس تشكل مدا صناعيا في لسان منخفض شمال خليج السويس ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بحيث وصلت مياه المحيط الهندي الداكنة إلى مياه البحر المتوسط المعتدلة مما أثرى الثروة البحرية السمكية.<sup>١</sup>

## ٢- ظاهرة البحيرات والأحواض الداخلية:

فالأخدود الأفريقي العظيم في امتداده الضخم بالشرق الأفريقي يمتاز بأن قاعه موجا في انحداره العام نحو الشمال مما أدى إلى تكوين بحيرات في الأجزاء الأكثر انخفاضاً مثل بحيرة مالوي. وإلى الشمال منها ينشعب الأخدود الأفريقي إلى شعبتيه الكبيرتين الشعية الغربية التي تمتد شمالاً نحو هضبة إفريقيا الاستوائية وتنتهي عند جنوب السودان. وتخفض عن هذا المد الأخدودي في فرعه الغربي هبوط حوض الكونغو والسودان

١. د. محمد متولي: حوض الخليج العربي - الجزء الأول - القاهرة ١٩٧٨ - من ص ٧٩ - ص ٨٢

ب. د. الهادي لؤلؤة، د. محمد الأعور: الجغرافيا البحرية - ١٩٨٧ - طرابلس (ليبيا) - من ص ١٢٠ إلى ص ١٢٣

الجنوبي<sup>١</sup>، وتصدعت الهضبة الاستوائية فهبط جزؤها الأوسط مكونا بحيرة فكتوريا التي ينبع منها نهر النيل. كما تكونت في الأجزاء المنخفضة من الفرع الغربي الأخدودي بحيرة تتجائقا وبحيرة عيدي وبحيرة موبوتو بفضل الأمطار الغزيرة الدائمة الاستوائية. ويلاحظ أن كل مناطق الهبوط المشار إليها كانت أجزاء من الهضبة الأفريقية فالتشابه تام في البنية ما بين مرتفعات أريتريا وهضبة الحبشة ومرتفعات كردفان بالسودان الأوسط والمرتفعات الأفريقية الوسطى في هضبة البحيرات وحوض الكونغو<sup>٢</sup>.

ولما الفرع الشرقي وهو الرئيسي من الأخدود الأفريقي العظيم فيخترق هضبة الحبشة نحو البحر الأحمر بحيث يفرج نحو باب المندب صانعا حوضا كبيرا يضم أراضي الصومال الشمالي وجيبوتي وجنوب ووسط أريتريا حتى مدينة مصوع. وهو حوض يفتح نحو البحر الأحمر، وهو من نوع الأحواض الناقصة إذ أن جانبه الشرقي يتمثل في شريط من السهول الساحلية تتحدر نحو خليج عدن والبحر الأحمر.

### ٣- ظاهرة المرتفعات والمدرجات الأخدودية:

فهذا الأخدود الأفريقي الآسيوي يمتاز بالمرتفعات الأخدودية على جانبيه مع انتشار خطوط الانكسارات الرئيسية والجانبية. وهي تشكل الأجزاء المنخفضة إلى أعلى من التكوين الأخدودي كرد فعل للحركات الأرضية التكتونية التي أشرنا إليها.

<sup>١</sup> ج. ع. ش. أ. ع: الأطلس الوطني - مرجع سابق - ص ٩ - ١٠

<sup>٢</sup> د. محمد ابراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط

وفي اقليم أريتريا جيومورفولوجيا يمتد خطان من المرتفعات الاخدودية أحدهما ثانوي وهو الذي يقع خلف الشريط السهلي الساحلي الضيق. وأما الخط الثاني وهو الرئيسي يشكل الضلع الغربي للحوض الناقص الذي أشرنا اليه فاصلا بين هضبة أريتريا والهضبة الحبشية في قسمها الشمالي. ويبن الخطين الاخدوبيين تمتد هضبة أريتريا وقد تصدعت بهذا المد الاخدودي مما أدى الى هبوط جزئها الأوسط على شكل لسان حوضي داخلي تقع فيه بعض البحيرات وأهمها بحيرة عسل. ويمتد هذا اللسان الحوضي الى الغرب من ميناء مرسى فاطمة جنوب مصوع وفي مده نحو الجنوب يصل الى القسم الأوسط من الهضبة الأريتيرية عند بحيرة فجوجي Fgogi<sup>١٠</sup>.

وتظهر منحدرات هذه المرتفعات أحيانا على شكل مدرجات سلمية نتيجة للتعرية في المناطق الصخرية الضعيفة وهي لا تشكل عتبة في المواصلات لكثرة الممرات التي تخترقها. ونستخلص من التحليل الجيومورفولوجي لاقليم أريتريا والأراضي المجاورة الأقاليم التضاريسية الآتية:

#### ١- السهل الساحلي الشرقي:

ويمتد موازيا للحافة الاخدودية المجاورة. ويبدو السهل ضيقا في قسمه الجنوبي مطلا على مضيق باب المنذب ثم يتسع قليلا ما بين مينائي مرسى فاطمة ومصوع ليضيق مره اخرى صوب

الشمال حيث يتصل بالسهل السوداني مارا بسواكن وميناء بورسودان.

وقد قطع السهل الساحلي ببعض الأنهار القصيرة التي تتبع من الحافة الاخدودية المجاورة ثم تنحدر بسرعة نحو البحر الأحمر وهي قليلة المياه وسرعان ما تجف في فصل الجفاف. ويفسر ضيق السهل الساحلي بعمق مياه البحر الكبير أمام الحافة الاخدودية المرتفعة. وتظهر بعض الجزر الساحلية وأهمها أرخبيل دهلك أمام ميناء مصوع.

## ٢- إقليم الهضبة:

وهو يشكل امتدادا لهذا المثلث الهضبي الضخم الذي يحد بضلعي الاخدود الافريقي العظيم حيث يقع رأسي هذا المثلث الى الشرق من موقع أديس أبابا بينما تمتد قاعدته موازية للقسم الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر وكذلك الساحل الغربي من خليج عدن. والهضبة تشكل معظم أراضي أريتريا. وتنقسم الهضبة الأريتيرية في مدها الى ثلاثة أقسام:

- أ- الهضبة الوسطى وهي الأكثر ارتفاعا اذ يصل معدل ارتفاعها ما بين ٦٠٠٠ الى ٨٠٠٠ قدم.
- ب- الهضبة الشمالية الغربية وهي تنحدر تدريجيا لتندمج في سهول السودان الأوسط.
- ج- الهضبة الجنوبية الشرقية وهي الاخرى تنحدر تدريجيا لتندمج مع سهول جيبوتي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

كجزء من الاخود الافريقي العظيم فظهرت بها شبكة من الانكسارات في اتجاهات مختلفة. وهذه تحولت بعوامل التعرية المختلفة الى مجاري نهري وأودية جافة.

### ٣- التقطع النهري:

ان دراسة التطور الجيومورفولوجي تلقي الضوء على التباين التضاريسي ولاسيما من زاوية التقطع النهري على طول شبكات الانكسارات التي تكونت قديما بسبب الحركات التكتونية ثم تحولت الى مجاري نهري في العصر المطير بالزمن الرابع الجيولوجي.

ففي أواخر الزمن الجيولوجي الثاني (العصر الكريتاسي) كان بحر تيتيس القديم (Tethys) يفصل بين كتلتين كبيرتين هما قاره جندوانا جنوبا والكتلة الأوراسية والأمريكية شمالا. وكان قاع هذا البحر مكونا من صخور أقل صلابة جيرية طباشيرية من مخلفات الأحياء البحرية في سمك كبير. وقد تأثرت هذه الرواسب البحرية بحركات أرضية عنيفة فالتوت مكونة ثنيات مقعرة وأخرى محدبة ممثلة في السلاسل الجبلية الألبية. واستمرت هذه الحركات الأرضية طول الزمن الثالث وفي نفس الوقت أخذ الاخود الافريقي الآسيوي العظيم في النمو والتكوين على النحو الذي شرعناه سابقا.

<sup>١</sup> د. محمد صبحي عبدالحكيم وآخرون: الوطن العربي أرضه وسكانه وموارده - ص ١٤ وما بعدها

وهكذا وقع اقليم أريتريا والأراضي المجاورة تحت تأثير مزيج يتمثل في التكوين الاخدودي من ناحية ونمو سلاسل الألب الأطلسية بالشمال الاريقي من ناحية اخرى مما أدى الى بعض التكوينات البركانية وحركات الهبوط والارتفاع.

وفي الزمن الرابع ولاسيما عصر البلايستوسين فقد ظهرت فترات المطر التي عاصرت فترات الجليد الأوروبية وذلك في الشمال الاريقي. وعكس هذا نجده في النطاق الاريقي الجنوبي الذي يمتد الى الجنوب من خط عرض ٢٠° شمالا محتضنا الأراضي الأريتريّة وما جاورها حيث سادت ظروف مناخ السفانا الفصلية المطر منذ أواخر الزمن الثالث (عصر البلايوسين) واستمرت حتى مشارف الزمن الرابع (عصر البلايستوسين). ومع بداية أوائل الزمن الرابع شاع الجفاف واستمر. ولا تظهر الرطوبة والأمطار مره اخرى الا في اواخر عصر البلايستوسين. ثم في العصر الحجري الحديث وما بعده. ومعنى هذا أن التعرية النهرية وتحويل الخطوط الانكسارية الى مجاري مائية استمرت منذ أواخر الزمن الثالث ونشطت في الزمن الرابع وحتى العصر الحجري الحديث وما بعده حتى ظهرت الشبكات المائية بصورتها الحالية. ونناقش المجاري النهرية وشبكات الأودية في أريتريا على النحو الآتي:

١ جوده حنين جوده: ابحاث في جيورفولوجيه الأراضي الليبية - العصر المطير في ليبيا (مع دراسة مقارنة) - من منشورات الجامعة الليبية - كلية الآداب - ١٩٧٣ ص ١٦ وما بعدها

٢ أ. راجع الخريطة الطبوغرافية عن مظاهر السطح والتقطع النهرى ومرجعها د. عبدالمرشد عزاي و آخرون: أطلس سورية والعالم ص ٤٨  
ب. خريطة افريقيا والوطن العربى - من منشورات دار القلم - القاهرة - الطبعة الأولى ١٩٦٢ - مقياس الرسم ١: ٨,٥٠٠,٠٠٠

## ١- خور بركة:

وهو من الأنهار الموسمية ويبدأ بالقرب من مدينة حميرتي في محافظة حماسين قريبا من اسمره العاصمة. ويصل طوله الى ٦٣٠ كيلومترا في اتجاه عام نحو الشمال مخترقا الهضبة الأريتيرية الشمالية الى سهول السودان الشرقية وينتهي بدلتا عند بلدة طوكر السودانية المطلة على البحر الأحمر. وتمتد غابات من أشجار الدوم على جانبيه وهو في طريقه يمر بمدينة أغردات عاصمة محافظة بركة. وينضم اليه وادي عنسبه الذي يمر بمدينة كرن عاصمة محافظة كرن. وهو الرافد الرئيسي لخور بركة. ويروي مزارع الموز والفواكه المدارية والخضروات والألياف النباتية<sup>١</sup>.

## ٢- خور القاش:

ويبدأ منابعه قرب اسمره العاصمة حيث يسمى بنهر مارب ثم يجري في خانق انكاساري اخنودي يتقوس صوب الجنوب ثم ينثني نحو الشمال الغربي مخترقا هضبة أريتريا الوسطى صوب سهول السودان حيث ينتهي بدلتاه عند مدينة كسلا التي تقع شرق السودان على خط عرض الخرطوم. وخور القاش هنا يجري موازيا لنهر عطبرة أحد روافد النيل في السودان الأوسط. وينحدر في أراضي السفانا السودانية وهو نهر موسمي. ويشبه في تطوره الجيومورفولوجي نهر النيل الأزرق. وعلى طول مجراه الذي يصل الى نحو ٤٤٠ كيلومترا يجري النهر في أراضي رسوبية غنية بتربته الخصبة وامطارها الصيفية. وبعد

١ عثمان صالح: تاريخ أريتريا - الطبعة الثالثة ١٩٧٧ ص ٢٣٣ و منابعها



أن يترك النهر خانقه الانكساري يجري على هضبة منخفضة وسط حشائش السفانا الحاره في اقليم غني بالمراعي.

### ٣- نهر سيتيت:

ويسمى في أثيوبيا بنهر تكازي وفي السودان بنهر عطبرة. وهو النهر الوحيد في أريتريا الدائم الجريان. وينبع من الهضبة الوسطى الأريتيرية الى الجنوب من اسمره متجها في تقوس اخدودي عميق صوب الجنوب الغربي ويهبط من ارتفاع ٧٠٠٠ قدم الى ٢٥٠٠ قدم في اقليم الهضبة الوسطى ثم ينتهي صوب الشمال الغربي على طول الحدود بين أريتريا وأثيوبيا مارا ومجاورا لقمة رأس داشان الجبلية وهي أعلا قمم الهضبة الأثيوبية بارتفاع يصل الى ٤٧٢٠ متر. ويستمر في اتجاهه الشمالي الغربي مخترقا السودان الأوسط بأسم نهر عطره حيث ينتهي الى النيل السوداني عند مدينة عطبره التي تقع على النيل الرئيسي شمال مدينة الخرطوم حيث يجري النهر في اقليم اخدودي على شكل حرف S مابين مدينة الخرطوم جنوبا ومدينة وادي حلفا شمالا وهي تقع على الحدود بين مصر والسودان مطله على بحيرة ناصر جنوب السد العالي. ونهر عطبره هو الرافد الرئيسي الثاني للنيل بعد نهر النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا بهضبة الحبشة ثم يجري هو الآخر في اقليم خانقي اخدودي موازيا لنهر عطبره وحتى يتصل بالنهر الرئيسي عند مدينة الخرطوم. والنهران معا يشتركان في التغذية المائية للنيل الرئيسي بالفيضان الصيفي الذي يغذي بحيرة ناصر جنوب السد

العالي والتي يصل معدل التخزين بها الى ١٥٧ مليار  
متر مكعب.<sup>١</sup>

٤- يقطع السهل الساحلي المطل على البحر الأحمر بعدد كبير من الأودية الجافة التي تتساقب من الهضبة الأريتيرية مختزقة صحراء بنكاليا ومن أشهرها وادي علي قدي ووادي حداد ووادي كميلي ووادي بلزا. وبعض هذه الأودية يكمل مسيرته الى ساحل البحر الأحمر. والبعض الآخر ينتهي في السهل الساحلي ولذلك يمتد خطان من الدلتاوات المروحية لهذه الأودية الجافة أحدهما يوازي ساحل البحر الأحمر بينما يمتد الخط الآخر عند مقدمات الهضبة الأريتيرية. وهذه الظاهرة تتكرر على سبيل المثال في سهل بنغازي بالشمال الليبي بحيث يمتد الخط الأول من الدلتاوات المروحية للأودية الجافة موازيا لساحل البحر المتوسط وأما الخط الثاني من هذه الدلتاوات المروحية فتقع عند مقدمة مرتفعات الجبل الأخضر المجاورة.<sup>٢</sup> وهذا أمر طبيعي فكل من السهل الأريتيري وسهل بنغازي يتبع المناخ شبه الجاف. وفي ظروف طبيعية متشابهة وكثيرا ما تتساقب مياه السيول في موسم الأمطار في هذه الأودية وأحيانا تكون قوية جارفة فتؤدي الى اغراق بعض المزارع والقري. وهذه الظاهرة الجغرافية هي الاخرى تتكرر في ظل المناخ الجاف وشبه الجاف كما حدث في شهر اكتوبر ١٩٩٢ بالوسط التونسي، وفي أوائل شهر نوفمبر من نفس العام في صحراء

<sup>١</sup> د. محمد ابراهيم حسن: دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي - من منشورات جامعة قاريونس. الطبعة الثانية ١٩٧٦ ص ١٦٤

<sup>٢</sup> د. محمد ابراهيم حسن: تصنيف التربة بسهل بنغازي بالشمال الليبي - مجلة العلوم الانسانية - العدد الثاني - كلية الآداب والتربية - جامعة ناصر - زليتن - ليبيا نوفمبر ١٩٩١ - ص ٣٢٠ وما بعدها

مصر الشرقية فجرف السيول الفوية بعض القرى في اقليم  
اسوان بجنوب مصر .

وقد استغلت الأجزاء العليا من بعض هذه الأودية الجافة  
فحولت الى بحيرات صناعية لتخزين المياه وتوليد الطاقة  
الكهربائية. كما حدث في وادي بلزا مثلاً بالقرب من اسمره.  
وهذا المشروع يروي مزارع اقليم قندع بين اسمره وميناء  
مصوع بالإضافة الى توفير الكهرباء والمياه لمدينة اسمره.

ومن هذا العرض التحليلي لظاهرة التقطع النهري نتضح لنا  
أن الأراضي الأريترية بسهولها ومرتفعاتها ووديانها وجزرها  
تتمتع بقدر وافر من مصادر المياه السطحية بالإضافة الى مياه  
الأمطار والمياه الجوفية مما يسمح بالتوسع الزراعي في  
المستقبل في نحو ثلاثة ملايين فدان مورعة على النحو الآتي<sup>١</sup>:

- أ- وادي نهر بركة.
- ب- وادي نهر القاش.
- ج- وادي نهر سييتيت.
- د- سهول أريتريا الشمالية والشمالية الغربية المنحدرة نحو  
السودان.
- هـ- سهول أريتريا الجنوبية والجنوبية الشرقية المنحدرة نحو  
جيبوتي.
- و- أراضي المراوح الدلتاوية للأودية الجافة بالسهل الشرقي.

<sup>١</sup> عثمان صالح تاريخ اريتريا مرجع سابق ص ٢٣٢ وما بعدها

### القسم الثالث الأقاليم المناخية والنباتية وتنوع أنماط التربة

ثالثا: الأقاليم المناخية والنباتية وتنوع أنماط التربة:

ان الموقع الجغرافي لأريتريا مطلا على البحر الأحمر ما بين خطي عرض  $18^{\circ}$ م شمالا و  $13^{\circ}$  شمالا يجعله يقع في ظل المناخ المداري الحار ولاسيما السهول الساحلية التي تمتد ما بين سهل جيبوتي جنوبا عند مدخل البحر الأحمر حتى سهول شرق السودان شمالا حيث مدينتي سواكن وبورسودان. وفي هذا الشريط الساحلي تصل درجة الحرارة صيفا الى نحو  $50^{\circ}$ م وتتناقص شتاء الى نحو  $18^{\circ}$ م في أشد حالات البرودة. وفي صحراء دنكاليا المطلة على البحر الأحمر قد ترتفع درجة الحرارة الى  $48^{\circ}$  م وهي من أعلى درجات الحرارة في العالم.

أما الهضبة الأريتيرية التي يتراوح ارتفاعها ما بين ٦٠٠٠ الى ٨٠٠٠ قدم فوق سطح البحر فهي تتمتع بطقس ربيعي دائم إذ أن أقصى درجة حرارة في شهر مايو لا يزيد على  $25^{\circ}$ م ولا تنخفض في شهر ديسمبر عن  $5^{\circ}$ م.

ومن زاوية الأمطار فإن أريتريا تمتاز بثلاثة نظم للأمطار:<sup>١</sup>

أ- أمطار صيفية في الفترة التي تمتد ما بين شهر يونيه وشهر سبتمبر. وهذه تسود في كل النطاق الهضبي الذي يشكل امتدادا لهضبة الحبشة حيث تسقط أمطار الصيف الموسمية بسبب هبوب الرياح الموسمية الغربية والجنوبية الغربية من الضغط المرتفع الدائم على جنوب المحيط الأطلسي متجهة نحو الضغط المنخفض صيفا على أواسط إفريقيا. ويبلغ متوسط سقوط الأمطار على وادي بركه نحو ٣٧٥ مم (١٥ بوصة). وفي حوض نهر القاش ونهر سيتيت يرتفع المعدل الى ٦٢٥ مم (٢٥ بوصة). وتصل هذه الرياح جافة أو شبه جافة الى حوض البحر الأحمر فلا تسقط امطارا. وأما في نصف السنة الشتوي فتهب على الهضبة الأريتيرية رياح جافة من الضغط المرتفع العالي على الصحراء الكبرى بالشمال الاقريقي.

١. أ. جبهة التحرير الأريتيرية: موجز تاريخ أريتريا الحديث - ص ١٨ ، ١٩

ب. د. عبدالمشهد عزاي ولآخرون: أطلس سوريه والعالم ص ٩

ب- أمطار شتوية في الفترة من ديسمبر حتى مارس وذلك على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر بسبب الرياح الشمالية الشرقية الأتية من الضغط المرتفع الأوراسي على وسط آسيا متجهة نحو الضغط الاستوائي المنخفض على وسط أفريقيا والمحيط الهندي، ويعبرها مياه البحر الأحمر تلتقط بعض الأبخرة فتسقطها أمطاراً على السهل الساحلي الأريتري. وأما في نصف السنة الصيفي فتصل الرياح الموسمية الغربية والجنوبية الغربية إلى السهل الساحلي كرياح جافة سقطت أمطارها على الهضبة الداخلية مما أدى إلى خلق صحراء دنكاليا الأريتيرية. وهي أمطار قليلة ضعيفة متذبذبة وهي في معدلها تصل إلى ١٧٥ مم (٧ بوصة) في ميناء مصوع. وتقل الأمطار بسرعة نحو الداخل ونحو الجنوب فتصل في ميناء عصب إلى نحو ٧٥ مم (٣ بوصة) سنوياً.

ج- أمطار دائمة على طول الحافة الاخدودية المطلة على البحر الأحمر فهي تستقبل رياح الصيف الموسمية الغربية والجنوبية الغربية آتية من المحيط الأطلسي الجنوبي عبر الهضبة الحبشة فتسقط أمطارا تصادمية. كما أنها في الشتاء تواجه الرياح الاوراسية الشمالية الشرقية وقد عبرت مياه البحر الأحمر. متجه الى النطاق الاستوائي الافريقي فتسقط هي الاخرى أمطارا تصاعدية تصادمية مما أدى الى ارتفاع معدل الأمطار الذي يصل مثلا في اقليم قندع قرب اسمره الى نحو ١١٢٥ مم (٤٥ بوصة). ولكنها هي الاخرى تشكل أمطارا متذبذبة وفقا لسرعة الرياح التي تتوقف على مدى عمق النطاق الاعصاري المنخفض. وتعتبر مرتفعات قندع بين مصوع واسمره من أكثر المناطق أمطارا وهي منطقة زراعة البن في أريتريا. وجغرافيا تشبه هذه المنطقة من المرتفعات الاخدودية الأريتيرية ما يقابلها من مرتفعات اليمن الاخدودية على الجانب الآسيوي من حوض البحر الأحمر. وهي الاخرى أيضا تشكل منطقة مهمة لزراعة البن اليمني المشهور عالميا.

وهكذا يتضح لنا أن أريتريا بمساحتها الصغيرة التي لا تتجاوز ١٢٠ ألف كيلومتر مربع تمتاز بتيارين مناخي كبير في النظام الحراري من جهة ونظام توزيع الأمطار من حيث الكمية والمدى من جهة أخرى مما يترتب عليه ظهور تنوع كبير في الأقاليم المناخية والنباتية وتهيأ في أنماط التربة من حيث نسيجها وقطاعها.

ووفقا للدراسة التحليلية السابقة والتي ابرزت:

- أ- أهمية الموقع الجغرافي في العروض المدارية.  
ب- كذلك أثر التباين في المظاهر التضاريسية على التنوع المناخي.

يمكن أن نقسم الأراضي الأريتيرية الى الأقاليم المناخية والنباتية الآتية ومدى التكامل الجغرافي بينها:

#### ١- إقليم شبه جاف:

يمتد على طول الشريط السهلي الساحلي للبحر الأحمر ما بين خطي عرض ١٨° شمالا، ١٣° شمالا حتى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر عند باب المندب في عروض مدارية حاره. وتتراوح معدلات الأمطار التي تسقط في نصف السنة الشتوي بين ٧٥ مم، ١٧٥ مم حيث يتبخر قدر كبير منها مما يضعف قيمتها الفعلية اقتصاديا. ولذلك تنمو النباتات شبه الصحراوية وهي على نوعين<sup>١</sup>:

- أ- النباتات الحولية وهي قصيرة الأجل فتقضي فترة نموها في موسم الأمطار القليلة ثم تموت وتبقى بذورها في التربة لتنمو مره ثانية عند عودة الظروف الملائمة. ومن هذا النوع الحولي نبات البابونج والشويل والشعير البري والخردل وغيرها كثير.

١ د. محمد صبحي عبدالحكيم وآخرون: الوطن العربي - أرضه وسكانه وموارده - القاهرة ١٩٦٨ ص ١٠٧ وما بعدها



ب- النباتات المعمرة وهي دائمة الخضرة اذ كلفت نفسها وفقا لظروف الجفاف الطويل وهي تقاومه بوسائل مختلفة منها تعميق الجذور في التربة. واختزان الماء في بعض اجزائها كنبات البلوز وشجر الأكاشيا. واحيانا تغطي أوراقها بمادة شمعية قليلة المسام للمحافظة على رطوبتها.

وتختلف هذه النباتات من حيث توزيعها وفقا لكميات الرطوبة السطحية والماء الجوفي والمطر وأنواع التربة. ويلاحظ أن هذا الشريط الساحلي يمتاز بنباتات لها القدرة على امتصاص بخار الماء من الجو ومن الضباب ومن نقط الندى. وظاهرة الضباب مساعدة على نمو الحشائش القصيرة متناثرة على طول السهل الساحلي مما جعله اقليلما صالحا لرعي الأغنام والماعز والابل<sup>١</sup>.

## ٢- الاقليم الصحراوي الجاف:

ويتمثل في صحراء نينجاليا التي تمتد بين الشريط السهلي الساحلي للبحر الأحمر شرقا ومقدمات الحافة الجبلية الاخمدية غربا. وهي في الواقع تشكل لسانا من الصحراء الافريقية الكبرى. وهي من الصحارى الشديدة الجفاف في العالم اذ تهبط معدلات الأمطار الى أقل من مائة مليمتر كما أن المدى اليومي والفصلي لدرجة الحرارة يبدو مرتفعا جدا. ويندر أن تحتجب سماء الصحراء بالسحب. فالحياة النباتية فقيرة جدا. وتتكون من أنواع تتحمل الجفاف الشديد. ومنها ما هو قصير العمر جدا فتتم دورة حياته في أقل من شهر عقب سقوط الأمطار النادرة، ثم

<sup>١</sup> د. عبدالعزيز طريح شرف: الجغرافيا المناخية والنباتية - الاسكندرية ١٩٧٧ -

يموت ويترك بذوره في الأرض حتى تسقط الأمطار مرة أخرى فينمو من جديد. وبعض الأنواع النباتية الأخرى يخزن الماء في جنوره أو في أوراق سيقانه مثل نبات الصبير "Cactus". ومنها ما يستطيع أن يتعمق بجنوره في الأرض ليستفيد من رطوبتها أو قد يصل إلى مستوى المياه الجوفى أحيانا. وهذا النوع الأخير يبدو في شجيرات قليلة الارتفاع ذات أوراق شوكية مثل السنط.

وصحراء نكاليا تمتاز بتنوع كبير في أشكال التضاريس ومظاهر السطح من بقعة إلى أخرى. فسطح الأرض في بعض الجهات يبدو صخريا بينما هو في مناطق أخرى يغطى بالرمال والكثبان الرملية وأحيانا بالحصى والزلط. وأفقر الجهات نباتيا هي الصخرية والحصوية بينما ينتعش النمو النباتي في بطون الأودية وعلى جوانب التلال حيث تسيل مياه الأمطار.

ونتيجة لظاهرة التضرس أو تموج السطح في بعض المناطق بسبب تباين صلابة الصخور وفعل عوامل التعرية، قد تتجمع مياه السيول والأمطار على شكل مساحات مستقيمة سرعات ما تتبخر مياهها تاركة طبقة ملحية رقيقة من أملاح بيضاء (كلوريد الصوديوم) أو أملاح سوداء (كربونات الصوديوم)<sup>١</sup>. وهي ضارة بالنمو النباتي.

<sup>١</sup> د. زين الدين عبدالمقصود: المناطق الجافة - المجلة الجغرافية العربية - العدد السابع ١٩٧٤ - القاهرة - ص ٤٢ وما بعدها

### ٣- اقليم مناخ معتدل وأمطار على مدار السنة:١

ويمتد على طول الحافة الاخدودية الجبلية التي تمتد الى الغرب من السهل الساحلي وهي تتحدر تدريجيا في نظام سلمي نحو السهل الساحلي شرقا والهضبة الأريترية غربا. ويصل معدل الأمطار الى أكثر من ١١٢٥ مم سنويا. وهي من النوع التصاعدي للتصاعدي بفعل الرياح الشمالية الشرقية شتاء والرياح الغربية الموسمية صيفا وفقا لما شرحناه سابقا.

وتنتشر الأشجار المرتفعة التي تفصل بينها شجيرات وأحراج أقصر منها. وأشجار السنط والبن والموز والزيتون البري تأتي في مقدمة الثروة الغابية.

ومن أبرز المشاكل التي تواجه هذا الاقليم:٢

أ- مشكلة الرعي الجائر للأغنام والماعز في أراضي الحشائش بين الأشجار والشجيرات.

ب- مشكلة التمداد في قطع الأخشاب دون الاهتمام باستزراع أشجار أخرى.

ج- مشكلة تعرية التربة وهي نتيجة طبيعة للمشكلتين السابقتين مما أدى الى انكماش المساحات الغابية بدرجة كبيرة ولاسيما في ظل الاستعمار الأثيوبي الذي أهمل هذه الغابات اهمالا كبيرا.

١ د. عبدالله سالم وآخرون: جغرافية الوطن العربي - طرابلس ليبيا ١٩٩٠ ص ٩٦

٢ د. عبدالقادر مصطفى المحيشي: التصحر في شمال افريقيا - الأسباب والعلاج (ترجمة) - طرابلس ١٩٩١ - ص ٦٥ وما بعدها

وفي ظل الحكم البريطاني وجبهة التحرير الأريترية اتجه الاهتمام تدريجياً نحو إعادة غرس الأشجار على المدرجات الجبلية والتوسع تدريجياً في الزراعات الاقتصادية ولاسيما أشجار البن ومزارع الموز. بالإضافة إلى زراعة أنواع جديدة من أشجار الموز وأشجار الزيتون للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج بقدر قليل.

#### ٤- إقليم مداري داخلي وحشائش السفانا:١

وهو يغطي الهضبة الأريترية التي تشكل امتداداً لهضبة أثيوبيا نحو الشمال والشمال الشرقي ثم تندمج مع هضاب شرق السودان. وتتراوح معدلات الأمطار الصيفية الموسمية بين ٣٧٥ مم في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية و ٦٥٠ مم في باقي النطاق الهضبي ويطول فصل الجفاف ما بين خمسة إلى ثمانية أشهر ويتميز بشدة جفافه. والمظهر النباتي السائد هو حشائش قصيرة في شمال الهضبة تبدو أحياناً وهي متفرقة أو في مجموعات تتخللها أشجار شوكية صغيرة أو شجيرات. وينمو العشب الأخضر النضر في فصل المطر وتخضر الأشجار والشجيرات. وبحلول الجفاف ينتشر الجذب والفقر بسبب احتراق العشب وسقوط أوراق الأشجار. ونحو الوسط والجنوب من الأراضي الهضبية تنتشر سفانا السنط والحشائش الطويلة نسبياً. ويستمر المظهر النباتي في الهضبة الحبشية المجاورة. كما يمتد غرباً نحو وسط وجنوب السودان.

١ د. محمد صبحي عبدالحكيم: الوطن العربي - مرجع سابق - ص ١٠٢ وما بعده

وحشائش هذا النوع تنمو الى ارتفاع يتراوح ما بين متر ومتر ونصف تتخللها أشجار شوكية ومقلطة القمة يتراوح ارتفاعها ما بين ٣ - ١٥ مترا. وهي من الفصيلة السنطية ومع فصل الجفاف يختفي الغطاء الأخضر فتظهر الأرض سوداء تتخللها بعض الأشجار. ثم تخضر تدريجيا مع هطول الأمطار.

ويعد السنط أهم أشجار نطاق السفانا ومن أهم أنواعه الهاشاب والطلح وهما مصدر للصمغ العربي. وفي بطون الأودية تنتشر أشجار البوباب والدرم والزيتون البري. هذا ويلاحظ أن التباين الجغرافي بين الأقاليم المناخية والنباتية قد انعكس على أنماط التربة التي خضعت للعوامل الأتية وهي تتحكم في تصنيفها:

#### أ- تنوع الاشتقاق الصخري:

اذ أن أريتريا تمتاز بتعدد صخورها مثل الصخور الجيرية والرملية والجرانيتية والنارية البركانية من لاقا وبازلت وميكا كرد فعل للحركة. الاخدودية العنيفة التي كونت حوض البحر الأحمر فأعطت مصدرا غنيا للتفتتات الصخرية التي تساهم في تكوين أنواع التربة.

#### ب- انتشار الأودية النهرية وشبكات الأودية الجافة:

وهي تقطع الهضبة والسهول الشمالية والشرقية. وكلها تساهم بفعل المياه النهرية الجارية وتدفق مياه السيول في الأودية الكثيرة الجافة، ولاسيما تلك التي تخترق صحراء دنكاليا نحو البحر الأحمر، في نقل التربة والتفتتات الصخرية من مكان

ترسيبها الى مكان آخر مما أدى الى خلق أنواع مما يسمى بالتربة المنقولة.

### ج- انتشار البحيرات والسبخات الشاطئية والداخلية:

ولاسيما في أطراف دلتاوات الأودية الجافة التي تنتهي الى البحر الأحمر والسبخات التي تشغل الأجزاء الأكثر انخفاضا من الشواطئ البحرية. هذا بالإضافة الى البحيرات والسبخات الداخلية التي تنتشر في بطون الأودية والمنخفضات الحوضية ضمن الهضبة الأريترية، مما أدى الى ترسيبات ملحية وخلق أنواع من التربة الملحية السبخية.

### د- تباين توزيع الأمطار وتذبذب سقوطها:

فهي تتفاوت ما بين مائة مليمتر على صحراء دنكاليا الساحلية ونحو ٦٠٠ مم على الهضبة وأكثر من ١١٠٠ مم على المرتفعات الاخدودية. كما أنها تختلف في فصول سقوطها ما بين نصف السنة الشتوي على الشريط الساحلي ونصف السنة الصيفي في باقي الأقاليم. هذا ونلاحظ أيضا ظاهرة تذبذب سقوط الأمطار من موسم الى آخر بل من شهر الى آخر وفقا لمدى سرعة الرياح الممطرة وما تحمله من بخار ماء. ومعنى هذا تذبذب الرطوبة النسبية في الجو وهي بذلك تؤثر على تركيب التربة ونسيجها ومدى عمق قطاع التربة وتدرج طبقاته وتنوعها ومدى انتشار الاكسجين المذاب في الماء.

هـ- التباين في التوزيع الحراري وفقا للموقع الجغرافي ومدى الارتفاع:

اذ تتخفض درجات الحرارة تدريجيا ما بين السهل الساحلي المطل على البحر الأحمر والنطاق الهضبي والمرتفعات الاخوندية مما يؤدي الى تفاوت كبير في مدى نشاط بكتيريا التربة التي تمتص الأزوت من الهواء وتحوله الى مادة فعالة في التربة.

و- النشاط البشري التكنولوجي:

اذ بدأت أريتريا في السنوات الاخيرة أن تأخذ تدريجيا بأصول التقنية الحديثة في الزراعة وفقا للوسائل الفنية الآتية التي بدأت تغير في تركيب عناصر التربة من اقليم الى آخر في الأراضي الزراعية والرعية بكل اقليم أريتريا:

- ١- استخدام الدورات الزراعية العلمية ولاسيما في مزارع الموز والحبوب والخضر والفاكهة.
- ٢- تنوع استخدام الأسمدة الكيماوية وفقا لأنواع المحاصيل الزراعية والرعية وأشجار البن والفاكهة والأحشاب.
- ٣- تجفيف بعض السبخات والأجزاء الضحلة من البحيرات ولاسيما في المنخفضات الحوضية التي تتأثر في الهضبة الأريتيرية الوسطى.
- ٤- غسل التربة لتخليصها من الأملاح الضارة واطافة عناصر عضوية ومعنوية اليها كما حدث في أراضي أودية بركة والقاش ونهر سينيت.

٥- في المزارع النموذجية التي تمتلكها بعض الأسر الإيطالية استخدم نظام الصرف الحديث للتخلص من فائض المياه. كما توسعت هذه المزارع في اتباع التقنين المائي الحديث في الري حتى يأخذ النبات ما يحتاج إليه فقط من المياه فتقل جدا فرصة تكوين الأملاح الزائدة الضارة بالتربة.

٦- تحويل بعض المدرجات بالحافة الجبلية الاخديرية الى أراضي صالحة لمزارع البن وقد ثبتت التربة عليها لوقف جرف التربة.

أما الأنماط الرئيسية للتربة فتتمثل فيما يأتي وفقا للعوامل الجغرافية المشار إليها:

#### ١- التربة الرسوبية الفيضية النهرية:

وتنتشر في الأودية النهرية وأولها نهر سيتيت الذي يبدأ في هضبة أريتريا ثم يخترق هضبة الحبشة بأسم نهر تكازي ويجري بعد ذلك نحو الشمال الغربي في سهول السودان ليصب في النيل الرئيسي بأسم نهر عطبرة. والنهر دائم الجريان وهو غني برواسبه البركانية الخصبة فخلق واديا قد غطى بتربة رسوبية سمكية معتدلة التماسك سوداء غنية بعناصرها العضوية والمعدنية.

وأما خور بركة وخور القاش فهما من الأنهار الموسمية إذ تتجمع فيهما مياه أمطار الصيف الموسمية ويجفا في الشتاء. وقد ساهما في تكوين تربة رسوبية فيضية نهرية تتكون من تفتتات بازلتيه ورملية وخلطت بمواد عضوية ومعدنية وفي قطاعها تبدو أقل سمكا من تربة وادي سيتيت.



## ٢- التربة السبخية الجيرية:

وتظهر حول الخلجان الساحلية المتعمقة على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر كما تمتد محيطة بالبحيرات الداخلية في الهضبة الأريتيرية وكذلك الهضبة الحبشية المجاورة. كما تظهر عند نهايات الدلتاوات الجافة التي تشكل شريطا طويلا يوازي ساحل البحر الأحمر. وتشكل أراضي للتوسع الزراعي الحديث بعد غسلها للتخلص من الأملاح الزائدة ومع استخدام الأسمدة المناسبة والوراث الزراعية العلمية. وتتوفر المياه الجوفية في هذه المناطق والتي تنتمي الى الزمنين الثالث والرابع ولاسيما أثناء العصر المطير أواسط الزمن الرابع مما أدى الى تخزين كميات كبيرة من المياه الجوفية.

## ٣- تربة الجزر الشاطئية:

وهذه تنتشر أمام ساحل البحر الأحمر وكانت تشكل اشباه جزر ثم قطعت بفضل التعرية البحرية فهي من أصل قاري. وترتبطها جيرية تختلط بها تفتتات قوقعية فهي صالحة لزراعة الحبوب وبعض أنواع الخضار والفاكهة وكذلك استزراع الحشائش المدارية للرعي الحديث.

## ٤- تربة الكثبان الرملية:

وهذه الكثبان تميز صحراء دنكاليا التي تغطي السهول الشرقية كما تظهر أيضا على شكل أشرطة كثيبية في السهول الشمالية التي تقطعها أودية بركة والقاش وعطبرة والتي تندمج في سهول شرق وشمال السودان. وهي تربة رملية فقيرة في

عناصرها المعدنية والعضوية. ولكنها تختزن مياه الأمطار القليلة التي تسقط شتاءً في السهول الشرقية وصيفاً في السهول الشمالية ويعتمد البدو الرحل على هذه المياه في الشرب وري بعض الزراعات المتنقلة. وقد زرعت بعض المنخفضات التي تفصل بين هذه الامتدادات الكثيبية ونجحت زراعة الخضروات ولاسيما الطماطم وكذلك البطيخ والشمام والنخيل وبعض أنواع اللين والزيتون. وقد نجحت هذه التجربة أيضاً في شرق مصر والسودان والجنوب الليبي لتشابه مقومات التربة الكثيبية في هذه الأراضي.

#### ٥- التربة المفتتة محلياً:

وهذه تنتشر في مناطق متعددة في كل الاقليم. وتختلف في تركيبها ونسجها وعمق قطاعها وفقاً لطبيعة الاشتقاق الصخري. فهي تربة جيرية على طول الشريط الساحلي، بينما تنتشر التربة الرملية في القسم الداخلي من السهول الساحلية. وترتفع نسبة التفتتات البركانية من الميكا واللافا والبازلت وكذلك التفتتات الجرانيتية والنارية على سطح الهضبة وفي المناطق شبه المستوية على المنحدرات الجبلية الاخدودية الضعيفة الانحدار مما يساعد عوامل التعرية والارساب من رياح وأمطار على تفتت الصخر ولاسيما في المناطق الصخرية الضعيفة. وتعتبر التربة المفتتة محلياً من الأراضي الصالحة للتوسع الزراعي ولاسيما في النطاق الهضبي وعلى منحدرات المرتفعات الاخدودية الانكسارية.

## ٦- تربة الأودية والدلتاوات الجافة:

وهي تنتشر في ثلاث شبكات رئيسية:

أ- شبكة تمتد على طول الشريط الساحلي وتنتهي دلتاواتها أو ما يسمى بالمراوح الدلتاوية مشرفة على مياه البحر الأحمر.

ب- شبكة من الأودية الجافة تمتد مع التشققات الضعيفة المنتشرة على المنحدرات الجبلية الأخدودية.

ج- شبكة من الأودية الجافة الطويلة بروافدها المتشعبة تتساب من الهضبة الشمالية نحو سهول شرق السودان. وهذه هي أهم المجموعات الثلاثة وتشكل المنطقة الرئيسية للتوسع الزراعي والرعي في شمال اقليم أريتريا وكذلك في شرق السودان.

وهذه التربة هي نوع من التربة الرسوبية تنقلها مياه السيول وترسيها في جوانب هذه الأودية وفي نهاياتها على شكل دلتاوات أو مراوح دلتاوية. وهي تربة غنية بعناصرها من بقايا عضوية نباتية وحيوانية وتفتتات صخرية معدنية. وهي تستثمر على مستوى الوطن العربي والشمال والشرق الأفريقي بخاصة في مشروعات التوسع الزراعي الحديث. ومن أوضح الأمثلة على ذلك التوسع الزراعي حالياً في وادي بركة ووادي القاش في كل من ألبانيا والسودان الشرقي هذا بالإضافة الى التوسع الزراعي الكبير في هذه الأودية الجافة في شمال سيناء وشرق مصر والشمال الليبي على سبيل المثال. وتستخدم المياه الجوفية في بطون هذه الأودية في ري هذه الأراضي التي تزرع بالحبوب والزيئون الأفريقي وبعض أنواع النخيل واللوز والفاكهة ولاسيما التين والتفاح.

## ٧- التربة البركانية:

وتتمثل في مناطق النشاط البركاني القديم على طول الحافات الاخدودية لحوض البحر الأحمر حيث تفتت تكوينات اللافا في تربة غنية بالعناصر المعدنية وهي تمتاز بعمق قطاعها واعتدال نسيجها وسميت عند العرب "تربة الحارات" وتظهر في الحجاز والعسير واليمن من الجانب الآسيوي لحوض البحر الأحمر. وعلى الجانب الأفريقي تظهر هذه التربة في شمال وغرب شبه جزيرة سيناء وفي مناطق متناثرة من حافة الاخدود في أريتريا. فضلا عن ظهورها في مناطق البراكين القديمة وعلى طول الانكسارات الجانبية في كل من هضبة اليمن والهضبة الحبشية. ولاسيما حول بحيرة تانا، التي ينع منها النيل الأزرق والتي تشكل فوهة بركان قديم. ويلاحظ أن التربة رسوبية على جانبي نهر عطبرة في أريتريا والحبشة والسودان هي من هذا الأصل البركاني القديم.

وهكذا يتضح من هذه الدراسة التحليلية المقارنة أن أريتريا على الرغم من صغر مساحتها تمتاز بتنوع رئيسي في أنماط التربة في سبع تصنيفات جوهرية مما يؤدي الى تشعب كبير في مظاهر التوسع الزراعي الحديث وفي المستقبل مشيرا الى تقدم مزدهر في النشاط الزراعي الرعوي.



- |     |     |     |
|-----|-----|-----|
| (١) | (٢) | (٣) |
| (٤) | (٥) | (٦) |
| (٧) | (٨) |     |

## خريطة:

أ- اقليم العروض المعتدلة: ١- اقليم الجفاف الصيفي  
(بحر متوسط).

٢- اقليم الجفاف الشتوي  
(جنوب شرق القارة).

٣- اقليم المطر القليل الدائم.

ب- اقاليم العروض المدارية: ٤- اقليم الأمطار الهامشية.

٥- اقليم الجفاف المطلق  
"الصحاري".

٦- اقليم المطر الفصلي  
"السوداني".

ج- اقاليم العروض الاستوائية: ٧- اقليم المطر ذو القمتين.

٨- اقليم المطر ذو القمة  
الواحدة. ١

تستخلص من هذه الخريطة الحقائق الجغرافية الأتية من زاوية المطر:

١- تمد الصحراء الكبرى بالشمال الاقريقي بمعدل أمطارها اقل من ٢٥٠ مم لسانا يتمثل في صحراء دنكاليا الأريتيرية ويواصل زحفه محيطا بالقرن الاقريقي حتى خط عرض ٥٠ شمالا.

٢- يلاحظ أن الأمطار تزيد على الهضبة الأريتيرية بمعدل يتدرج من ٢٥٠ مم الى أكثر من ٥٠٠ مم ثم يزداد هذا المعدل بعد ذلك على الهضبة الأنثيوبية الى أكثر من ١٠٠٠ مم. وهي أمطار موسمية صيفية. بينما تسقط أمطار الشتاء القليلة على الشريط الأريتيري الساحلي للبحر الأحمر بفعل الرياح الشمالية الشرقية الأتية من الضغط الاوراسي المرتفع فتلتقط بعض الأبخرة من مياه البحر الأحمر فتسقطها أمطارا على الشريط الساحلي. ثم تعود فتسقط أمطارا اخرى بالتصادم على الحافة الاخدودية التي تستقبل هي الاخرى الأمطار الصيفية فهي تشكل نطاقا ضيقا بأمطار طول العلم.

٣- يتضح من الخريطة أن التصحر زاحف بقوة نحو أريتريا بكل أقاليمها التضاريسية. ويشترك معها في ذلك معظم هضبة أنثيوبيا المجاورة وكذلك شرق ووسط السودان. ويبدو من الخريطة أن حزام التصحر الحاد يمتد في نطاق كبير جنوب الصحراء الكبرى ما بين أريتريا والسنغال. ومعنى هذا أن زحف الصحراء برمالها يسير مسرعا في كل هذا النطاق نحو الجنوب. فقد اختفت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والمراعي وتحولت الى أراضي مجببة. وتفسر هذه الظاهرة الخطيرة بعوامل ثلاثة هي:

أ- قلة الأمطار وتنبئ بها.

ب- الرعي الجائر.

ج- سوء استخدام الغابات بقطع أشجارها دون غرس البديل.

وأخيرا تنبّهت الهيئات المعنية بخطر هذه الظاهرة فبدأت تدريجيا بوقف تعرية التربة باعادة غرس الأشجار واستخدام الدورات الزراعية المناسبة مع مصدات الرياح لوقف زحف الرمال.





صورة: جبهة تحرير أريتريا: موجز تاريخ أريتريا الحديث -  
القاهرة ص ٦٧

هذه الصورة تشكل ترجمة صادقة لمدى زحف الصحراء على القرى والأراضي الزراعية في أريتريا. ففي مقدمة الصورة تبدو الأراضي الزراعية وقد تحولت الى مساحات جرداء تنتشر فوقها حبات الرمال والتفتتات الصخرية معلنة مدى قوة تعرية التربة بسبب الجفاف، والرعي الجائر، والزراعة البدائية حيث لا تستخدم دورات زراعية مناسبة، مع سوء استخدام مياه الري واختفاء نظام الصرف للتخلص من المياه الزائدة مما أدى الى رفع نسبة الأملاح في التربة وتحويلها الى أراضي بور.

وفي مؤخرة الصورة تبدو المباني البدائية للقرية بصورة عشوائية بحيث كثيراً ما تتعرض القرية ككل الى جرف مياه السيول القوية مما يهدد اختفاء القرية بسكانها وتخریب الأراضي الزراعية المحيطة بها.

وتنتشر ايضا متناثرة أشجار السنط التي ترمز الى المناخ المداري شبه الجاف في سهول أريتريا الشرقية والشمالية وكثيرا ما تتعرض الى موجات من الجفاف الشديد على مدار العام.



## القسم الرابع السكان والنشاط الاقتصادي

### رابعاً: السكان والنشاط الاقتصادي: ١- نمو السكان:

يقدّر عدد سكان أريتريا بنحو ثلاثة ملايين نسمة. سكان الهضبة مزارعون يعتقد معظمهم المذهب الارثوذكسي المسيحي والأرض ملك نصفة جماعية للقرى. يسكنون منازل مصنوعة من حجر وطين ومغطاه بأخشاب الفربيون ومسنوده بأعمدة من أخشاب الزيتون البري. وبعض المساكن ذات سقف مخروطي ومسنودة في الوسط بعمود خشبي. وأما سكان السهول الشرقية والشمالية الغربية فمعظمهم شبه رحل. ويمتلكون المواشي ويحترفون أيضاً الزراعة، ويدين معظمهم بالاسلام. ويسكن ٧٨٪ من سكان أريتريا في اراضي الريف الواسعة.<sup>١</sup>

ومن حيث التوزيع الجغرافي للكثافة السكانية نجد أن معدل الكثافة السكانية يتراوح ما بين ١ الى ٣ في الكيلومتر المربع على طول الشريط الساحلي ثم يهبط هذا المعدل الى أقل من شخص واحد في كل كيلومتر مربع في صحراء دنكاليا. ليرتفع هذا المعدل مرة أخرى الى ما بين ٦ الى ١٢ نسمة في الكيلومتر المربع على طول المنحدرات الاخودية التي تحولت الى

١. عثمان صالح: تاريخ أريتريا - ص ٢٣٥ - الطبعة الثالثة - ١٩٧٧  
ب. عبدالقادر جيلاني: أريتريا - القضية والتحدي - ١٩٨٨ ص ٣٢، ١٥

مدرجات ظهرت عليها قرى متناثرة، كذلك على سطح الهضبة الأريترية الغنية بأرضها الزراعية ومراعيها<sup>١</sup>. فالارتباط وثيق بين مصادر المياه ومدى كثافة السكان. علما بأن معدل الكثافة السكانية بدأ يأخذ في الارتفاع في بطون الأودية الجافة التي تخترق صحراء دنكاليا نحو البحر الأحمر وذلك لوفرة المياه الجوفية بها التي بدأ فعلا في استثمارها على شكل واحات ترمز الى نوع من الاستقرار البشري في هذه الأراضي. كما أن انتشار المدرجات في إقليم الحافة الاخدودية وتثبيت التربة عليها أدى الى التوسع في استزراع الأشجار الاقتصادية كالبن والزيتون والموز وزراعة الحبوب فيما بينها مما جلب السكان اليها. وفي هذا المجال نشير أيضا الى أن التحول التدريجي لأراضي الرعي الى أراضي انتاج زراعي ولاسيما الحبوب على سطح الهضبة وفي أوديتها التي تنتشر على شكل شبكات متناثرة أدى الى جلب السكان اليها مما ساعد على ظاهرة الاستقرار السكاني وما ترتب عليها من نمو سكاني واقتصادي.

## ٢- الهجرة:

هذا وظاهرة الهجرة السكانية تلعب دورا رئيسيا في حياة السكان. وتتعدد ضروب الهجرة وتتباين أنماطها. من هجرة بحثا عن الماء والعشب الى هجرة للحج. الى هجرة بحثا عن العمل. ومن هجرة اسرية الى اخرى فردية. والذي يهمنا هنا هو هجرة العمالة في أريتريا والأراضي المجاورة. وعلى مدي تاريخ هذه البلاد حدثت هجرات القبائل من مكان الى آخر نتيجة للحروب المتوارثة التي اشتعلت بينهم أو مقاومة الاستعمار الأجنبي

١ د. عبدالمرشد عزلوي وآخرون: اطلس سوريه والعالم ص ٦٠

وتجارة الرقيق. ومثل هذا النوع قد أنتهي بعد وقف تجارة الرقيق والاستقرار العسكري للبلاد في مواجهة النفوذ الأجنبي.

وقد شجع الاستعمار الأجنبي ولاسيما الإيطالي على هجرة العمالة إلى مزارع المستوطنين التي اهتمت بزراعة الغلات النقدية كالبن والموز والزيتون والفاكهة والقطن. ولم تجد هذه الغلات قبالا من الأهالي في أول الأمر فقد تعودوا على زراعة الاكتفاء الذاتي لسد حاجاتهم البسيطة. وفي افريقيا المدارية بوجه عام اهتم المستعمر الأجنبي بهذه الغلات النقدية. وأجبر الأهالي على العمل في مزارع الأجانب عن طريق فرض الضرائب كضريبة الرأس. وكان على المواطن أن يبحث عن وسيلة للحصول على النقد وكانت هي العمل في مزارع المستوطنين التي انتشرت في الأراضي الجيدة أيضا بكل من كينيا وأوغندا والشرق الافريقي عامة. وكان هناك ضغط مستمر من المستوطنين على الادارة لاجبار الأهالي على العمل في المزارع الأوروبية.

وكانت هجرات موسمية من الريف إلى الريف ومن الريف إلى المدن لأعمال أخرى يتطلبها هذا التوسع الزراعي يقوم بها الأهالي كمعاملات النقل والاعداد للتصدير والعمل في الموانئ خاصة. كذلك العمل في مد الطرق واصلاحها. ومد الخطوط الحديدية. فضلا عن ظهور الأعمال الفنية كقيادة السيارات والشاحنات والأعمال الادارية بأنواعها.

هذا الاتجاه الاقتصادي الحديث منذ أواخر القرن الماضي ١٩ ساهم في تشجيع الهجرة للعمل مما غير كثيرا في نظام توزيع السكان والتباين في الكثافة السكانية من إقليم إلى آخر.

والدافع الاقتصادي هو الدافع الرئيسي وراء هذه الهجرة السكانية. فالقبائل المصدرة للأيدي العاملة هي هذه التي عضها الفقر والاحتياج. ومناطق الجذب عادة هي مناطق المشروعات الحديثة سواء كانت زراعية أو صناعية أو تعدينية.

### ٣- نمط الهجرة:١

ومن هذه الزاوية تقسم الهجرات السكانية الى:

- أ- هجرات موسمية: ومعظمها من الرجال يقومون بها خلال الشهور التي يقل فيها العمل الزراعي الى المناطق التي يشتد فيها الطلب على اليد العاملة في المدن أو في المشروعات الزراعية المجاورة. وقد تبلغ مدة الغياب عن القرية في هذا النوع من الهجرة نحو ستة شهور. ولاسيما في فترات جمع المحاصيل النقدية واعدادها للتصدير.
- ب- الهجرات قصيرة الأجل: وهذه قد تستغرق مددا أطول تتراوح بين العام والعامين للعمل في المدن أو المناجم أو المشروعات الزراعية. وقد يتعاقد هؤلاء العمال مع أصحاب العمل فهم عمال أهداف Target Workers يتمثل هدفهم في جمع قدر من المال ثم يعودون الى أوطانهم وفقا لتوجيهات قبائلهم كالأعداد للزواج أو المساهمة في مساعدة القبيلة ماليا واجتماعيا واقتصاديا. وهذه العادات

١ د. محمد عبدالغني سعودي: هجرة العمالة في شرق إفريقيا ص ٣٧-٧٣. المجلة الجغرافية العربية للجمعية الجغرافية المصرية - السنة الخامسة - العدد الخامس -

القبلية تشكل اساسا هاما في التركيب السكاني في كل افريقيا المدارية.

ج- الهجرات الدائمة: وهي التي تنتقل فيها الأسرة بكاملها وتتوطن في المدن أو في مناطق المشروعات الزراعية. وينتمي الى هذا النوع من الهجرات أيضا الشباب الغاز من تقاليد القبيلة والذي اجتذبه المدينة وقطع صلته تماما بموطنة الأصلي. وأنصرف نحو المدن ليعمل ويستقر.

#### ٤- الملكية:

والهجرات بأنماطها المشار إليها تمثل سمة من سمات التركيب السكاني في كل شرق افريقيا بنوع خاص ما بين تانزانيا وكينيا الى أريتريا وأوغنده. وهي تتجه الى مناطق الجذب السكاني بحثا عن العمل والاستقرار وجمع المال. والمزارع الحديثة هي الهدف الرئيسي لهؤلاء العمال. ويمتد بهم التنقل والترحال حتى الى الجزر الساحلية النائية مثل زنجبار وبمبا في موسم جمع القرنفل. والعمال الافريقي مرتبط دائما بوطنه الأم وبمزرعته وقريته فغالبيتهم ينتمون الى نمطي الهجرات الموسمية والهجرات القصيرة الأجل. يوجد عمال من النوع الدائم ولكن أعدادهم قليلة. فالمهاجرون لا رغبة لهم في قطع صلاتهم بأوطانهم الأصلية وترك أرضهم الزراعية فدخل المزرعة جزء من دخل الأسرة يكمل دخله من عمله في خارج قريته. فالأسرة مرتبطة بالأرض لانها المصدر الرئيسي والدائم اقتصاديا بالاضافة الى الروابط والصلات الاجتماعية الأسرية والقبلية. فإذا فقدت الأرض لا تستطيع الأسرة اعادةها ولا سيما في الأراضي الجيدة المزدهمة بالسكان. فالحياة هنا ليست



ملكية الأرض بقدر ما هي ملكية المحاصيل اذ أن الأرض لمن يفلحها. وما دام الرجل لا يأخذ تعويضا عن أرضه التي يتركها، كما أنه ليس له الحق فيها الا اذا كان هو وعائلته يقومون بفلاحتها، فهو لا يتركها.


ويعتبر العمل خارج القرية في المدن أو المزارع الحديثة يشكل عملا مؤقتا ليحصل على الكافي لاستكمال مطالبه كسواء دراجة لنقل محاصيله الى السوق وملابس ودفع الصداق. ومن زاوية السن فالمهاجرون عادة من الشباب. بل قد يقوم برحلته الأولى وهو صبي يصحبه والده أو أخوه الأكبر لانه من السهل أحيانا إيجاد عمل للصغار بأجور منخفضة. فأكثر من نصف الهجرات الأولى تتم قبل الزواج ومعظم الباقي يعد ولادة الطفل الأول. وبعد سن الأربعين يبدأ الجل في الاستقرار نظرا لالتزاماته المتعددة نحو الأسرة. ولانه يصبح أقدر على الحصول على النقد اللازم لاحتياجاته فهو يتلقى الهدايا العينية والنقدية من أقاربه المهاجرين وأبنائه. كما أنه يتلقى صداق بناته. فضلا عن أن مطالبه الأسرية تبدأ تنكمش من ناحية، كما أنه لا يصبح قادرا على بذل المجهود الجسدي والفكري التي تتطلبه مثل هذه الهجرات من ناحية أخرى.

وأخيرا نشير الى أن ظاهرة ترك الزوجات بسبب الهجرة المؤقتة له تفسيره الاقتصادي ممثلا في أن الزوجه هي عماد اقتصاد القرية اذ تقوم بالعمل الزراعي. أما الزوج ان كان موجودا فهو يساهم في موسم الحصاد وكذا قطع الأشجار عند الضرورة. فالأسرة تجمع بين دخل الرجل الخارجي ودخل المرأة في قريتها فضلا عن الاحتفاظ بالأرض لفلاحتها.

## هـ- تطور النشاط الزراعي في فترتي الاحتلال الإيطالي والبريطاني:

فكما شرحنا سابقا فإن إيطاليا احتلت الأراضي الأريتيرية بعد اضمحلال الحكم العثماني واستمرت الى سقوطها في الحرب العالمية الثانية لتحل محلها بريطانيا حتى عام ١٩٥٠. وهذه الفترة تشكل مرحلة اقتصادية هامة لأنها تشكل نواة النمو الاقتصادي الحديث. ويحسن أن نناقش هنا جزءا من تقرير هيئة الأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي في هذه الفترة الهامة والذي نشرته الهيئة الدولية بلغة الانكليزية عام ١٩٥٢ وترجمته جبهة التحرير الأريتيرية الى العربية عام ١٩٧٦ باسم "وثائق الأمم المتحدة حول أريتريا"<sup>١</sup>.

<sup>١</sup> جبهة التحرير الأريتيرية: "وثائق الأمم المتحدة حول أريتريا". القاهرة ١٩٧٦ من ص ٤٥ الى ص ٤٥



صورة: بعد أن حققت سيطرتها على نسبة كبيرة من أرض الوطن، أبدت الثورة الأريتيرية اهتمامها بالزراعة، ونظمت جبهة التحرير الأريتيرية برنامجا لمساعدة الفلاحين في زراعة وتسويق المنتجات. (هيئة التحرير الأريتيرية: موجز تاريخ أريتريا ص ٢٣)

## أ- الزراعة:

تعتبر أريتريا نسبيا بلدا غنيا بموارده الطبيعية. ولم تستغل إمكاناتها الزراعية الى الحد الأمثل بسبب اهمال الدول التي استعمرتها لادخال أي تطور حقيقي في مجال الزراعة أو الصناعة، وبسبب عدم الاستقرار الذي يعيشه البلد منذ أن ضمت أريتريا الى أثيوبيا.

تستطيع أريتريا أن تنتج المزيد من الحبوب الغذائية، وكذلك عدة محاصيل زراعية أخرى، وإذا قارنا مساحة أريتريا وعدد سكانها بجانب العديد من ملايين الأفنة غير المستغلة للزراعة لتبين لنا أن لدى أريتريا ثروة زراعية هائلة بجانب الثروة الحيوانية العظيمة.

تقع أحسن الأراضي الزراعية في منطقة (القاش - سييتيت) حيث يتوفر الماء ومتسوط سقوط الأمطار من ٢٠ الى ٢٥ بوصة سنويا، كما أن التربة سوداء غنية.

وتحمل أنهار القاش وسييتيت وبركة كميات من المياه، لاسيما في موسم الفيضان، والتي تكون تربة رسوبية في الأراضي المخفضة، ويمكن أن تسغل بواسطة الري. أما المرتفعات الأريتريّة فتتمتع بأعلى منسوب من مياه الأمطار، وجوا أكثر اعتدالا من أي منطقة في البلاد.<sup>١</sup>

<sup>١</sup> جبهة التحرير الأريتريّة: موجز تاريخ أريتريا ص ٢٣

## ب- المحاصيل الزراعية:

ساعد اختلاف أنواع التربة، وتنوع المناخ والارتفاع، على زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل خلال فصول السنة المختلفة.

- تكون الحبوب ٨٧٪ من مجموع المحاصيل، أما البذور الزيتية فتكون ١٠٪ والباقي عبارة عن خضروات وألياف وبن ودخان وقطن وموالح وفواكه مدارية، ويصنع الخبز الوطني من الذرة (مشيلا) و(الطاف). وينمو الطاف في الأراضي المرتفعة بينما تنمو الذرة (المشيلا) في الأراضي المنخفضة.

- أريتريا غنية بالقمح، والشعير، والطاف، والذرة بأنواعه، وتنمو الذرة الشامية في مساحات صغيرة في المنحدرات الشرقية والمنطقة الساحلية بواسطة الري. ويزرع الفول، والحمص، والحلبة، في الأراضي المرتفعة وفي الأماكن تصدير كميات كبيرة من الفول السوداني إلى الخارج، أما الخضروات والفواكه فهي تزرع بنجاح وتُجد سوقاً رائجة حيث تصدر إلى عدة بلدان في البحر الأحمر.

الموز، استجلب نبات الموز في أريتريا من بلاد الصومال قبل الحرب العالمية الثانية، ويزرع بنجاح الآن في وادي بركة، وتبلغ المساحة المزروعة بالموز حوالي (١٠,٠٠٠ فدان) وما زالت تزداد بسبب الظروف المناخية الملائمة والتي تشجع بزيادة الأراضي المستغلة في أماكن جديدة في منخفضات بركة وساحل البحر الأحمر. ولا توجد أخطار خطيرة يمكن أن تهدد هذا النبات.

وقد كان عدم الاستقرار السياسي سببا في تعطيل تطور انتاج هذا المحصول، حيث لا يتجاوز قيمة ما تصدره أريتريا منه نحو اربعة ملايين دولار أمريكي. ومنذ الاستقلال بدأ التوسع الزراعي تدريجيا كما تهتم الدولة بتنمية الثروة الحيوانية.

### ج- المقومات الجغرافية لتنوع الانتاج الزراعي والرعي:

وتسمح كمية الأمطار واعتدال الجو بزراعة أنواع مختلفة من الحبوب أهمها (طاف) الذي لا يوجد مثيل له في العالم سوى في اليمن وجنوب افريقيا، وكذلك الدرة الشامي (عفون) والقمح والعنبر والفول وأنواع كثيرة من الحبوب تزيد عن أربعين نوعا.

وتعاني الهضبة من التعرية من التربة الخصبة بسبب السيول الجارفة وعوامل التعرية الأخرى. وتوجد غابات كثيفة في الجنوب الغربي في منطقة سراي والقاش. ويعتبر سهل (هزمو) في أكلي قوازي من أخصب المناطق الأريتيرية.

وتعد الهضبة الأريتيرية السهول الغربية والشرقية بالمياه، أثناء موسم الأمطار الذي يمتد من شهر يونيو (حزيران) حتى سبتمبر (أيلول). وأهم الأنهار الموسمية هو خور بركة، ويبدأ بالقرب من حميرتي في محافظة حماسين، وينتهي عند سهل طوكر في السودان، حيث يروي مزارع طوكر، مارا بمدينة اغردات، عاصمة محافظة بركة، وينضم اليه وادي عنسبة الذي يمر بمدينة كرن عاصمة محافظة كرن، ويروي مزارع الموز

<sup>١</sup> عثمان صالح عيسى: تاريخ أريتريا - الطبعة الثالثة - ١٩٧٧ - ص ٢٢٣ ومابعدهما

والفواكه المدارية التي يملك معظمها إيطاليون، وخاصة دنداي (الموز) وكاشياناي (الفواكه المدارية).

أما القاش فيروي في أريتريا مزارع على قدر التي يمتلكها اليهودي الإيطالي (براتلو). وتقع مدينة تسني بالقرب من نهر القاش، وهي على مقربة من الحدود السودانية.

أما نهر سيتيت والذي يسمى في أثيوبيا (تكزي) وفي السودان (عطبرة) فيشكل أحد روافد النيل، ويلتقي به في مدينة عطبرة. ويشكل سيتيت الحدود بين أريتريا وأثيوبيا. وتقع مدينة أم ججر على ضفته الشرقية وتقابلها مدينة (حومرا) الأثيوبية. وهو النهر الوحيد الدائم الجريان في أريتريا.

وتقع إمكانات أريتريا الزراعية في الأرض الواقعة بين نهري (القاش) وسيتيت، وهي أراض سهلية خصيبة. ويقدر الخبراء، بتوسيع الزراعة في نحو مليون فدان. وتمتلك أريتريا ثروة حيوانية من أبقار وغنم وإبل وخيول تقدر بنحو عشرة ملايين رأس. وقد تأثرت كثيرا بموجات الجفاف والحروب الأهلية لمكافحة الاستعمار. وهي في دور النمو مع بزوغ شمس الاستقلال ١٩٩٣.



صورة: (اجنوا) نوع آخر من البناء منتشر في المرتفعات الأربرية خاصة في محافظة سراي. وهو اسطواني الشكل ومبنى من الحجر والطين بسقف مخروطي من القش مسنود في الوسط بعمود خشبي. ويلاحظ تأثير البيئة الطبيعية في ذلك أن يعتبر اقليم سراي أكثر الأقاليم مطرا في أربيريا.





صورة: المنازل في قرى حماسين واكلي قوازي تبنيها عادة السكان على شكل مستطيل مسطح السقف جدرانه من حجر وطين مغطاه بأخشاب القريون ومسندة بأعمدة من أخشاب الزيتون البري. ويسمى هذا النوع من المباني (انمو) يرجح انتقال هذا النوع من البناء من جنوب الجزيرة العربية منذ عهود قديمة.

ودورات الجفاف كثيرا ما تهدد متوسط إنتاج الفدان زراعي<sup>١</sup> كما لها آثارها على النبات الطبيعي، ففي صحراء الدناكل المقفرة توجد النباتات الشوكية وعلى المنحدرات الاخدودية تظهر الغابات. كما تنتشر الأشجار القصيرة على طول السهل الساحلي. وفي بطون الأودية تنمو أشجار البوباب والزيتون البري. وهي توفر العلف للماشية والأخشاب للبناء والحطب والقحم النباتي واللبن.<sup>٢</sup>

## ٦- المناجم والطاقة في فترتي الاحتلال الايطالي والبريطاني:

فحوض البحر الأحمر جيمورفولوجيا كما أوضحنا يشكل جزءا من المد الاخدودي العظيم ما بين الجنوب الافريقي حتى شبه جزيرة الأناضول وما نتج عنه من تباين في توزيع المعادن.<sup>٣</sup>

وتملك أريتريا أنواعا مختلفة من المعادن، في مقدمتها الحديد. ويقدر مخزونه في جبال دقي محاري وقدم، نحو ٢٥٠ مليون طن. وهناك الذهب والنحاس والنيكل والميكا والبوتاس والاسبستوس والمنجنيز واليورانيوم والتيتانيوم والمرمر وغيرها. ويؤكد الخبراء وجود البترول في سواحل أريتريا. ومعظم هذه المعادن لم تستخرج، على رغم نشر احصاءات رسمية عنها، بسبب عدم الاستقرار السياسي. وتعترض قوات التحرير الشعبية لجبهة التحرير الأريتيرية، استغلال المعادن في

<sup>١</sup> وثائق الأمم المتحدة حول أريتريا - مرجع سابق ص ٥٣

<sup>٢</sup> موجز تاريخ أريتريا الحديث - مرجع سابق - ص ٢١

<sup>٣</sup> وثائق الأمم المتحدة حول أريتريا - مرجع سابق - ص ٥٤، ٥٣

<sup>٤</sup> موجز تاريخ أريتريا الحديث - مرجع سابق - ص ١٧، ١٦

أريتريا، منعا للنهب الاستعماري لخيرات أريتريا من قبل المحتلين الأثيوبيين<sup>١</sup>.

وبعد الاستقلال ١٩٩٣ أولت الدولة عناية خاصة نحو ثروة البلاد المعدنية. وهي تستعين في ذلك بالخبرة العلمية الفنية في هذا المجال. وذلك مع التركيز تحليليا على:

- ١- المسح الجغرافي لمناطق الثروة المعدنية وتجهيز الخرائط المناسبة.
- ٢- استخدام الأساليب العلمية الحديثة في التنقيب عن الثروة المعدنية.
- ٣- الدراسة العملية المتقدمة لمعرفة نسبة المواد التي يمكن استخلاصها اقتصاديا من المادة الخام.
- ٤- محاولة خلق أسواق في المستقبل لهذه الثروة المعدنية.

وقد تضافرت بعض العوامل الجغرافية لعرقلة استثمار الثروة المعدنية في الأراضي الأريتيرية ومنها:

- ١- ظاهرة التعقد التضاريسي مما يضع حدا للبحث والتنقيب عن الثروة المعدنية كما يبدو من الصورة المرفقة فضلا عن ارتفاع التكاليف.
- ٢- قلة شبكات النقل في هذه الفترة للوصول الى المناجم وصعوبة شق الطرق لضعف الامكانيات التكنولوجية.
- ٣- قلة الأيدي العاملة المدربة والخبرة الفنية فضلا عن الرفض الشعبي للتعاون مع قوى الاستعمار الأجنبي<sup>٢</sup>.

<sup>١</sup> عثمان صالح: تريخ أريتريا ص ٢٢٧



صورة: وتحرك الأهالي الى المرتفعات وخارج الحدود لتغذية  
المقاومة الشعبية

القسم الخامس  
أريتريا ونشاطها الاقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية  
الى فجر الاستقلال ١٩٩٣

خامسا: أريتريا ونشاطها الاقتصادي منذ الحرب العالمية  
الثانية الى فجر الاستقلال ١٩٩٣ :

١- مقدمة:

ففي عام ١٩٤٨ اُحيلت قضية أريتريا (مع ليبيا والصومال) الى هيئة الأمم المتحدة في دورتها العادية الثالثة بناء على طلب من دول الحلفاء للنظر في تقرير مصير المستعمرات الإيطالية بعد هزيمة المحور الألماني - الإيطالي في نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد أقرت الجمعية العمومية مشروعا يقضي باستقلال كل من ليبيا والصومال. واجلت القضية الأريتيرية للدورة العادية المقبلة. فكان الخلاف حول مستقبل أريتريا أشد بكثير مما هو بالنسبة للصومال وليبيا. وكان لكل من بريطانيا وأثيوبيا وأمريكا أطماع في أريتريا صريحة. وتقدمت بريطانيا بمشروع يدعو الى ضم القسم الجنوبي الشرقي من أريتريا الى دولة أثيوبيا حليفها. وضم القسم الشمالي والغربي الى السودان لتدعيم التكامل الجغرافي بين أراضي كل من أريتريا والسودان وهي مستعمرة تابعة للتاج البريطاني<sup>١</sup>.

أما اثيوبيا فطالبت بضم كل أريتريا الى أراضيها فهي تشكل جبهتها الاستراتيجية والاقتصادية المطلّة على البحر الأحمر

<sup>١</sup> موجز تاريخ أريتريا الحديث - مرجع سابق ص ٩ ومابعدها

وأثبتها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أخذت وعدا من الامبراطور بمنحها تسهيلات وقواعد عسكرية في الأراضي الأريتيرية المطلّة على البحر الأحمر. وذلك لتدعيم خطها الاستراتيجي الذي يمتد من المحيط الهادي الى المحيط الهندي عبر البحر الأحمر قناة السويس والبحر المتوسط. ويمتد مخترقا مضيق جبل طارق الى المحيط الأطلسي حتى قناة بنما التي تسيطر عليها أمريكا. فهو أطول وأهم خط استراتيجي في العالم.

لما المعسكر الشرقي فقد أوصى باعطاء أريتريا حق تقرير المصير. وسأنته في ذلك كل من لبنان والمملكة العربية السعودية.

وانتهت المناقشة باصدار قرار بتاريخ ١٢/٢/١٩٥٠، رقم ٣٩٠ يدعو الى قيام اتحاد فدرالي بين أريتريا وأثيوبيا. تتمتع فيه أريتريا بحكم ذاتي في اطار الاتحاد مع أثيوبيا. وتتركز مهمة الاتحاد في الدفاع والشؤون الخارجية والنقد والمالية والتجارة والمواصلات.

وفي عام ١٩٥٢، نفذ القرار بإشراف مندوب الأمم المتحدة والادارة البريطانية. وبدأت أثيوبيا تلغي بنود الاتحاد تدريجيا. فاقفقت الصحف وحلت الأحزاب السياسية والتقابلات كما سيطرت على الجمارك وجميع مرافق الاقتصاد الأريتري. وفي عام ١٩٦٢، ألغى الاتحاد وأصبحت أريتريا ولاية أثيوبية دون أي تدخل من الأمم المتحدة. ودخلت أريتريا في ضمور اقتصادي. الا أن المقاومة الشعبية بدأت تنمو تدريجيا ولاسيما بعد سقوط الامبراطورية وظهور الحكم العسكري في أثيوبيا ١٩٧٤، كرد فعل للثورة في أريتريا وتردي الأوضاع

الاقتصادية وضعف النظام مع انتشار الفوضى في كل البلاد. واستمر الكفاح الثوري بتكوين جبهة التحرير الأريتيرية التي بدأت ترعى مصالح البلاد الاقتصادية في الأراضي التي اشرفت عليها. واتسع نفوذها تدريجيا حتى أنهى بالاستفتاء على تقرير المصير في أبريل ١٩٩٣، بإشراف الأمم المتحدة فنالت أريتريا استقلالها كدولة مستقلة ذات سيادة. وبدأت في إعادة تقييم البناء الاقتصادي ومدى ارتباطها بجيرانها والمنظمات الدولية المختلفة.

## ٢- الزراعة والثروة الحيوانية:

أريتريا بلد غني نسبيا في موارده الطبيعية. الا أن إمكاناتها الزراعية لم تستثمر على الوجه الأكمل لاهمال الدول التي استعمرتها ادخال تطورات فنية حديثة في مجالي الزراعة والصناعة. هذا فضلا عن عدم الاستقرار الذي عاشته البلاد في ظل الاحتلال الأثيوبي. وهي تستطيع أن تنتج المزيد من المحاصيل اذا احسن استثمار أراضيها القابلة للزراعة كما أشرنا سابقا.

وتتمثل أهم الأراضي الزراعية في الأودية النهرية لكل من أنهار القاش وسيتيت وبركة فالترية سوداء غنية بعناصرها المعدنية والعضوية مع تعدد مصادر المياه ممثلة في المياه الجوفية والنهرية الجارية ومياه الأمطار وفقا للمعدلات التي أشرنا إليها من قبل ما بين ٢٠ الى ٢٥ بوصة سنويا (٥٠٠ الى ٦٢٥ مم). كما تمتد الأراضي الصالحة للإنتاج الزراعي على طول المدرجات الاخدودية والأحواض الهضبية الداخلية وتقدر

مساحة الأراضي القابلة للتوسع الزراعي نحو خمسة ملايين من الأفدنة بالإضافة إلى التوسع في أراضي المراعي والغابات.<sup>١</sup>

وتتمتع منطقة قندع وقفل بأعلى منسوب للمياه فيصل إلى نحو ٢٥ بوصة سنوياً. وذلك لهطول الأمطار طول العام. فهي منطقة هامة لزراعة البن.

ونلاحظ أن سكان الهضبة من المزارعين بينما تسود حرفة الرعي في السهول الشرقية والشمالية الغربية فسكانها شبه رحل يمتلكون المواشي ويحترفون أيضاً الزراعة. وهكذا يسكن نحو ٧٨٪ من الأهالي أراضي الريف الزراعية ولذلك فإن معظم صادرات أريتريا تشكل محاصيل زراعية:

#### أ- المحاصيل الرئيسية:

ويساعد اختلاف أنواع التربة، وتنوع المناخ، وتباين مظاهر السطح من سهول منخفضة وأودية في شبكات متشعبة وهضاب مرتفعة مموجة السطح وحافات اخدودية انكسارية على شكل مدرجات، كل هذه العوامل الجغرافية تتكامل في تدعيم ظاهرة التباين في الإنتاج الزراعي على مدار فصول السنة المختلفة.

وتكون الحبوب ٨٧٪ من مجموع المحاصيل.<sup>٢</sup> أما البذور الزيتية فتكون ١٠٪. والباقي يتمثل في خضروات وألياف وبن وتبغ وقطن وموالح وفاكهة مدارية. والذرة هو الغذاء الرئيسي

<sup>١</sup> عبدالقادر جيلاني: أريتريا القضية والتحدى - ١٩٨٨ ص ٥٤

<sup>٢</sup> موجز تاريخ أريتريا الحديث - مرجع سابق - ص ٢٤ وما بعدها



للسكان في اراضي السهول بينما الطاف والقمح تسود زراعتهما على الهضبة. ويزرع الشعير في بطون الأودية الجافة كما تزرع مساحات صغيرة من الذرة الشامية على المنحدرات الشرقية وكذلك الفول والحمص والحببة. وتزرع الخضروات والفاكهة قرب المدن للاستهلاك المحلي مع فائض للتصدير للخارج وهي تجدد سوقا ناجحة في حوض البحر الأحمر.

وأما الموز فقد ادخل الى أريتريا من الصومال. ويزرع بنجاح في وادي بركة في مساحة نحو ١٠,٠٠٠ فدان. وأمتدت زراعته الى سهول البحر الأحمر إذ أن العوامل الجغرافية تلائم التوسع في زراعته من تربة طفالية معتدلة التماسك متسوية الانحدار ومياه الري متوفرة مع رطوبة الجو والحرارة المناسبة.

والقطن. أمتدت زراعته الى الأراضي المنخفضة الشرقية وفي الأودية النهرية حيث التربة الطفالية السمكية، والتربة الطفالية السوداء وهو من النوع قصير التيلة ويستهلك محليا. ويمكن التوسع في زراعته ولاسيما في وادي بركة ووادي القاش متمما لنطاق القطن السوداني الشرقي كزراعة في نصف السنة الصيفي وفق دورة زراعية ثلاثية تهتم بزراعة الأعلاف والبقوليات لتعويض اجهاد التربة بعد زراعة القطن. وأمطار الصيف مع استخدام المياه الجوفية تكفي لحاجات هذه الزراعة. وتجد أريتريا سوقا ناجحة لها في أثيوبيا وجيبوتي والصومال وشرق افريقيا واليمن.

والمنحدرات الاخضورية المطللة على البحر الأحمر تمثل اقليةا مهما لزراعة البن حيث تتجمع كل المقومات الجغرافية للتوسع في زراعته من تربة طفالية سمكية غنية

بغناصرها المعدنية والعضوية على المدرجات ومناخ مداري مناسب وأمطار متوفرة على مدار السنة. وهذه هي بيئة البن في كل من أريتريا واليمن على الجانب المواجه من حوض البحر الأحمر. والبن الأريتري من النوع الجيد ولكن الانتاج بكميات قليلة للاستهلاك المحلي. وقد أهملت زراعته في عهد الادارة البريطانية. ثم اعيد الاهتمام بزراعته بعد ذلك. ومجال التوسع الزراعي للبن يسمح بوجود فائض للتصدير في المستقبل ولاسيما الى السوق العربية التي تستهلك كميات كبيرة من البن فحجم هذه السوق يزيد على ٢٥٠ مليون نسمة.

والتبغ يعتبر من الزراعات المعروفة قديما في أريتريا وتتركز زراعته في الأراضي الشمالية والشمالية الغربية ولاسيما في محافظات كرن وأغرdat والساحل حيث المناخ المعتدل الدافئ. ويستهلك الانتاج محليا وفي السنوات الاخيرة بدأت أريتريا التوسع نسبيا في زراعة التبغ. ويمكن في المستقبل خلق سوق رائجة له في السودان وغرب افريقيا.

وشجرة الزيتون<sup>١</sup> البري منتشرة في اودية أريتريا النهرية والسهول التي تحيط بالهضبة في شكل هلالى يتقوس نحو البحر الأحمر. وبدء في زراعة شجرة الزيتون للاستهلاك المحلي. ويرجح أن هذه الشجرة نقلت الى حوض البحر الأحمر من الساحل الشرقي للبحر المتوسط وهو وطنها الاصلي. وسهول أريتريا الشمالية وهضابها الداخلية تشكل اقليما مناسبة لزراعة شجرة الزيتون والتي نجحت زراعتها في مثل هذه الظروف

<sup>١</sup> د. محمد صبحي عبدالحكيم وآخرون: الوطن العربي أرضه وسكانه وموارده - القاهرة - ١٩٦٨ ص ٢٨٠ وما بعدها

المناخية في منخفضات الشمال المصري والشمال الليبي مثل واحة سيوه وواحات الجغبوب وغدامس في ليبيا. وهذه الشجرة مصدر هام للزيوت النباتية الأساسية للأمن الغذائي في كل حوض البحر الأحمر والشمال الأفريقي والغرب الآسيوي. وعرفت في كل هذه الأراضي منذ فجر التاريخ.

ونبات الألياف يشكل ثروة نباتية هامة في أريتريا. ويستعمل في بناء الحواجز والأسوار<sup>١</sup> وقد انتشرت زراعته في كل الريف الأريتري بمساحة تقدر بنحو ٣٠٠٠ هكتار. هذا، بالإضافة إلى غلات أخرى متنوعة منها الحبوب الزيتية كالسمسم والخضروات والفاكهة والحمضيات والبقوليات. ولذلك فإن البلاد تتمتع باكتفاء ذاتي بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية إلى حد كبير ولا تستورد الحبوب إلا في حالة مواسم الجفاف ولا سيما على طول الساحل السهلي الأريتري لمسافة نحو ١٠٠٠ كم.

وأما الثروة الغابية ففي أريتريا أنواع مختلفة من الأخشاب تعتمد عليها بعض الصناعات المختلفة. وخاصة الدوم الذي ينبت على ضفاف نهري بركة والقاش. ويدخل في تركيب عدد من الصناعات كالزراير والخمور وعلف الماشية وغيرها. وتعد الغابات من أهم مصادر الثروة في البلاد، فهي توفر العلف للماشية والأخشاب للبناء والحطب والفحم النباتي واللبن. تصنع الأرزار من منتجات الدوم. وتساعد أشجار الدوم على حماية التربة من التعرية. وأشجار (اليوفوريبيا - Euphorbia) ذات الأغصان المتفرعة العديدة تنمو في الهضبة والمرتفعات الشمالية

<sup>١</sup> موجز تاريخ أريتريا الحديث: مرجع سابق - ص ٢٥

وتصنع منها أعواد الكبريت كما أن من سائلها اللبني المر تستخرج بعض الأدوية الطبية (Milky Acrid Juice) . كما تشير إلى القيمة الاقتصادية لأشجار اللبان والصمغ العربي.

#### ب- المشكلات:

الآن الزراعة في أريتريا تعاني من مشكلات جغرافية جوهرية من أهمها:

#### ١- تعرية التربة:

لسوء استخدام أراضي الرعي والغابات. فالرعي الجائر وقطع الأخشاب على المنحدرات وتموجات سطح الهضبة أدى إلى تشقق التربة لعدم استقرار حديث مما أدى إلى جرف هذه الشقوق وما عليها من تربة ضعيفة غير متماسكة. وهكذا بدأ التصحر يزحف تدريجياً نحو هذه الأراضي وعلاجاً لهذه المشكلة الحيوية بدء في بعض المناطق بتحويل المنحدرات إلى مدرجات تثبت عليها التربة مع توسع زراعي حديث لحماية التربة من ظاهرة الانجراف. ولاسيما في المنطقة الواقعة ما بين مصوع واسمره وعلى جوانب الأودية النهرية.

#### ٢- إجهاد التربة:

وذلك لعدم اتباع الأساليب العلمية في نظام تتابع المحاصيل الزراعية في نفس قطعة الأرض كما لا تعطي التربة فترة كافية للراحة بين الزراعات المختلفة. هذا بالإضافة إلى ضعف استخدام الأسمدة المناسبة.

وحفاظا على خصوبة للتربة يجب اتباع التوجيهات الآتية:

- أ- التوسع في زراعة البقوليات والحبوب لرفع نسبة المواد الأزوتية في التربة لتجديد خصوبتها. مع التوسع ايضا في حاصلات العلف كالبرسيم وهو مخصص للتربة من ناحية ويعد علفا هاما للثروة الحيوانية من ناحية اخرى.
- ب- نظام تتابع المحاصيل كالمثال الآتي:

السنة	المدة	المحصول
السنة الأولى	من نوفمبر الى مارس	برسيم
	من مارس الى أكتوبر	قطن
السنة الثانية	من نوفمبر الى يونيه	خضروات
	من يوليو الى سبتمبر	اراحة التربة
السنة الثالثة	من أكتوبر الى مايو	حبوب شتوية
	من مايو الى يونيه	اراحة التربة (شراقي)
	من يونيه الى أكتوبر	ذره

ويلاحظ في هذا المثال الذي يستخدم في المزارع الحديثة أن البرسيم وهو نبات مخصب للتربة زرع قبل القطن وهو نبات مجهد للتربة ويعد زرع الخضروات وهي الاخرى مخصبة للتربة. مع ملاحظة اراحة التربة المدة الكافية لاستعادة نشاطها.

وثناء فترة اراحة التربة من الزراعة تجف فتشقق التربة السطحية. وتتسرب اشعة الشمس في الشقوق لتنشيط بكتريا

التربة التي تمتص الأزوت من الهواء وتحوله الى مادة سمادية. وهذه الاضافة العضوية للتربة تزيد في خصوبتها وقدرتها الانتاجية. وفي نفس الوقت تلفظ التربة ما بها من أملاح زائدة الى سطح التربة. وهذه الأملاح الزائدة تغسل بمياه الأمطار أو بمياه الري قبل الزرعة التالية. وهكذا تجدد التربة نشاطها وفق دورة علمية حديثة. ولذلك نلاحظ أن معدلات الانتاج في المزارع الأوروبية ولاسيما الإيطالية في الأراض أريتريا تعطي أرقاما مرتفعة للإنتاج الزراعي بسبب اتباع الأساليب العلمية الحديثة. وبدأ الأهالي بتوجيهات من الهيئات المسؤولة ينتبهون الى أهمية هذا الاتجاه الحديث في الزراعة كما بدأ التطبيق الفعلي العلمي تدريجيا.

ويمكن أن تستفيد الزراعة في أريتريا بالتجربة الناجحة للزراعة الجافة بالشمال الليبي في ظل ظروف جغرافية متشابهة الى حد كبير والمثال التالي لدورة زراعية نجحت في الأراضي الجافة بسهل الجفارة بمشروع وادي ابوشيبة بالصحراء الليبية<sup>١</sup>.

والمساحة الاجمالية للمزرعة هي ١١٢٠ هكتارا مقسمة الى أربعة أقسام بواقع ٢٨٠ هكتارا لكل قسم بحيث يزرع المحصول الرئيسي وهو الفول مرة واحدة كل أربع سنوات في نفس قطعة الأرض كما تزرع محاصيل بباقي الأرض فهي دورة رباعية تتتابع فيها المحاصيل بطريقة علمية يراعى فيها:

أ- عدم إجهاد التربة.

<sup>١</sup> د. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط - الاسكندرية ١٩٨٩ - ص ٣٩، ومابعدها


ب- استخدام الأسمدة المناسبة.

ج- نظام التقنين المائي في الري بحيث يأخذ كل محصول القدر المناسب له من الماء فلا تتجمع مياه زائدة في التربة.

ويلاحظ أن الزراعة أهملت كثيرا أثناء فترة الاحتلال الأثيوبي للبلاد بسبب الحروب الأهلية والفوضى الإدارية. وهكذا اتسعت أراضي السفانا والنباتات المدارية كما يبدو من الصورة المرفقة، وهي توضح هذه النباتات من فصيلة حشائش السفانا القصيرة والمتوسطة الارتفاع التي انتشرت على طول السهول الساحلية المطلّة على البحر الأحمر وكذلك على جوانب الأودية والأخوار النهرية<sup>١</sup> ومنها خور القاش وخور بركة ووادي نهر سيتيت الذي يعرف في السودان بنهر عطيره وهو يمتد في منابعه بالأراضي الأريتيرية المجاورة. وقد اهتمت هيئة التحرير والمقاومة الشعبية بعودة الاستقرار النسبي الى الأراضي التي سيطرت عليها.

وهكذا بدأ تدريجيا الزحف الزراعي الحديث نحو أراضي الريف المهجورة. وعادت اليها الحياة تدريجيا. ومع بزوغ شمس الاستقلال يبدأ الانتاج الزراعي الحديث.

<sup>١</sup> موجز تاريخ لريتريا الحديث: مرجع سابق - ص ٢١ وما بعدها



صورة: التوسع الزراعي نحو أراضي الرعي باقليم حشائش  
وشجيرات السفانا





صورة: لاحظ السفانا بتنوع غطائها النباتي وقد زحف التصحر نحوها لاهمال الزراعة والرعي الجائر وقطع الأشجار دون ما يحل محلها من غطاء نباتي، وبدأت تتغير الصورة مع الاستقرار في ظل الاستقلال. (موجز تاريخ أريتريا الحديث - مرجع سابق - ص ٥١).

### ٣- ارتفاع نسبة الأملاح في التربة:

وهذه الظاهرة الجغرافية من أهم مشكلات التربة ولاسيما في الأراضي السهلية المنخفضة الضعيفة الانحدار على طول الشريط السهلي الساحلي المطل على البحر الأحمر وكذلك حول البحيرات وفي بطون الأحواض الداخلية. وذلك لقرب هذه الأراضي من مسطحات ملحية فتتسرب المياه المالحة نحو التربة المجاورة. وتتسبب الأراضي بالأملاح. ومع عمليات التبخر المستمرة تظهر الأملاح على سطح التربة كطبقة ملحية رقيقة بيضاء أو رمادية اللون. وتتحول التربة الى تكتل صخري ملحي. وعلاجها يتمثل في:

أ- الحرث العميق.

ب- غسيل التربة.

ج- حفر مصارف عميقة لتخلص التربة من فائض المياه.

د- اتباع نظام الري المقنن وفقا لما يعرف بنظام التقنيين المائي الحديث " Water Control " بحيث يعطى المحصول القدر الكافي من مياه الري.

ويلاحظ أن هذه الأراضي غنية بمياهها الجوفية التي يجب أن تستثمر مع المحافظة عليها من الاستنزاف السريع فضلا عن مياه الأمطار والمياه النهرية التي اشرنا اليها سابقا.

## ج- الثروة الحيوانية:

اشتهرت أريتريا على طول تاريخها بأنها أراضي المراعي والثروة الحيوانية. وامتدت العلاقات التجارية بينها وبين مصر منذ آلاف السنين. ففي عهد مكة حتشبسوت في النصف الأول من القرن الخامس عشر قبل الميلاد وصلت تجارة مصر حتى الصومال مارة بأراضي أريتريا. واستخدمت قناة سيزومستريس التي ربطت دلتا النيل بالبحر الأحمر وخليج السويس. ومرت سفن مصر عابرة البحر الأحمر إلى الشرق الأفريقي وتطورت العلاقات التجارية ولاسيما في عصر الملك نخاو Neco الذي أنشأ اسطولا مصرية ضخما بقيادة فينيقية. ونقلت الحيوانات والماشية والأخشاب من جنوب البحر الأحمر إلى مصر. وضعفت حركة التجارة بعد ذلك بين أريتريا ومصر في ظل الاستعمار الأجنبي الذي أوضحناه من قبل. وكانت تنقل تجارة أريتريا إلى حوض البحر المتوسط والجنوب الأوروبي<sup>١</sup>.

### ١- وتتمثل مناطق الرعي الرئيسية في:

- ١- نطاق رعي الابل على طول السهل الساحلي للبحر الأحمر وصحراء دنكاليا المجاورة.
- ٢- نطاق الماعز على المنحدرات الاخدودية لقدرتها على تسلق المرتفعات والرعي على الحشائش بين الأشجار المتناثرة.
- ٣- نطاق الأغنام على سطح الهضبة المتموجة حيث حشائش السفانا القصيرة والمتوسطة. وفي المزارع المتناثرة.

<sup>١</sup> مصطفى الشهابي: الجغرافيون العرب - القاهرة ١٩٦٢ - ص ١٥ ومابعدها

٤- نطاق الأبقار ويمتد في الأودية النهرية ولاسيما خور القاش وخور بركة ووادي نهر عطبرة حيث مراعي الأعلاف، بأنواعها المختلفة وهي مراعي غنية.

وقد قدرت الثروة الحيوانية في عام ١٩٦٦ على النحو الآتي:<sup>١</sup>

رأس من الأبقار	٥,٧٥٠,٠٠٠
رأس من الماعز والضأن	٧,٩٥٠,٠٠٠
رأس من الإبل	مليون

ولكن الحروب الأهلية ضد الاستعمار والقوضى الإدارية كل ذلك أدى إلى إهمال الثروة الحيوانية بحيث هبط الرقم الاجمالي إلى نحو عشرة ملايين رأس عام ١٩٧٧.

## ٢- مشكلات التربية:

ولا تزال هذه الثروة الحيوانية في اضمحلال مستمر حتى الوقت الحاضر لأسباب كثيرة جغرافية منها:<sup>٢</sup>

- ١- انتشار الأمراض بين الحيوانات وتظهر أحيانا على شكل أوبئة مما يؤدي إلى اضطراب عمليات التربية. وتقدر هذه الخسائر بنحو ٢٠٪ من قيمة الثروة الحيوانية.
- ٢- عدم الاهتمام بأصل السلالة فالقلاحون والمربون لا يعرفون مدى أنتاج حيواناتهم ليحتفظوا بعالية الانتاج منها. كما أنهم

<sup>١</sup> عبدالقادر جبلائي أريتريا - القضية والتحدى - ١٩٨٨ ص ٥٥ ومابعدهما

<sup>٢</sup> د. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط - الاسكندرية ١٩٨٩ - ص ٨٦ ومابعدهما

لا يعتبرون بأختيار فحول النزو الجيدة. وكثيرا ما تكون مجهولة الأصل أو رديئة النوع مادامت قريبة ميسورة. فالفحل الضعيف ينتج نرية ضعيفة. كما أن الفلاح بجهل نظام تسجيل حيواناته. كما يحدث في الدول المتقدمة. ونظام التسجيل معروف فقط لدى المربين الأجانب.

٣- عدم العناية بنوع الغذاء وكميته مما يؤدي الى قلة النسل وضعف ادرار اللبن. والمعروف أن متوسط ما تدره البقرة من اللبن في السنة هو ٢٠٠٠ رطل بنسبة دهن تصل الى ٤٪ وهذا المتوسط يبدو منخفضا اذا ما قورن بمتوسط ادرار البقرة الفريزمان الذي يصل الى ٩٠٠٠ رطل سنويا. بنسبة دهن تصل الى ٣,٥٪ ومتوسط ادرار أبقار الجرنسي الذي يصل الى ٥٥٠٠ رطل في السنة مع نسبة من الدهن تصل الى ٥,٥٪ ومما يزيد في قلة الادرار والضعف العام أن البقرة في أريتريا كثيرا ما تستخدم كحيوان عمل في الحقل هذا فضلا عن سوء حالة الزرائب التي تبعد كثيرا عن الأوصاف العلمية الأساسية.

وقد تأثرت الثروة الحيوانية كثيرا بحالة الحرب والاضطراب الداخلي في ظل الاستعمار الأثيوبي الذي ظل نحو ثلاثين عاما من الحكم المباشر. ولو أن مزارع تربية الأبقار المهجنة بمحافظة كرن شمال اسمره تعطى بارقة أمل الا أن البلاد في حاجة ماسة الى التوسع في نمو الثروة الحيوانية لاسباب منها:

١- ان التوسع في تربية الحيوان سيؤدي الى وفرة الأسمدة فيقل استيرادها من الخارج. كما انها تساهم في رفع القدرة الانتاجية للتربة لحل مشكلة الأمن الغذائي.

٢- نمو الثروة الحيوانية يؤدي الى تغطية الاستهلاك المحلي والتصدير الى الخارج مما يساهم في تدعيم البنية الاقتصادية للبلاد.

ومع بزوغ شمس الاستقلال لدولة أريتريا المستقلة رسميا في ٤ مايو ١٩٩٣ ينمو الأمل في بناء اقتصاد متكامل حديث.

والنمو الصناعي هو واجهة الاقتصاد الاقليمي للدولة وقد اصيب بشبه شلل في فترة الاحتلال الاجنبي للبلاد. فالشعب كله تحول الى مقاومة شعبية واجهها الاحتلال بشراسة دمرا لاقتصاديات الاقليم محرقا لأراضيه ناهبا ساليا في ظل فوضى ادارية واقتصادية. ومع الاستقلال بدأت الصناعة تنتعش تدريجيا.

٣- ظاهرة تطور النشاط الصناعي الأريتري:

١- مقدمة وتطور نمو الصناعة:

١- تتمتع أريتريا بموقع جغرافي ممتاز مشرفا على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر عند مضيق باب المندب، مما جعلها مركزا من أهم مراكز النشاط الاقتصادي منذ فجر التاريخ. فوصلت اليها سفن فراعنة مصر القديمة لنقل التجارة من أخشاب وجلود ورقيق وعطبور وحبوب. واستمر هذا النشاط التجاري ما بين القرنين الأفريقي وحوض البحر الأحمر والبحر المتوسط طوال عصور التاريخ. ولاسيما بعد فتح قناة السويس ونمو الطريق الملاحي العالمي بين المحيط الهادي والمحيط

الهندي والبحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي إلى قناة بنما في أمريكا الوسطى.

ب- ومع نمو حركة الكشف الجغرافية وانتشار النفوذ الاستعماري عالمياً بهدف البحث عن أسواق تجارية جديدة اتجهت الأنظار نحو حوض البحر الأحمر الذي يمثل القلب من الخط الملاحي العالمي. وتزامن فيه النفوذ الاستعماري. وخضع الإقليم للنفوذ العثماني الذي ضعف مع أواخر القرن التاسع عشر ممهداً الطريق للنفوذ البريطاني. وكانت السهول الشرقية أو صحراء دنكاليا هي أول منطقة ارتكزت فيها إيطاليا بعد الانسحاب المصري العثماني ١٨٨٥. وعقدت إيطاليا اتفاقيات حماية مع مشايخ القبائل المحلية. كما امتد النفوذ الإيطالي نحو الداخل في الهضبة والمرتفعات الاخودية في أراضي قبائل الباريا والكوناما<sup>١</sup>.

وبهزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤١، احتلت قوات الحلفاء أريتريا وأحيلت إدارياً إلى بريطانيا. وفي عام ١٩٤٨، تقدمت بريطانيا إلى هيئة الأمم المتحدة بمشروع لضم القسم الجنوبي الشرقي من أريتريا إلى إثيوبيا وضم القسم الشمالي والغربي إلى السودان الذي كان تحت التاج البريطاني. أما إثيوبيا فطالبت بكل أريتريا كامتداد جغرافي طبيعي لها نحو البحر الأحمر. وأما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أبدت المشروع الإثيوبي بعد الاتفاق السري بينهما بمنح أمريكا قواعد وتسهيلات عسكرية في الأراضي الأريتيرية.

<sup>١</sup> جبهة التحرير الأريتيرية: موجز تاريخ أريتريا الحديث - ص ٧٧ وما بعدها

وفي عام ١٩٥٠، صدر قرار الأمم المتحدة يدعو إلى قيام اتحاد فيدرالي بين أريتريا وأثيوبيا تتمتع بمقتضاه أريتريا بحكم ذاتي في إطار الاتحاد مع أثيوبيا. وفي عام ١٩٥٢، دخل القرار الفدرالي حيز التنفيذ. إلا أن أثيوبيا بدأت في الإلغاء التدريجي لبنود الحكم الذاتي. وتحولت إلى أرض أثيوبية على نحو ما شرحناه. وضعف نشاطها الصناعي وذلك طوال فترة الاحتلال الأثيوبي. ويحسن أن نشير إلى بعض أوجه النشاط الصناعي على النحو الآتي.

فأريتريا بلاد الثروة الحيوانية ومنتجاتها منذ أقدم العصور. وفي أريتريا مراكز للعناية بالماشية وتطعيم الأبقار ضد أمراض الطاعون البقري. وأسس كاشياني في عيلايرعد بالقرب من كرن، مزارع لتربية الأبقار المهجنة، وتصدر منتوجات الألبان والأجبان إلى الأقطار المجاورة، وإلى إيطاليا.

وفي أريتريا أنواع مختلفة من الأخشاب تعتمد عليها الصناعات المحلية، وخاصة شجر الدوم الذي ينبت على ضفاف نهري بركة والقاش، ويدخل في تركيب عدد من الصناعات كالزراير والخمور وعلف الماشية وغيرها. وتملك أريتريا ثروة بحرية هائلة من الأسماك والأصداف واللؤلؤ والملح. وتريد جملة صادرات الثروة البحرية ما يزيد على ٣٠ مليون دولار تستولي عليها السلطات الأريتيرية لتعمل على تنمية هذه الصناعة.

ويبلغ طول الشاطئ الأريتري نحو ألف كيلومتر، ويبتدئ من رأس قصار في الحدود السودانية شمالاً، وينتهي عند باب المندب في رأس أرحينا في الصومال جنوباً، المسمى ساحل عفر



وعيسى. وفيه عدد من المراسي الطبيعية مثل مرسى نكلاي، مرسى قبع، مرسى كيكب، مرسى معدر، مرسى فاطمة، مرسى برعسولي، مرس بيلول. فالمجال كبير في التوسع في صناعة صيد الأسماك.

وتتبع أريتريا ١٢٦ جزيرة، أكبرها جزيرة (دهلك كبير). ويعتقد وجود بترول فيها، ولا يزال البحث عنه جاريا. بالإضافة لتمييزها. وتمتلك أريتريا نحو ٤٠٠ مصنع من مختلف الأحجام، بعضها مثل مصنع النسيج الذي يشغل ستة آلاف عامل والبعض الآخر مجرد ورشة صغيرة تشغل ١٠ عمال. وتكتفي أريتريا ذاتيا بالنسبة الى معظم الصناعات الخفيفة، وتصدر الفائض لأثيوبيا والأقطار المجاورة. وأهم الصناعات الأريتريّة: تعليب اللحوم والفواكه والأسماك والحلويات والجلود والسماد والسجاد والزراير والكبريت والأخشاب والصابون والملح والنسيج والزيوت والمسامير والبلاستيك والنايلون والورق والخمور والحبال والأكياس وصناعة تجميع السيارات والثلاجات والمواسير والأسمنت الخ.... ومعظم هذه الصناعات تتركز في العاصمة أسمرة، ويديرها إيطاليون، بينما معظم خبراتها الآن أريتريون. ويبلغ عدد العمال المشتغلين بالصناعة نحو ١٠٠ ألف عامل. وتعمل الدولة على رفع المستوى تقنيا واقتصاديا<sup>١</sup>.

<sup>١</sup> عثمان صالح: تاريخ أريتريا - مرجع سابق - ص ٢٣٥ وما بعدها

ب- الصناعات:

جدول بالمصانع الأساسية في أريتريا<sup>١</sup>

رقم	الاسم	تاريخ الانشاء	الانتاج السنوي	بلدان التصدير	الموقع	عدد العمال	ملاحظات
١	مصنع الملح	١٩٥٥	١٢٠ ألف طن من الملح	اليابان، زيرير كينيا	مصروع - عصب	١٠٠٠	أقيم مصنع
٢	مصنع التنغ والسجائر	١٩١٧	٧٠ مليون سيجارة سنويا	محلي، اليونان	اسمره		
٣	مصنع الملف الحيواني	١٩٣٤	٥٠ ألف طن من الملف	محلي	اغردات	٦٠٠	٦٠٠٠ موسمين

١ عثمان صالح: تاريخ أريتريا مرجع سابق - ص ٥٧-٥٩

رقم	الاسم	تاريخ الانشاء	الانتاج السنوي	بلدان التصدير	الموقع	عدد العمال	ملاحظات
٤	مصنع الزراير	١٩٣٧	زراير باحجام مختلفة	الاقطار المجاورة ، ايطاليا	كرن	٧٠٠	٦٠٠٠ موسميين
٥	صناعات الاكسجين والهواء المضغوط	١٩٣٨	اوكسجين معبأ للمستشفيات	الاقطار المجاورة	اسمره		
٦	مصنع السجق واللحوم المجففة	١٩٣٩	السجق ولحوم مجففة	محلي	اسمره		

<sup>١</sup> عثمان صالح: تاريخ ليبيا مرآة - ص ٥٧-٥٩

رقم	الاسم	تاريخ الانشاء	الانتاج السنوي	بلدان التصدير	الموقع	عدد العمال	ملاحظات
٧	مصنع البن المبستر والجين	١٩٤١	مليون ونصف لتر من الحليب	محلي	اسمره		
٨	مصنع الايف - كشاني	١٩٤١	٣٠٠٠ طن حبال سنويا	محلي، الاقطار المجاورة	كرن	٥٠٠	
٩	شركة بيرة ملوتي	١٩٤٢	١٦١ مليون زجاجة بيرة و ٢ مليون و ٤٠٠ الف كحول نقي	محلي، الاقطار المجاورة	اسمره	٥٠٠	

رقم	الاسم	تاريخ الانشاء	الانتاج السنوي	بلدان التصدير	الموقع	عدد العمال	ملاحظات
١٠	مصنع العسل والشمع والبوية	١٩٤٢	عسل مطب، وانواع من البوية	محلي	اسمره	٥٠٠	
١١	مصنع الورق	١٩٤٢	٢١,٩٠٠ كنتال	محلي	اسمره	٦٠٠	
١٢	مصنع الكبريت	١٩٤٣	١٣٦ مليون علبة كبريت	محلي، الأقطار المجاورة	اسمره	٥٠٠	

<sup>١</sup> عثمان صالح: تاريخ لريتريا مرجع سابق - ص ٥٧-٥٩

رقم	الاسم	تاريخ الانشاء	الانتاج السنوي	بلدان التصدير	الموقع	عدد العمال	ملاحظات
١٣	مصنع الزجاج	١٩٤٣	١٧ مليون زجاجة متنوعة واكواب	محلي	اسمره		
١٤	مصنع الاسماك	١٩٤٣	٥٠٠٠ طن من سردين مصلب ١٠,٠٠٠ طن من السماك المطحون للسماد	محلي	اسمره		
١٥	مصنع العطور	١٩٤٣	عطور، كريمات، صابون حلاقة	محلي	اسمره		

رقم	الاسم	تاريخ الانشاء	الانتاج السنوي	بلدان التصدير	الموقع	عدد العمال	ملاحظات
١٦	مصنع الزيوت والمكرونة	١٩٤٤	زيوت الطعام، مكرونة	محلي	اسمره		
١٧	مصنع المسامير والبراغي والمفاتيح	١٩٤٤	مختلف انواع المسامير والبراغي والمفاتيح	محلي، اثيوبيا	اسمره		
١٨ -	مصنع الاخشاب الخ	١٩٤٥	اخشاب بناء	محلي، اثيوبيا	اسمره		
١٩	مصنع الصابون	١٩٤٦	٥ مليون قطعة	محلي، اثيوبيا	اسمره	٢٤٠	

رقم	الاسم	تاريخ الانشاء	الانتاج السنوي	بلدان التصدير	الموقع	عدد العمال	ملاحظات
٢٠	مصنع البيض والحلويات	١٩٤٦	١٢٠ ألف صندوق	إيطاليا، ألمانيا	اسمره	٢٠٠	
٢١	مصنع الخل	١٩٤٧	٣٦٠ ألف زجاجة - مختلف أنواع الخل	محلي، بلدان مجاورة	اسمره		
٢٢	مصنع الزيوت	١٩٤٧	٣ آلاف كنتال من الزيوت الصناعية	هولندا	اسمره		



رقم	الاسم	تاريخ الإنشاء	الإنتاج السنوي	بلدان التصدير	الموقع	عدد العمال	ملاحظات
٢٣	مصنع للحوم للشركة الإيطالية البريطانية	١٩٥٠	٤٤ مليون عذبة لحوم وخضروات				

<sup>١</sup> عثمان صالح: تاريخ أريتريا مرجع سابق - ص ٥٧-٥٩

رقم	الاسم	تاريخ الإنشاء	الانتاج السنوي	بلدان التصدير	الموقع	عدد العمال	ملاحظات
٢٤	مصنع النكودي للحوم	١٩٥٢	٩١ مليون علبة، ١٠٩ ألف طن لحم مجمد، ٢٧٠ طن لحم مقطع بزنة كيلوجرام للقطعة، ٣٦ ألف طن عظام مطحونة للسماد، ٤٣ ألف جلد مدبوغ				

رقم	الاسم	تاريخ الإنشاء	الانتاج السنوي	بلدان التصدير	الموقع	عدد العمال	ملاحظات
٢٥	مصنع برالتو للنسيج	١٩٥٧	خيوط الغزل، القماش بأنواع مختلفة به عشرين ألف مغزل و ٤٠٠ منسجة				
٢٦	مصنع الأسمنت	١٩٦٠	أسمنت، أنابيب أسمنت للمجرى				

<sup>١</sup> عثمان صالح: تاريخ ليبيا مرجع سابق - ص ٥٩-٥٧

رقم	الاسم	تاريخ الانشاء	الانتاج السنوي	بلدان التصدير	الموقع	عدد العمال	ملاحظات
٢٧	مصنع البلاط		البلاط الخزفي الفاخر ١٠٠ ألف متر مربع من البلاط				

<sup>١</sup> عثمان صالح: تاريخ لريتريا مرجع سابق - ص ٥٧-٥٩

رقم	الاسم	تاريخ الانشاء	الانتاج السنوي	بلدان التصدير	الموقع	عدد العمال	ملاحظات
٢٨	مصنع دباغة الجلود		الدباغة التقليدية للجلود و يبلغ الانتاج مليون ونصف مليون قدم مربع بالاضافة الى ٢٠٠ طن من جلود النعال ودباغة جلود الحيوانات المفترسة والأفاعي				

رقم	الاسم	تاريخ الانشاء	الانتاج السنوي	بلدان التصدير	الموقع	عدد العمال	ملاحظات
٢٩	مصانع الأحذية الأربعة		أحذية متنوعة، مليون و ٣٠٠ ألف زوج حذاء				
٣٠	مصنع الالمونيوم		انتاج كافة الأدوات المنزلية من الالمونيوم والبلاستيك				



صورة: وجه من أريتريا اذ يسود جنس البحر المتوسط مع  
تأثير زنجي خفيف للموقع الجغرافي مجاورا لافريقيا السمراء -  
جبهة التحرير الأريتريّة: موجز عن تاريخ أريتريا ص ٤٨ -  
مرجع سابق

ويستخلص من هذا الجدول ما يلي:

- ١- يعتمد النمو الصناعي على موارد البلاد الطبيعية من خامات معدنية ونباتية وحيوانية مثل صناعات الملح وديغ الجلود والعلف الحيواني والتبغ والسجائر والزيوت والأخشاب.
- ٢- يتركز معظم النشاط الصناعي في أسمره وما حولها مع صناعات قليلة متناثرة في كل من كرن ومصوع واغردات وعصب.
- ٣- معظم هذه الصناعات من الحجم الصغير للاستهلاك المحلي تحت إشراف خبرة أجنبية.

والتطور الصناعي الحديث يستلزم الاهتمام بالتوجهات الجوهرية الآتية:

- ١- توسيع القاعدة الصناعية لتشمل كل المحافظات مما يمهّد لتوزيع عادل في النشاط الصناعي والأيدي العاملة وخلق أسواق محلية.
- ٢- الاهتمام بتشجيع النمو الصناعي معتمداً على الخامات المحلية لتغطية الاستهلاك المحلي مع فائض للتصدير وفقاً لموقع أريتريا الممتاز.
- ٣- الاهتمام بتسمية الخبرة الوطنية تمهيداً لخلق جيل جديد من الأيدي العاملة المدربة فنياً تحت إشراف فني من خبراء وطنيين.
- ٤- التوسع السريع في التنقيب عن مصادر الثروة المعدنية وتطوير الخامات النباتية.
- ٥- الاهتمام الجوهري في مد شبكات النقل لخلق أسواق جديدة.



### ج- المواصلات والتقسيم الإداري:

وتمتلك أريتريا شبكة مواصلات جيدة، فتبلغ طرقها المعبدة ٣٠١٦ كيلومترا تربط كل المدن الأريتيرية. كما تمتلك سكة حديد يبلغ طولها ٣٠٦ كيلومترات ابتداء من مصوع حتى اغردات مرورا باسمرة، وهو خط واحد، ويخترق ٣٥ نفقا.

وتتقسم أريتريا إداريا إلى تسع محافظات هي:

- ١- محافظة حماسين وعاصمتها اسمرة، وهي العاصمة للقطر، وعدد سكانها ٣٠٠,٠٠٠ نسمة.
- ٢- محافظة البحر الأحمر، وعاصمتها مصوع، وهي ميناء أريتريا الرئيسي وعدد سكانها ٥٠,٠٠٠ نسمة.
- ٣- محافظة دنكاليا، وعاصمتها عصب، الميناء الثاني لأريتريا، وعدد سكانها ٣٠,٠٠٠ نسمة.
- ٤- محافظة الساحل، وعاصمتها نفقة.
- ٥- محافظة كرن، وعاصمتها كرن.
- ٦- محافظة سراي، عاصمتها عدي وقرى.
- ٧- محافظة اكلي قوازي، وعاصمتها عدي قبيح.
- ٨- محافظة بركة، وعاصمتها اغردات.
- ٩- محافظة القاش، وعاصمتها بارنتو.<sup>١</sup>

ويشكل اختلاف المناخ والبيئة الجغرافية عاملا مهما في حياة السكان وإزدهارهم. وترتبط أريتريا شعبا وأرضا بروابط

<sup>١</sup> عثمان صالح: تاريخ أريتريا - مرجع سابق - ص ٢٣٨ ومابعدا

اقتصادية لا تنقسم. ويبلغ عدد سكان أريتريا نحو ثلاثة ملايين نسمة.

## الفصل الحادى عشر إفريقيا جنوب الصحراء

### المحتويات

#### مقدمة

- ١ - ظاهرة المد الهضبي.
- ٢ - ظاهرة الأحواض النهرية.
- ٣ - ظاهرة الأخدود الإفريقى.
- ٤ - ظاهرة السهول الساحلية.
- ٥ - التنوع المناخى النباتى.
- ٦ - ظاهرة النمو السكانى.

#### (ولا : دول الحزام الصحراوى)

- ١ - جمهورية مالى.
- ٢ - جمهورية النيجر.
- ٣ - جمهورية تشاد.

#### ثانيا : (قطار غرب إفريقيا

- ١ - جمهورية السنغال.
- ٢ - جمهورية نيجيريا.
- ٣ - جمهورية غانا.

#### ثالثا : (قطار شرق إفريقيا

- ١ - أوغندا.
- ٢ - جمهورية كينيا.
- ٣ - جمهورية تنزانيا.
- ٤ - جمهورية أثيوبيا.

#### رابعاً : دول إفريقيا الاستوائية

- ١ - جمهورية زائير (الكنغو).
- ٢ - جمهورية إفريقيا الوسطى.

#### خامساً : دول إفريقيا الجنوبية

- ١ - جمهورية زامبيا.
- ٢ - جمهورية جنوب إفريقيا.

#### سادساً : الجزر الإفريقية

- ١ - جمهورية مالاغاش (جزيرة مدغشقر).
- ٢ - جزر القمر.
- ٣ - جزر كنارى.

#### الخاتمة

- ١ - خريطة معدل المطر السنوى بإفريقيا المدارية والجنوبية.
- ٢ - الهجرات الى إفريقيا وتحرك الموجات السكانية فى حوض النيل.
- ٣ - الحزام الصحراوى.
- ٤ - إثيوبيا وإفريقيا الشرقية.
- ٥ - إفريقيا الجنوبية.

## مقدمة

ان إفريقيا جنوب الصحراء تشكل أكثر من نصف مساحة القارة وتتناز بعدة ظاهرات جغرافية متباينة نلخصها على النحو الآتى :

## ١- ظاهرة المد المضئى :

فهى تتسع فى نطاق هضبى ضخام مابين خط عرض ٠ شمالاً حتى الأطراف الجنوبية للقارة . ويفصلها عن إفريقيا الشمالية منخفض حوض بحر الجبل ومايجاوره من الأراضى .

وهذا الانخفاض الكبير هو احدى مناطق الهبوط الحديثة فى افريقية ، فهذه المنطقة كانت جزءاً من الهضبة الافريقية قبل أن تهبط ، وما يقرى هذا الرأى أن التشابه تام فى البنية بين الأقاليم التى جنوبها واقليم جبال النوبا وكردفان <sup>(١)</sup> .

ويغطى هذا الحوض طبقات رسوبية تفتتت من الصخور المتحولة التى تتكون منها الهضاب المجاورة . فتظهر التربة الطفلية الحمراء فى القسم الجنوبى الغربى من هذا الحوض ، وتتميز هذه التربة بارتفاع نسبة أكاسيد الحديد بها . وتغطى باقى الحوض تربة رسوبية فيضية <sup>(٢)</sup> طينية من أهم صفاتها أنها تتكون من ذرات دقيقة وأنها شديدة التماسك ، كما أنها رديئة الصرف ، وذلك لشدة ضعف الانحدار العام .

ونظراً لأن انحدار الحوض يبدو ضعيفاً للغاية كان بحر الجبل والغزال يسيلان فى مجرى منخفض الجوانب بحيث لايمكن لأيهما أن يحتوى مياه الفيضان ، فتفيض مياه النهر عن جانبيه وتنتشر المستنقعات ، وهذه نتيجة لازمة

(١) وأ « محمد عوض محمد . نهر النيل ص ٧٧ - ٧٨

E. Krenkal Geologie Afrikas, p132. «ب»

I D Tothill Agriculture in the Sudan London 1952 Map. p 88. (٢)

لتضاريس أحواض هذه الأنهار . وتكوين المستنقعات هنا ظاهرة سائدة فالأمطار يصعب تصريفها لاستواء الأرض فى أجزاء كثيرة من هذا الحوض والأرض بطبيعتها لا تتشرب المياه بسهولة . وقد يتحتم أحيانا ردم طرق وسط المستنقعات حتى يتيسر الانتقال من جهة الى أخرى ، وكثيرا ما يقيم الأهالى حاجزا يحول دون تسرب المياه الى قراهم ومنازلهم .

وفى فصل الأمطار تتحول أقطار شاسعة الى مستنقعات . وبعضها من النوع الدائم كما هو الحال فى الجزء الأدنى من بحر الجبل وبحر الغزال ، وهذه تسمى بالسدود وهى نتيجة مباشرة لحالة الاقليم من الناحيتين المناخية والنباتية ، والسد كتل من النبات تعترض مجرى النهر .

## ٢ - ظاهرة الأحواض النهرية :

تمثلة فى حوض الكنفو الذى يمتد فى حوض كبير الى الشمال الغربى من الجنوب الإفريقى . ويقع الى الغرب من هضبة البحيرات العظمى أو الهضبة الإستوائية . وينبع هو وروافده النهرية الرئيسية من الحافة الغربية للفرع النيلى الغربى من الأخدود الإفريقى . ولا سيما رافده أوبانجى الذى ينبع من خط تقسيم المياه الذى يفصل بين النيل والكنفو .

وحوض بحيرة فكتوريا التى ينتهى إليها نهر كاجيرا Kagera المنبع الأول لنهر النيل . ويخرج منها نيل فكتوريا نحو حوض السودان الجنوبى إذ يصب فى بحيرة ألبرت التى ينبع منها نيل ألبرت ليدخل السودان الجنوبى باسم نهر بحر الجبل فى منخفض حوضى كبير أشرنا إليه .

وحوض نهر زمبيزى Zambezi الذى ينبع من مرتفعات أنجولا Angola مع روافده التى تتجمع نحو الجنوب الشرقى قرب شلالات فكتوريا ليمتد النهر بعدها فى تقوس اخدودى ضخم ينثنى بعده نحو الجنوب الشرقى ليصب فى المحيط الهندى بدلتاه عند ميناء شندى Chinde.

وحوض نهر لمبوبو Limpopo الذى ينبع من مرتفعات دراكنزبرج Drakensberg وهى الحافة الجبلية الجنوبية الشرقية للهضبة الجنوبية مطلة على إقليم ناتال . ثم يتجه النهر نحو الشمال الشرقى لينثنى فى تقوس كبير نحو الجنوب الشرقى ليصب فى المحيط الهندى الى الشمال الشرقى من مدينة لورنسو ماركيز Lourenco Marques وقرب المصب يرفده نهر تشن جين Chengane .

وحوض نهر أورنج الذى ينبع هو الآخر من مرتفعات دراكنزبرج مع رافده الرئيسى نهر فال Vaal . ثم يتجه نهر أورنج Orange غرباً فى عدة ثنيات نهريّة مع إنحدار ضعيف حتى يصب فى المحيط الأطلسى الجنوبى الى الشمال من ميناء نولووث Port nolloth فى إقليم شبه جاف جنوب صحراء ناميب .

وينتهى الى هذه الأنهر الرئيسة عدد كبير من الروافد التى تقطع الهضبة الجنوبية على طول إنكسارات قديمة وتقل مياهها كثيراً فى فصل الجفاف فى نصف السنة الصيفى . كما ينتهى بعض منها الى بحيرات وسبخات بحيرية داخلية مثل بحيرة مويرو Mweru وبحيرة بانج ويلو Bangweulu ومستنقعات أوكافانجيو Okavango بأواسط الهضبة الجنوبية .

### ٣ - ظاهرة الأخدود الإفريقى :

وهى من أهم الظواهر التى يمتاز بها إقليم الهضبة الإفريقية الجنوبية إذ يمتد هذا الأخدود العظيم فى القسم الشرقى من الهضبة الجنوبية من قرب مصب نهر الزمبيزى متجهاً صوب الشمال فى خانق أخدودى طويل مركب بهبوط القاع وإرتفاع الجوانب الجبلية الشديدة الإنحدار . والقاع يبدو موجاً فى سطحه فتكونت بحيرات طوليه فى الأجزاء الأكثر إنخفاضاً مثل بحيرة نياسا Nyasa أو ملوى وبحيرة تنجانيقا Tanganyka . والى الشمال من بحيرة نياسا ينفرج الأخدود الى فرعين رئيسيين بين أحدهما الفرع الحبشى أو الشرقى مخترقاً جنوب

هضبة الحبشة فى مد أخذودى نحو البحر الأحمر بخليجيته خليج السويس وخليج العقبة يحصران بينهما شبه جزيره سيناء . وأما الفرع الغربى أو النيلى فيمتد محتضناً بحيرات تنجانيقا وكيفو Kivu وإدوارد Edward وألبرت Albert حيث ينبع نيل فكتوريا مخترقاً السودان الجنوبي باسم نيل بحر الجبل . وتقع بين فرعى الأخدود الهضبة الإستوائية وبحيرة فكتوريا .

وقد تصدعت هضبة الجنوب الإفريقى كرد فعل لنمو هذا الاخدود العظيم فإندفعت الى أعلا حافة دراكنز برج فى نطاق جبلى كما تكونت المدرجات الجبلية بجنوب الهضبة منها حافة الكارو الكبرى Great karroo وحافة الكارو الصغرى Little karroo قرب رأس الرجاء الصالح .

هذا بالإضافة الى انتشار البحيرات الحوضية وخطوط الإنكسارات التى تشكل المجارى العليا للأنهار الرئيسية وروافدها .

#### ٤ - ظاهرة السهول الساحلية :

إذ يمتد شريط ضيق من سهول ساحلية يحيط بالجنوب الإفريقى غرباً وجنوباً وشرقاً . تشرف عليه حافات هضبية شديدة الإنحدار فى معظم أجزائها . ويتسع السهل قليلاً فى قسمه الشرقى ما بين ناتال Natal حتى القرن الإفريقى عند خليج عدن ليعود ضيقاً جداً أمام سواحل البحر الأحمر . وذلك لضحولة مياه المحيط الهندى أمام هذه السواحل وتصدع التركيب الصخرى للهضبة مع نمو الاخدود الإفريقى وغزارة الامطار معظم العام بفعل الرياح الجنوبية الشرقية المحيطية مما أسهم فى تراجع حافة الهضبة وغو السهل الساحلى المتوسع نسبياً . وقد قطعت هذه السهول بعدد كبير من الأودية النهرية والأودية الجافة الموسمية وهى قصيرة سريعة الجريان مما أدى الى خلق عدد كبير من الشلالات النهرية فى خط طولى هو خط الشلالات Fall Line يشبه نظيره أمام السهل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية . ويستغل فى توليد الطاقة الكهربائية . وتقل الجزر



أمام هذه السهول إلا من مجموعة جزر زانزيبار Zanzibar ومجموعة جزر القمر Comoro وجزيرة مدغشقر Madagaskar وكلها أمام الساحل الشرقى .

#### ٥- التنوع المناخى النباتى :

إذا تمتد الهضبة الإفريقية الجنوبية ما بين خط الإستواء الى خط عرض ٣٥ جنوباً فى مد عرضى أقل بكثير من المد العرضى الإفرقى بالصحراء الكبرى مما جعلها تخضع للمؤثرات البحرية من المحيطين الهندى والأطلسى إذ تتوغل الرياح المحيطية إلى وسط الهضبة الإفريقية الجنوبية على مدار العام ، مما جعل صحراء كاهارى تشغل مساحة صغيرة بجنوب غرب الهضبة حتى سواحل المحيط الأطلسى نتيجة لوصول الرياح الجنوبية الشرقية الى الداخل شبه جافة مع هبوب الرياح المحيطية الأطلسية موازية للساحل الغربى دافعة مياه تيار بنجولا البارد شمالاً فلا تسقط إلا القليل من الأمطار .

وتتأثر الهضبة الجنوبية بالضغط المنخفض الإستوائى شمالاً بطول العام وبالضغط المرتفع الدائم على المحيطين الهندى والأطلسى فهى مسرح لهبوب الرياح المحيطية ولاسيما الشرقية والجنوبية الشرقية على مدار العام . مما أدى الى خلق تنوع مناخى نباتى يتمثل فى :


(أ) المناخ المدارى الحار مع أمطار معظم العام فى نطاق يمتد ما بين هضبة البحيرات وهضبة أنجولا مع غطاء من حشائش السفانا وشجيرات متناثرة .

(ب) مناخ معتدل دفىء فى جنوب وجنوب شرق القارة يمتد ما بين إقليم موزمبيق حتى حوض نهر الأورنج . وأمطاره هو الآخر معظم العام بمعدل ما بين ١٠٠٠ الى ٥٠٠ مم وتصل فى حوض الاورنج ما بين ٢٥٠ - ٥٠٠ مم . وتقل فى اتجاه غربى نحو الساحل .

ج ( مناخ شبه جاف : فى الإقليم الداخلى إذ تصل الرياح شبه جافه وقد اسقطت معظم أمطارها فى إقليمى موزمبيق ودراكنزبرج شرقاً . وتتراوح الأمطار بين ٢٥٠ الى ١٠٠ مم وتقل كثيراً فى الغرب نحو صحراء ناميب والساحل .

د ( مناخ البحر المتوسط : فى الطرف الجنوبي للقارة حول مدينة الكاب Capetown مناخ حار جاف صيفاً ودفىء مطر شتاءً . والأمطار إعصارية بفعل الرياح الغربية والجنوبية الغربية شتاءً . وفى الصيف تصل الرياح الجنوبية الشرقية والشرقية جافة .

وفى الأقاليم المناخية الثلاثة الأخيرة تسود حشائش الإستبس مع بعض الأشجار فى كثافة نباتية متفاوتة وفقاً لغزارة الأمطار وفترة سقوطها . وقد إمتد التوسع الزراعى فى مساحة كبيرة لزراعة الحبوب والاشجار الإقتصادية ومزارع العلف لتربية الثروة الحيوانية .



## ٦ - ظاهرة النمو السكاني :

إذ يسود الجنس الزنجي في إفريقيا جنوب خط الإستواء . في كثافة سكانية تتراوح ما بين ٥٠ الى ٦٠ نسمة في الكيلو متر المربع في معظم الهضبة والسهول الساحلية والجزر المجاورة . وتهبط هذه النسبة الى أقل من ١٠ نسمة كم في الأجزاء الداخلية المنعزلة شبه الجافة لتصل الى أقل من ١ نسمة كم في الصحارى الداخلية والممتدة حتى الساحل الغربى فى صحراء ناميب . وقد إرتفعت الكثافة السكانية الى أكثر من ٦٠ نسمة كم في المدن والأراضى الزراعية الكثيفة لاسيما فى جنوب وجنوب شرق الجنوب الإفريقى حيث المناخ المعتدل الدفء المطر والتربة الخصبة والشبكات النهرية .

وقد تأثر التركيب الجنسى الزنجي ولاسيما على طول الحزام الصحراوى الافريقى الذى يمتد ما بين أراضى إريتريا المطله على البحر الاحمر وأراضى مالى والسنغال حتى المحيط الأطلسى فعلى طول هذا النطاق إختلطت الدماء العربية الحامية بالدماء الزنجية التى إمتدت جنوباً مع الزحف العربى . وإنتشر الدين الاسلامى بين غالبية السكان كما انتشرت اللغة العربية . وامتد التوغل الاقتصادى العربى فى كل هذا النطاق منذ فجر التاريخ آخذاً المجالات الآتية : فى هذا النطاق العريض والأراضى المجاورة جنوباً . وذلك على شكل يتمثل فى انتشار طرق القوافل : التى تربط افريقيا الزنجية وحوض البحر المتوسط ومن أشهرها الطريق السودانى المصرى الذى كان يبدأ من أراضى الحبشة الى جوبا فى الجنوب السودانى ومنها الى الملكال على النيل الأبيض ثم يمتد الطريق مستخدماً مياه النيل حتى الخرطوم ثم الطريق البرى الى أسوان والعودة الى النيل حتى الشمال المصرى . وكان يلتقى مع هذا الطريق طريق آخر يعبر البحر الأحمر حتى مدينة القصير ومنها يمر فى وادى الحمامات الى قنا على النيل فى جنوب مصر .

ومن طرق القوافل الاخرى ما يسمى بالطريق الليبى الشرقى الذى كان يمتد

من تشاد الى منخفض الكفرة ومنها الى بنغازى وكان يلتقى مع هذا الطريق فرع آخر يبدأ من غرب السودان ماراً بالأبيض والفاشر ثم يخترق أرض تشاد ليرتبط بالطريق الليبي .

وكذلك طريق القوافل الليبي الغربى الذى كان يمتد من النيجر الى غات ومنها الى سبها وغدامس وطرابلس ، وكل هذه الطرق تبدأ من أراضى الجنوب الإفريقى حاملة الرقيق وتجارة الإقليم للأخشاب وأعشاب طبية وحبوب وجلود وغيرها . وتغير هذا الوضع الذى ساد طوال العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر وذلك مع التوسع فى الكشوف الجغرافية والاستعمار الأوروبى . فألغى نظام تجارة الرقيق مع أوائل القرن العشرين الغاء تاماً من العالم . وبدأت حركات التحرير والاستقلال فى إفريقيا السوداء . إذ تكونت جمهوريات مستقلة انتظمت فى منظمة الوحدة الإفريقية التى تعمل على خلق جو من التكامل والتعاون تجارياً وثقافياً وحضارياً ودينياً ولغوياً وإعلامياً بين دول كل القارة من ناحية . وبينها وبين العالم الخارجى من ناحية أخرى . كما تعمل لخلق سوق إفريقية مشتركة مثل الكتلات الاقتصادية الكبرى الأخرى .

### أولاً : دول الحزام الصحراوي

وهي ممثلة في جمهوريات مالي والنيجر وتشاد . وكانت من المستعمرات الفرنسية . وعلى الرغم من المساحة الواسعة لهذه الجمهوريات بنحو ٣,٣٩٧,٠٠٠ كم<sup>٢</sup> فلا يتجاوز عدد سكانها ١٦ مليون نسمة . إذ يسود المناخ الصحراوي الجاف فحدد من مناطق الإنتاج الزراعي قاصرة على وادي نهر النيجر والأطراف الجنوبية في نطاق هامشي للمناخ المداري الممطر المجاور . وهي لا تزال متخلفة في الإنتاج المعدني . وتشكل بلاداً داخلية بعيدة عن المؤثرات البحرية مما زاد في فقرها . فهي تعتمد في اتصالها الخارجي وتجارتها على جاراتها من الأقطار المطلة على المحيط الأطلسي والتي تشكل سوقاً تستقبل فائض عملاتها للعمل في مزارع ومناجم ومصانع ومتاجر والخدمات العامة لهذه الأقطار المجاورة . فالهجرة الموسمية تشكل مخرجاً لإمتصاص الأيدي العاملة ولاسيما في فترات الجفاف الشديد الذي تتعرض له دول الحزام الصحراوي فيؤدي إلى هلاك العديد من حيواناتها وتدمير إقتصادها .

#### ١- جمهورية مالي :

وقد دخلها الفرنسيون عام ١٨٩٣ . وتم تحديد حدودها عام ١٩٥٤ واستقلت ١٩٥٨ . وهي لموقعها الداخلي دخلت في اتحاد إقتصادي مع كل من غينيا وغانا والسنغال . ورغم أن مساحتها نحو  $١\frac{1}{4}$  مليون كم<sup>٢</sup> فيصل عدد سكانها الى نحو ٩,٥ مليون نسمة . تتركز الغالبية في إقليم ثنية نهر النيجر مع النطاق الجنوبي من البلاد حيث تكثر الأمطار نسبياً للتوسع الزراعي . واستغلت مياه النهر بإقامة السدود عليه بين مدينتي تمبتكو وبماكو ولاسيما الى الشمال من مدينة سيجو Segou حيث التربة الرسوبية الخصبة لزراعة الأرز والقطن وبعض الحبوب . تنتشر مراعي السفانا على جانبي النهر في هذا النطاق لتربية الثروة الحيوانية . وهي الآن تشكل إقليماً هاماً للتوسع الزراعي الحديث .

إعتماداً على مياه النهر مع بعض الأمطار الصيفية . وكانت مدينة تمبكتو Timbuktu مركزاً هاماً تجارياً تلتقى عنده طرق القوافل الآتية من المغرب العربى للتبادل التجارى من ملح وجلود وأخشاب وحبوب ورقيق فى مقابل واردات الشمال من ملابس وأدوية وزيت وأسلحة وغيرها . إلا أن طرق القوافل ضعفت كثيراً مع إلغاء الرق والتحول الى الطرق البحرية . وتتجه السياسة الإقتصادية الحديثة الى إعادة إنعاش هذه الطرق بعد تطويرها بالتعاون مع الدول المجاورة ومنظمة الوحدة الإفريقية .

وتعتمد البلاد على الثروة الحيوانية فى إقتصادها القومى إذ تصدر أعداداً كبيرة ولاسيما من الأغنام الى البلاد المجاورة مثل ساحل العاج وغانا ونيجيريا وهى تشكل مصدراً مهماً لتصدير اللحوم الى سكان المناطق الاستوائية المجاورة . مع بعض المنتجات الزراعية كالقطن والفول السودانى مع قليل من معدن البوكسيت .

وما يدعم هذه العلاقات التجارية إنتشار شبكة من الطرق والسكك الحديدية بالإضافة الى أن النهر صالح للملاحة فى معظم مجراه مع الدول المجاورة.

## ٢- جمهورية النيجر :

وهى فى ظل المناخ شبه الجاف بين مدار السرطان وخط عرض ١٤ شمالاً تقع فى الغرب الإفريقى وكانت جزءاً من الإستعمار الإفريقى الفرنسى وحصلت على إستقلالها عام ١٩٦٠ . وعلى الرغم من عظم مساحتها بنحو ٢ مليون كم<sup>٢</sup> إلا أن عدد سكانها لايتجاوز ٨ مليون نسمة أكثرهم من قبائل الهوسا والسنگاى والفولانى وجرما والطوارق التى تسود الغرب الإفريقى يمارسون الرعى وزراعة تعتمد على الأمطار فى وسط وجنوب البلاد حيث يتركز معظم السكان وتعتمد على جارتها نيجيريا جنوباً لتصريف تجارتها فى موانئ خليج غينيا والمحيط الأطلسى .

ويسود النطاق الهضبي في الوسط والشمال بمعدل نحو ١٥٠٠ متر وقد قطع بعدد كبير من الأخوار الموسمية المياه التي تعتمد على أمطار بمعدل ٢٥ سم سنوياً تقريباً . وهي أمطار صيفية رعدية يضيّع قدر كبير منها بالتبخّر . وتساعد على زراعة بعض المحاصيل سريعة النمو الى جانب غطاء من مراعى حشائش السقانا الفقيره مع الشوكيات تستثمر في رعى الجمال والأغنام التي تملكها قبائل الطوارق . وأما القسم الجنوبي فتسقط أمطاره الصيفية ما بين ٣ إلى ٥ أشهر بمعدل نحو ٧٥ سم مما ساعد على زراعة محاصيل صيفية كالذرة والفول السوداني والقطن بالإضافة الى مياه الري من نهر النيجر في الجنوب الغربى والتوسع في حفر الآبار داخلياً .

والرعى هو الحرفة الرئيسية في الوسط والشمال بمعدل نحو ٢ مليون رأس من الماشية ومليون رأس من الأغنام والماعز . ويصدر منها الى البلاد المجاورة في ظل تبادل تجارى متشعب الأنواع .

ونيامى العاصمة تقع على نهر النيجر في الجنوب في إقليم زراعى كثيف السكان . ويربطها بالبلاد المجاورة شبكة من الطرق . إلا أن النهر لا يصلح للملاحة السفن الكبيرة في هذا الجزء من مجراه وذلك لسرعة جريانه مع وجود بعض الشلالات . وقد نشأت بعض الصناعات في الجنوب الزراعى كإستخراج الزيت من الفول السودانى . ومصانع لدباغة الجلود ونسيج القطن . كما أكتشف بعض خامات الحديد جنوب العاصمة . وكلها تدخل في تجارة الصادرات مع الصمغ العربى الذى يجمع من أشجار الأكيشيا Accasia قرب بحيرة تشاد بالشمال الشرقى . والتجارة في جملتها مع الاقاليم المجاورة .

### ٣- جمهورية تشاد ،

وكانت مستعمرة فرنسية نالت إستقلالاً داخلياً عام ١٩٥٨ ثم إستقلالاً كاملاً عام ١٩٦٠ . إلا أنها مازالت تعتمد كثيراً صناعياً وإقتصادياً على فرنسا . وهما فى ارتباط إقتصادى مع الكمرون وإفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل وهى من البلاد الداخلية الفقيرة بمساحة تصل الى ١,٢٦٩,١٠٠ كم<sup>٢</sup> يقطنها نحو ٦ مليون نسمة . وأمطارها قليلة لاتزيد فى الشمال على ٢٥ سم . وبعض أمطار إعصارية تسقط على مرتفعات تبسى Tibesti فى الشمال فتتمو الحشائش للرعى . وتنساب المياه فى بطون الأودية الجافة التى تقطع الهضبة تغذى الحزان الجرفى بالمنطقة إذ يعتمد عليها الرعاة كمصدر مائى رئيسى . وتظهر الواحات عند أقدام المرتفعات حيث زراعة النخيل والمحبوب والزيتون من مياه الآبار . وتعيش قبائل التمو Timu حول هذه الواحات فى قرى على المنحدرات الجبلية بعيداً عن مجارى السيول الجارفة إذا سقطت أمطار إعصارية فجائية شديدة كما يحدث أحياناً على فترات متباعدة . وتنتقل القبايل بحيواناتهم وراء المرعى فى الأودية الجبلية التى تقطع المرتفعات وأيضاً على المنحدرات فى مدرجات طبيعية . قاطعين فى ذلك مئات الكيلو مترات وراء المرعى حتى منخفض الكفرة بالجنوب الليبى . ويعودون الى قرى تبسى الجبلية محملين بالبضائع والمؤن من تمور وكبريت وروائع وملابس وغيرها . وفى الوقت الحالى إنتشرت حركة النقل على سيارات فى طرق معبده لحمل مثل هذه البضائع بين قرى الواحات . وتنتشر بين هذه الواحات مساحات سبخية ملحية فى أحواض صغيرة هى بقايا بحيرة تشاد القديمة التى كانت تشغل هذه المساحات ثم إنكمشت مع حلول فترة الجفاف الحالية . وتهب الرياح الشمالية الشرقية على البلاد وفقاً لنظام المناخ الصحراوى السائد . وإذا كانت شديدة عاصفة تحمل معها ذرات من الملح وتراب التربة السبخية فيتحول الجو الى غيوم سوداء تؤذى الإنسان والحيوان . وقد تصل حتى شمال نيجيريا المجاورة .



ويتركز الإنتاج الزراعى فى الجنوب على جانبى نهر شارى Shari الذى ينتهى الى بحيرة تشاد وكذلك قرب البحيرة . حيث تعتمد الزراعة على الرى النهري ومياه الأمطار والمياه الجوفية . ويعتبر القطن من أكثر المحاصيل الزراعية أهمية حيث يشكل نحو ٨٠ ٪ من قيمة صادرات البلاد . ويليه الجيوب ولاسيما الفول السوداني . وتستثمر مياه البحيرة فى صيد الأسماك . كما تشتهر المنطقة شمال شرقى ساحل بحيرة تشاد بمياهها الضحلة التى تتبخر تاركة النظرون (كربونات الصوديوم) بإنتاج سنوى نحو ٥٠٠ طن . ويعتبر الصمغ العربى من المحاصيل التقليدية فى تشاد إذ توسعت البلاد فى زراعة أشجار الأكاسيا فى الوسط والشمال للحصول على مادة الصمغ العربى . ويصدر فائض إنتاج هذه المحاصيل مع الماشية ولاسيما الأغنام الى السوق الخارجية عن طريق شبكة من الطرق تربط تشاد بالدول المجاورة ولاسيما نيجيريا والكمرون . إلا أن تشاد فى حاجة ماسة الى تحسين شبكات الطرق بها كطرق حديثة . وكذلك التوسع فى استخدام التقنية الحديثة فى الزراعة وتربية الثروة الحيوانية وإنتاج الثروة المعدنية وحلج ونسج القطن وتحسين إنتاج مصايد البحيرة والتوسع فى زراعة الأشجار الإقتصادية .

### ثانيا : إقطار غرب إفريقيا

#### ١ - جمهورية السنغال

وتقع فى الطرف الجنوبى الغربى من جنوب الصحراء الكبرى . وتحدها موريتانيا شمالاً ومالى من الشرق وغينيا بيسا ومن الجنوب مطة على المحيط الأطلس.

فهى المنفذ الطبيعى لجمهورية مالى المجاورة إذ يربطان بخط حديدى يبدأ من بأكو العاصمة . ويزيد عدد سكانها على سبعة ملايين نسمة غالبيتهم من المسلمين بنسبة ٨٨ ٪ من سكان البلاد . والباقي بين مسيحيين ووثنيين .

وينتمى السكان فى جملتهم الى قبائل الفولانى . واستقلت الدولة عام ١٩٦٠ بعد إحتلال فرنسى دام نحو مائة عام .

وهى تشكل سهولاً واسعة تنحدر نحو المحيط الأطلسى بإرتفاع لايزيد على ١٥٠ متراً . فنهر السنغال وروافده صالحة للملاحة خاصة فى موسم الامطار الصيفية . وينبع نهر السنغال من مرتفعات فوتاجالون Fouta Djallon غرب غينيا . وهو يشكل حدوداً بين السنغال وموريتانيا وأنشأ سد على النهر لتوفير مياه الرى للتوسع الزراعى وذلك فى عام ١٩٤٨ . وخاصة لزراعة الأرز . والنهر الثانى هو نهر غامبيا Gambia مخترقاً السهول الجنوبية للسنغال ثم يمتد فى جمهورية غامبيا الى الجنوب وهى تشكل إسفيناً فى قلب السنغال .

ومناخياً فإن معدلات الحرارة تبدو معتدلة فى السهل الساحلى بتأثير تيار كنارى البارد . وقد شجع هذا المناخ الفرنسيين على الإستيطان ولاسيما فى العاصمة دكار مزاولين التجارة وفى وظائف الدولة المختلفة . والأمطار موسمية صيفية مابين ٢٥ إلى ١٠٠ سم فتساعد على زراعة الحبوب ولاسيما الفول السودانى . وتهتم الدولة بتحسين القدرة الإنتاجية للتربة تدريجياً بإستخدام أساليب التقنية الحديثة من دوره زراعيه ومكافحة الآفات وتنظيم الرى والصرف . فإنتشرت زراعة الذرة والأرز والبقوليات والفواكه والخضروات لسد حاجة السوق المحلية فى مستوى إقتصادى أفضل من المناطق المجاورة .. ومع التربة الرسوبية الفيضية النهرية الخصبة تمتد أشرطة من تربة رملية كثبية على طول السهل الساحلى . وأزيلت الحشائش والشجيرات لتحل محلها زراعات كثيفة حديثة مع زراعة الأعلاف لتربية الماشية . والسنغال ثانى دولة بعد نيجيريا فى إنتاج الفول السودانى . وتساهم فى تجارتها الدولية بنحو ٢٥ ٪ من صادرات العالم (نيجيريا ٣٧ ٪) . كما تهتم الدولة أيضاً بتصدير زيت الفول السودانى . وخاصة الى فرنسا وإيطاليا وهولنده وألمانيا وبريطانيا . فتجارها واسعة مع هذه الدول الأوربية بالإضافة الى دول الجوار .

والإنتاج المعدنى يتركز فى إنتاج الفوسفات فى منطقة الى الشمال الشرقى من دكار بنحو ١٢ كم حيث يوجد فى طبقة يبلغ سمكها نحو ستة أمتار مغطاه بطبقة من الرمال التى أرسبتها الرياح بسمك يزيد على عشرة أمتار . ومعدل الإنتاج نحو مليون طن للتصدير للخارج . كما ينتج ملح الطعام للإستهلاك المحلى . والتصدير الى البلاد المجاورة . وهو من ملاحات ساحلية بإنتاج نحو ٦٠ ألف طن سنوياً . والتنقيب مستمر بالوسائل العلمية الحديثة لتطوير الثروة المعدنية .

وبالإضافة الى صناعة زيت الفول السودانى فقد تقدمت البلاد فى صناعات أخرى متنوعة منها الأسمنت والمنسوجات القطنية لتسد بعضاً من حاجة السوق المحلية .

## ٢- جمهورية نيجيريا Nigeria :

تقع نيجريا فى الغرب الإفرقى بين خطى عرض ٤ - ١٤ شمالاً مظه على خليج غينيا Guinea فى مساحة نحو ١, ١٨٨, ٤٩٢ كم٢ . وقد إرتفع عدد سكانها من ٦٤, ٥٠٠, ٠٠٠ نسمة عام ١٩٧٠ الى نحو مائة مليون نسمة فى ١٩٩٦ فتأتى فى المركز الأول سكانياً بين دول القارة . وهى تتفوق على كل دول إفريقيا المدارية فى النمو الإقتصادى والتجارة الخارجية . ويتمتع القسم الجنوبى الغربى من البلاد بمستوى إقتصادى أكثر إرتفاعاً من باقى الأقاليم النيجيرية لوجود البترول والتوسع فى زراعة الكاكاو بنوع خاص . بينما يسود الفقر القسم الشمالى لبعده عن الساحل وضعف شبكة المواصلات وقلة أمطاره نسبياً وضعف التربة مع تخلف فى إستخدام التقنية الحديثة فى الزراعة وتربية الثروة الحيوانيه والنمو الصناعى . بالإضافة الى إهمال الإستعمار البريطانى لهذا الإقليم الشمالى متروكا لحكم الأمراء المحليين بأساليبهم القديمة وإمكانياتهم المحدودة . والإهتمام بالإقليم الجنوبى الغربى فظهرت به المدن الكبرى والجامعات والطرق

الحديثة مع تقدم تقنى متطوره وقبل توغل النفوذ الأوربي ولاسيما البريطانى منذ أوائل القرن الخامس عشر كانت البلاد مقسمة بين ملوك وأمراء مثل مملكة كانم وإمبراطورية الفولانى مع مدن ذات شخصية متميزة فى دلتا النيجر وحولها . وقد إنتشر الإسلام الخفيف فى البلاد منذ القرن الحادى عشر الميلادى وكان عاملاً قوياً فى تقدمها الحضارى وإنفتاحها نحو العالم الخارجى ولاسيما الشمال الإفريقى . وأبقت بريطانيا على نظام الحكم المحلى وكانت تنفذ أوامرها وكانت أيضاً تحقق رغباتها عن طريق هؤلاء الزعماء المحليين .

وتضاريساً يسود نيجيريا نطاق هضبى فى الوسط والشمال يتقوس صوب الجنوب الشرقى فى مرتفعات أداما Adama وناحية الجنوب الغربى فى مرتفعات إيدان Ibadan. وتنحدر الهضبة تدريجياً بسطح موج نحو السهول الجنوبية حيث يجرى نهر النيجر ورافده نهر بنوى Benue مكونا دلتاه الكبيره ذات الفروع المتشعبة إذ يصب فى المحيط الأطلسى وقد قطعت الهضبة بعدد كبير من الأنهار القصيرة التى تنساب نحو نهر النيجر ورافده الرئيسى بنوى . كما ينساب بعض هذه الأنهار فى أقصى الشمال الشرقى نحو نهر شارى Shari الذى يصب فى بحيره تشاد وهى مقسمة ما بين نيجيريا والنيجر وتشاد والكمرون .

ومن زاوية المناخ والغطاء النباتى فإن الموقع الجغرافى عبّر ١٠ درجات عرض مع تنوع تضاريسى متباين أديا الى تنوع مناخى . فالسهول الساحلية الجنوبية تستلم أمطاراً غزيرة طول العام بفعل الرياح الجنوبية الغربية المحيطية مع إرتفاع حرارى على مدار السنة . والمدى الحرارى السنوى ضئيل إذ فى مدينة لاجوس Lagos على الساحل غرب دلتا النيجر تصل درجة الحرارة العظمى الى ٢٨°م بينما تهبط درجة الحرارة الدنيا الى ٢٦°م بفارق درجتين . مع معدل مطر يصل الى ٣٠٠ سم سنوياً مصحوباً بعواصف رعدية أحياناً . وفى الشمال تطول

فترة الجفاف ما بين ٣ - ٦ أشهر شتاءً . ففي مدينة كانو Kano على الهضبة الشمالية تسقط الأمطار بمعدل ٨٥ سم سنوياً . وتسود رياح الشمال الجافة شتاءً على القسم الداخلى . بينما تتوغل الرياح الجنوبية الغربية صيفاً نحو الشمال مع الضغط المنخفض على الصحراء الكبرى . وتهب رياح الهرمتان الجافة محملة بالأتربة وهى تشبه رياح الخماسين فى وادى النيل الأدنى . وتصل أحياناً حتى السهل الجنوى كرياح جافة يرحب بها الأهالى لجفافها وسط مناخ رطب طول العام . وبين الجنوب والشمال منطقة وسطى إنتقالية بمعدل أمطار نحو ١٠٠ سم سنوياً .

والغطاء النباتى الطبيعى ترجمه لظروف المناخ السائد . حيث تنمو غابات المانجروف مصحوبة بنباتات المستنقعات والغابات المدارية فى السهل الساحلى جنوباً تتدرج نحو غابات نفضيه شمالاً يليها حشائش السثنا بأنواعها وفقاً لكمية الأمطار وفصليتها . كما تمتد النباتات الشوكية على طول الأطراف الشمالية . وقطعت مساحات واسعة من النبات الطبيعى فى كل البلاد لتحل الزراعات الحديثة للحبوب والفاكهة وأشجار الكاكاو والأشجار الإقتصادية الأخرى مع مزارع حديثة لتربية الثروة الحيوانية .


وأما عن التنظيم السياسى : فقد حصلت نيجيريا على إستقلالها من بريطانيا عام ١٩٦٠ . وأصبحت عضواً فى الكومنولث البريطانى Common Wealth وهى الآن تحت حكم مركزى منظم يراعى المتطلبات الإقليمية للتجمعات القبلية التى من أهمها قبائل الهوسا والفولانى المسلمة فى الشمال وقبائل اليوروبا التى يدين معظم أفرادها بالإسلام الحنيف فى الجنوب الغربى وقبائل تيف فى الجنوب الشرقى .

وسكانيا تتكون نيجيريا من نحو ٣٥٠ مجموعة قبلية أهمها قبائل الهوسا والفولانى ويوروبا والتيف التى أشرنا إليها . وقد نما عدد السكان نمواً سريعاً

من نحو ١٦ مليون نسمة سنة ١٩١١ الى أكثر من مائة مليون نسمة ١٩٩٦ بمعدل نمو من ٤ ٪ الى ٢٠,٢٥ ٪ سنوياً . والجنوب أكثر كثافة من الشمال . وفقاً للهرم السكاني فإن الأطفال أقل من ١٥ سنة عمراً يؤلفون ٤٠ ٪ من عدد السكان . أما من هم فوق الخمسين فيمثلون نحو ٨ ٪ من السكان . والباقي وهو حوالي ٥٠ ٪ من السكان يقع بين ١٥ الى ٤٩ سنة أى الطبقة العاملة وهي تشكل بذلك نحو نصف السكان . فنصف السكان من غير العاملين مما يزيد على كاهل الدولة فى توفير الخدمات لهذه الفئة غير العاملة . وهذه الظاهرة تؤدى الى إنخفاض مستوى المعيشة بالنسبة للأسرة والمجتمع .

ومع التقدم التدريجى إقتصادياً وصحياً واجتماعياً إنتشر الوعى الصحى بين السكان مما أدى الى إنخفاض فى نسبة الوفيات يقابله إرتفاعاً فى نسبة المواليد . فأخذ السكان فى نمو سريع . وتبدل الأرقام أن معدل الوفيات هبط الى ٣٠ فى الألف بينما إرتفع معدل المواليد الى نحو ٥٥ فى الألف . مما يعنى أن الزيادة فى عدد السكان بلغت ٢٠,٥ ٪ .

وإقتصادياً يتركز النشاط الإقتصادى مع كثافة سكانية عالية فى الإقليم الجنوبى ولاسيما الجنوبى الغربى بإسم أرض يوروبا حيث المدن الكبيرة التى من أهمها مدينة لوجوس ومدينة إيدان ومدينة أبيوكوتا Abeokuta . وكل منها تقرب من المليون فى عدد سكانها . وينتج فى هذه المنطقة معظم إنتاج نيجيريا من الكاكو والكولا ويعتمد عليها الإقتصاد النيجيرى كما تنتشر زراعة نخيل الزيت وبعض المحاصيل الغذائية الأخرى . وإمتدت شبكة من السكك الحديدية ربطت بين المدن الرئيسية كمراكز تجارية وثقافية هامة . وإقليم الكاكاو هذا جعل نيجيريا ثانى دول العالم إنتاجاً له بعد غانا . وتمتاز المدن الرئيسية بتنوع نشاطها الصناعى ولاسيما صناعة النسيج ودباغة الجلود وبعض الصناعات الخشبية والأثاث وبعض الصناعات الكيماوية والكهربائية ومصانع الاسمنت والدقيق والبيرة والصابون .



والى الشرق من أرض يوروبا يمتد نهر النيجر بواديه الحصب ودلتاه الكبيره حيث تمتد المستنقعات واللاجونات فى أطرافها وعلى طول السهل الساحلى المجاور فإنتشرت حرفة الصيد وأخذت ببعض الأساليب الحديثه . كما إمتدت مزارع واسعة للأخشاب الثمينه والمطاط ولاسيما ما بين مدينتى بنين Benin وسابليه Sapele ويتركز إنتاج الأخشاب من الغابات المدارية ولاسيما جنوب بنين حتى الدلتا جنوباً . وتركزت الصناعات الخشبية ولاسيما صناعة الرقائق الخشبية (القشرة) والتي تصدر الى العالم الخارجى من مصانع سابليه Sapele المشهوره . ويمتاز إقليم الدلتا وماحوله أيضاً بإنتاج البترول منذ عام ١٩٦٢ وزاد الانتاج بقدر كبير الى أكثر من مائة مليون طن سنوياً .

والإقليم الشرقى ما بين نهر بنوى Benue ورافد النيجر الرئيسى والساحل الجنوى يمتد فى سهل موج نحو المرتفعات الشرقية التى أشرنا إليها باسم هضبة أداما Adama . وهو إقليم شديد الكثافة السكانية بمعدل يصل الى ١٤٠٠ نسمة للكيلو متر المربع . وهو إقليم الزراعة الكثيفة لأشجار المطاط وزيت النخيل والحبوب ولاسيما الذرة والأرز فى تربة رسوبية خصبة وتربة فيضية نهريه مع شبكة مستطوره للنقل . ومن أشهر مدنه مدينه بورت هاركورت Port Harcourt ومدينه بونى Bonny على الساحل .

وأما الإقليم الشمالى من نيجيريا فيسوده المظهر الهضبى إذ تنحدر هضبة بوتشى Bauchi وهى أكثر الأجزاء إرتفاعاً بوسط الإقليم إنحداراً تدريجياً فى كل الجهات . لتفصل بين حوضين هضبيين أحدهما الحوض الشرقى منحدراً نحو منخفض بحيرة تشاد . والثانى وهو الحوض الغربى منحدراً نحو الوادى الأوسط لنهر النيجر . وقد قطع الحوضان بعدد من الأخوار النهريه الموسمية التى تنساب ولاسيما صيفاً مع الأمطار الموسمية نحو كل من نهر النيجر غرباً وبحيرة شاد شمالاً بشرق . ويسود الإقليم مناخ مدارى حار شبه جاف أمطار صيفية تقل عن



٥٠٠ مم تسقطها فلزل الرياح الجنوبية الغربية من المحيط الهندي نحو الضغط المنخفض على الصحراء الكبرى صيفاً . أما فى الشتاء فتسود رياح جافه من الصحراء المجاورة . ولذلك فهو إقليم الحشائش القصيرة (الإسبتس) مع موارد مائية محدودة ولاسيما المياه الجوفية مع مياه بعض الأخوار الموسمية بالإضافة الى القسم الاوسط من نهر النيجر الذى يخترق الأطراف الغربية من الأقليم الهضبي الشمالى .

وتنتشر الزراعة ولاسيما حول المدن التى من أهمها مدينة كانو Kano ومدينة زاريا Zaria ومدينة كاتسينا Katsina قرب الحدود مع النيجر بعد أن قطعت مساحات واسعة من الحشائش والشجيرات ومن هذه المحاصيل الزراعية الذرة والدخن كمحاصيل غذائية وكذلك القطن والفلو السودانى لأغراض تجارية : ويتركز النشاط الزراعى بين جماعات الهوسا من المسلمين يعيشون فى قرى متناثرة . وقد ربطت المدن بشبكة من الطرق مع مدن الجنوب . وتصل ذبابة تسمى تسمى التى تحمل مرض النوم الخطير الى أطراف الاقليم الشمالى أحياناً . ولكنها قلت كثيراً مع تقدم الوعى الصحى والثقافى بين الأهالى . ومع التوسع الزراعى إنتشرت زراعة الأعلاف لتربية الثروة الحيوانية من أبقار وأغنام وماعز للإستهلاك المحلى والتجارة مع المناطق المجاورة . كما إنتشرت بعض الصناعات البسيطة كالنسيج اليدوى ودباغة الجلود وصناعتها وصناعة الخصر من سعف النخيل . وبدأ التعليم ينتشر بين الأهالى فى المدارس القرآنية والمدارس العامه ولاسيما حول المدن فى كثافة سكانية بنحو ١٢٠٠ نسمة لكل كم ٢ . وحركة الهجرة الموسمية قائمة بين الشباب نحو الجنوب للعمل فى مصانع ومتاجر المدن الكبيرة والعمل أيضاً فى مزارع الكاكاو والمطاط وزيت النخيل وغيرها . ومدن الشمال شديدة الإزدحام بالسكان ولاسيما مدينة كانو عاصمة الشمال التى وصل تعداد سكانها فى عام ١٩٩٥ الى أكثر من ٥٥٠ ألف نسمة . وتمتاز مدن

الشمال بنشاط صناعى ولاسيما مدينة كانو فتقدمت صناعات النسيج وبيع الجلود وتعليب اللحوم وإستخراج زيت النخيل وزيت بذرة القطن . وتصدر الخنازير لتعليب لحومها فى مصانع لاجوس Lagos وماحولها . ومما شجع هذا التقدم الصناعى وفرة الأيدى العاملة الرخيصة والمواد الخام وتقدم شبكات النقل مع سوق إستهلاكية ضخمة لإزدحام نيجيريا بالسكان . ويصدر فائض الإنتاج الى العالم الخارجى والبلاد المجاورة .

ويشتهر الإقليم الشمالى أيضاً بتعدين القصدير بمنطقة جوسو Gusaw الى الغرب من كانو بإنتاج سنوى نحو ١٠,٠٠٠ طن . ويعمل فى هذه المناجم نحو ٤٠,٠٠٠ عامل من الإقليم الشمالى شبه الجاف . والمنطقة على إتصال جيد بشبكة من الطرق تربطها بالمدن المجاورة مثل كانو وباكوا Bakwa وزاريا Zaria وبتشى Bauchi .

والإقليم الأوسط حيث يجرى نهر بنوى رافد النيجر يشكل المد الشمالى للسهول الجنوبية بترية رسوبية خصبة مع وفرة فى مياه الامطار والمياه النهرية والمياه الباطنية إذ أصبح من أهم المناطق فى زراعة الأرز وقصب السكر والحبوب والفاكهة والخضروات لتوفير الأمن الغذائى لكل من مدن الشمال والجنوب بفضل شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية . ومشروع سد النيجر فى أضيق جزء من المجرى عند مدينة كاينجى الى الشمال الغربى من إتصال الرافد بنوى بالمجرى الرئيسى فى إقليم صخرى تنتشر التلال على جانبيه يوفر قدراً كبيراً من المياه عن طريق التخزين المائى مع طاقة كهربائية ضخمة تستخدم فى المصانع والمدن المجاورة . فضلاً عن تحسين الملاحة النهرية وزيادة الثروة السمكية . وهذا المشروع تحت التنفيذ والمتابعة الفنية . ويساهم فى التوسع الزراعى والصناعى بالإقليم مع خطوط أنابيب النفط وشبكة الكهرباء فى الإقليم الجنوبى ولاسيما بين مدينتى بورت هاركورت Harcourt ولاجوس Lagos على الساحل .

والنشاط التجارى فى نيجيريا زاد بخطوات سريعة بعد الاستقلال للنمو السريع للسكان والتوسع الزراعى والصناعى فضلاً عن مشاريع التنمية المختلفة وتقدم شبكات الطرق والسكك الحديدية . و بقيت قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات حتى عام ١٩٦٩ إذ بدأ فى إنتاج البترول من حقوله بدلتا النيجر . وأخذ الإنتاج النفطى يزداد سريعاً فتغلبت قيمة الصادرات على قيمة الواردات لصالح الميزان التجارى النيجيرى . ومعظم الواردات من الآلات الثقيلة والأدوات الكهربائية والأجهزة الدقيقة ومتطلبات أدوات النقل والسيارات وقاطرات السكك الحديدية والأدوية والمواد الكيماوية والمنسوجات والأدوات الجلدية الراقية . ومعظم التعامل التجارى مع بريطانيا وألمانيا واليابان ثم دول الاتحاد الأوروبى والدول المجاورة .

### ٣- جمهورية غانا :

وتقع على خليج غينيا بالغرب الإفريقى . وكانت مستعمرة بريطانية إستقلت عام ١٩٥٧ . فتغير اسمها من ساحل الذهب الى غانا نسبة الى مملكة غانا القديمة التى تأسست عام ٣٠٠ م وإمتد نفوذها فى غرب إفريقيا ما بين حوض النيجر حتى المحيط الأطلسى غرباً واستمرت حتى عام ١٠٧٦ م .

وتضاريسها تنقسم غانا إلى ثلاثة أقاليم متباينة تتمثل فى :

(أ) إقليم الهضبة الذى يشكل معظم البلاد كجزء من الهضبة الإفريقية الغربية إذ تتكون القاعدة الصخرية من صخور نارية ومتحولة تمتد الى ما قبل الزمن الأول أو العصر الكمبرى تغطيها رواسب من الزمنين الأول والثانى . وقد قسمت الهضبة بخائق أخدودى يجرى فيه نهر الفلتا Volta فى قسمه الاوسط مقسما الهضبة الى قسمين أحدهما الهضبة الشمالية والأخرى هضبة أشانتى Ashanti الى الجنوب عن الهضبة الشمالية .

(ب) إقليم وادى نهر الفلتا الذى يخترق الهضبة نحو الجنوب نابعاً من هضبة سيكاسو Sikasso وهى الإمتداد الداخلى لمرتفعات فوجا فالون Fuota Djalon . ويتجه صوب الشمال الشرقى ليتقوس فى ثنية كبيرة نحو الجنوب باسم فولتا الاسود Black Volta . ويسير النهر بعد ذلك نحو الجنوب الشرقى ليصب فى المحيط الأطلسى بالغرب الإفريقى عند ميناء أدا Ada . ويتصل به رافده نهر فلتا الأبيض فى قسمه الأوسط قرب قمالى Tamale وهى مركز مهم لتجمع الطرق التى تقطع كل غانا فى قسمها الشمالى . ويقابلها مدينة كوماسى Kumasi التى تشكل المركز الثانى لتجمع الطرق الرئيسية فى جنوب ووسط غاناه بهضبه أشانتى وماحولها . وهى أيضاً مركز للسكك الحديدية .

ج ) إقليم السهول الجنوبية : التى تتحدر إليها الهضبة إنحداراً تدريجياً .  
 وتتماز هذه السهول بتموج سطحها تموجاً خفيفاً بحيث يتحول الى مجموعة من  
 الأحواض أهمها حوض نهر قلنا . كما تنتشر بعض اللاجونات الساحلية - La  
 goons التى تنتهى الى بعض منها أنهار ساحلية قصيرة . وقد غطى هذا  
 السهل بشبكة من الطرق والسكك الحديدية تخدم مناجم الذهب حول مدينة  
 تاركرا Tarkua ومزارع الكاكاو على طول السهل الساحلى بموانيه التى من  
 أهمها أكرا Accra وميناء تاكورادى Takoradi .

ومناخها تخضع غانا لهبوب الرياح الشمالية الشرقية شتاء . وهى رياح  
 جافة تصل حتى أطراف السهل الجنوبى الذى يخضع للرياح الجنوبية الغربية  
 المحيطية المطيرة طول العام وهذه الرياح المحيطية تتوغل صيفاً نحو الهضبة  
 مسقطه لبعض أمطار صيفية . ولذلك فأمطار السهل الجنوبى طول العام بمعدل  
 ما بين ١٢٥ الى ٢٠٠ سم بينما تسقط أمطار الشمال صيفاً بمعدل نحو ١٢٥ سم  
 . وتتراوح معدلات الحرارة ما بين ٢٥ الى ٢٩م على مدار العام مع رطوبة نسبية  
 عالية إلا عند هبوب رياح الهرمتان الشمالية الجافة الباردة نسبياً فتخفص من  
 درجة الرطوبة النسبية فى الجو .

ويلاحظ أن أمطار ساحل غانه أقل كثيراً من أمطار ساحل نيجيريا لهبوب  
 الرياح الجنوبية الغربية موازية للساحل . والغطاء النباتى الطبيعى يتمثل فى  
 أشجار نخيل الزيت والغابات المدارية بأشجارها المتنوعة والتى من أهمها المطاط  
 والماهوچنى تسود حيث الامطار الغزيرة نسبياً طول العام على هضبة أشانتى  
 والسهول الجنوبية .

وحيث تقل الأمطار الموسمية الصيفية تسود حشائش السفانا على الهضبة  
 الشمالية ويسهل اكرا الذى لايزيد معدل أمطاره على ٧٥ سم مع فصل جاف  
 طويل لهبوب الرياح الجنوبية الغربية موازية للساحل . وقد إجتشت معظم

النباتات الطبيعية ليحل محلها غطاء من نباتات إقتصادية فى ظل دورة زراعية علمية وتقنية فنية متقدمة مثل مزارع نخيل الزيت والكاكاو والقطن والذره والأرز ومراعى لتربية الثروة الحيوانية

وسكانيا تمتاز غانا بنمو سكاني سريع من ٦,٧٢٧.٠ نسمة ١٩٦٠ إلى ١٥ مليون عام ١٩٨٥ فارتفع الرقم الى نحو ١٨ مليون نسمة عام ١٩٩٦ . مع ملاحظة أن نحو ٥٥ ٪ من مجموع السكان دون سن العشرين بمعدل نمو سكاني يبلغ حوالى ٢,٥ ٪ .

وتتركز الكثافة السكانية العالية فى السهل الجنوبى وهضبة أشانتى Ashanti ووادى نهر الفلنا إذ أن نحو ثلاثة أخماس مجموع السكان يعيشون فى أقل من نصف مساحة البلاد مع تداخل سكاني فى الهضبة الشمالية شبه الجافة . فالنمو السكاني أسرع من التطور الإقتصادي مما جعل الدولة تضع سياسة إقتصادية إجتماعية بهدف تنظيم الأسرة ورفع مستواها العلمى والثقافى من ناحية والتوسع الزراعى والصناعى والتنمية الإقتصادية فى مجالات متجددة من ناحية أخرى .

ومما يعرقل النمو الحضارى إقتصادياً وإجتماعياً تعدد المجموعات القبلية بلغاتها ولهجاتها التى تزيد على ٧٥ لغة ولهجه فى ظل تباين حضارى واضح . فلا توجد ديانة غالبية إذ أن المسيحيين يمثلون ٤٢,٨ ٪ والوثنيين ٢٨,٢ ٪ والمسلمين ١٢ ٪ واللا دينيين ٧ ٪ . إلا أن الحكومة الحالية تعمل على توحيد البلاد وإدارتها إدارة مركزية منظمة .

وإقتصادياً يمتد نطاق الغابات بأشجارها الجيده الى الغرب من هضبة أشانتى وإقليم السهول الجنوبية الغربية بعيداً عن الساحل متجنباً للرطوبة العالية التى تقلل من قيمة الأخشاب . والأخشاب ثانى صادرات غانا بعد الكاكاو

ونحو ٩٠ ٪ من الأخشاب بأنواعها المختلفة تصدر من ميناء تاكورادى . وكمية المصدر تقدر بنحو ٨٠ مليون قدم مكعب ١٩٩٦ ومن أهم الأنواع المصدره خشب الماهوجنى والأخشاب البيضاء اللينة . وتنتشر مصانع الأخشاب فى السهل الجنوبى مع صناعة الأثاث الخشبى والورق . وقد قطعت نحو ٢/١ مساحة الغابات لتحويلها الى مزارع للكاكاو . ولم يستثمر من الثروة الغابية الا نحو الثلثين وقد وضعت تحت رقابة الدولة إقتصادياً وإدارياً لحفظها من الحرائق مع زراعة بعض الأنواع الجيدة وفقاً للبيئة الطبيعية .

وتأتى زراعة الكاكاو فى مقدمة الحاصلات الزراعية إنتاجاً وتصديراً بنحو ٥٠٠ ألف طن سنوياً . ومن الحاصلات الزراعية الأخرى البن والموز بأنواعه والحبوب ومنها الذرة والأرز .

بالإضافة الى نخيل الزيت وجوز الكولا . وتتركز زراعة الحبوب فى الشمال مع بعض الفواكه والحمضيات والتمر فى واحات متناثرة فى الاحواض الداخلية معتمده على المياه الجوفية وبعض الأمطار الصيفية القليلة . كما يرد الى غانا من البلاد المجاورة أعداد كبيرة من الماشية والاسماك المجففة . فضلاً عما تستورده عبر البحار من الدقيق والاسماك واللحوم والمعلبات المحفوظة والمجمدة . ومع إقام مشروع نهر الفلتا للتخزين المائى يمكن استزراع نحو ٥٠٠ ألف فدان من أراضي السهول الوسطى والجنوبية بقصب السكر والفواكه والخضروات والأرز والحبوب للمساهمة فى تغطية الإستهلاك المحلى .

وصيد الاسماك من مياه خليج غانه واللاجونات الساحليه يشكل صناعة رئيسية لسكان السواحل مستعملين القوالب المجوفة من جذوع الأشجار وشباك الصيد . وقد تطورت قوالب الصيد باستخدام المحركات البخارية والصيد فى المياه العميقة . وتستخدم الوسائل الحديثة فى حفظ الأسماك ونقلها وتسويقها . وتساهم الدولة فى عمليات الصيد وإنشاء مخازن للتبريد وحفظ الأسماك .

وتنقل الأسماك فى شاحنات مبردة للتوزيع داخل البلاد . وقد تأسست شركة وطنية لصيد الأسماك وحفظها وتصنيعها وتوزيعها فى الأسواق وذلك منذ عام ١٩٦٤ . مع التوسع التدريجى فى هذه الصناعة الهامة لطول السواحل بغرب إفريقيا مع المياه العميقة لتغطية متطلبات الإستهلاك المحلى المتزايد مع النمو السكانى السريع . وقد زادت اسطول الصيد على ٦٠ سفينة بإنتاج سنوى نحو ٢٠٠ ألف طن .

والتعدين متنوع فى غانا فالذهب من أقدم المعادن تعديناً فقد أنشأ أول خط حديدى فى غرب إفريقيا عام ١٩١٠ لخدمة مناجم الذهب عند مدينة تاركوا بالسفهل الجنوبى ومنها الى ميناء تاكورادى على الساحل قريباً من الحدود الغربية . ثم إمتد الخط شمالاً الى مناجم الذهب فى أوبراسى . ثم وصل الخط ١٩٣٠ الى نهايته الشمالية عند كوماسى Kumasi جنوب هضبة أشانتى Ashanti . وكان لهذا الخط الفضل فى إزدهار غانا إقتصادياً . وتأتى غانه فى المرتبة السادسة بين دول العالم إنتاجاً لهذا المعدن النفيس والذي يكون نحو ٤٧ ٪ من قيمة إنتاج باقى المعادن . يأتى بعده الماس ٢٩ ٪ ثم المنجنيز ٢١ ٪ واليوكسيت ٣ ٪ . والماس الغسانى من الأنواع التى لاتصلح لصناعة المجوهرات بل يستخدم فى أغراض صناعية . وتوجد مناجم الماس الى الجنوب والغرب من مدينة كوماسى على جانبي الخط الحديدى ما بين كوماسى ومدينة تاكورادى على الساحل فى القسم الجنوبى الغربى من السفهل الجنوبى . ومعدن المنجنيز يعدن الى الغرب من ميناء تاكورادى Takoradi بإنتاج يصل الى نحو ٦٠٠ ألف طن سنوياً ومعدن اليوكسيت يستخرج الى الغرب من كوماسى Kumasi عند الحافة الجنوبية لهضبة أشانتى Ashanti بإنتاج يصل الى نحو ٣٠٠ ألف طن سنوياً .

والصناعة فى غانا تطورت كثيراً فى السنوات الأخيرة . ومن أهم هذه



الصناعات صناعة الأخشاب وعصير الفواكه والبيرة والتبغ والكبريت والبلستيك والنسيج والمواد الغذائية المختلفة . وتتركز معظم هذه الصناعات حول العاصمة أكرا . فهي أعظم الأسواق في البلاد . بالإضافة الى مصفاة النفط بإنتاج نحو مليون طن سنوياً وإتمام سد نهر الفلثا عند أكوزومبو -Oko zombo شمال مدينة أكرا تولد طاقة كهربائية تقدر بنحو ٧٥٠ ألف كيلو وات ساعة تغذى الصناعات المشار اليها . أما بحيرة التخزين فتبلغ مساحتها ٧٧٠٠ كم<sup>٢</sup> للتوسع الزراعى فى كل الإقليم .

### ثالثاً - إقطار شرق إفريقيا

#### ١- أوغنده :

إستقلت هذه الجمهورية ١٩٦٢ عن النفوذ البريطانى وهى تشكل جزءاً من هضبة البحيرات العظمى الإفريقية تبعد عن المحيط الهندى بنحو ٨٠٠ كم . وتبلغ مساحتها ٢٣٦,٢٩٧ كم<sup>٢</sup> متضمنة المساحات المائية لبحيرات فكتوريا ومويوتو (ألبرت) وأمين (ادوارد) بنحو ١٨ ٪ من المساحة الكلية . وتقع فى هذه الجمهورية منابع النيل العليا إذ يخرج من بحيرة فكتوريا نيل فكتوريا ليصب فى بحيرة ألبرت . ثم يخرج منها باسم نيل ألبرت ليدخل السودان نيل بحر الجبل .

ويسود أوغنده المظهر الهضبي بنحو ٨٤ ٪ من المساحة والباقي يشكل مساحة مائية . ويتراوح سطح الهضبة ما بين ٩٠٠ الى ١٥٠٠ متر فوق سطح البحر فى توج خفيف . وتمتد الهضبة غرباً نحو المد الأخدودى للفرع الغربى أو النيل للأخدود الإفريقى متضمناً بحيرات ألبرت وادوارد ونهر السمليكى بينهما . وتشرف جبال روينزورى Rowenzouri بقمتها العالية (٥١١٩ متراً) على الحافة الأخدودية الشرقية لهذا الأخدود العميق . وتنحدر الهضبة شمالاً نحو حوض بحر الجبل بالسودان الجنوبى إذ يقف جبال أماتنج Amatung

شامخة على الحدود مع السودان. والنيل هنا يجرى فى خانق انكسارى هو استمرار للفرع الغربى للأخدود الإفريقى حتى جنوب السودان. وشرقاً تمتد الهضبة الأوغندية نحو هضبة كينيا Kenya إذ تقف الكتلة البركانية لجبال إلجون Elgon (٤٣٢١م) التى تكون الحدود مع جمهورية كينيا . وتمتد الهضبة نحو الجنوب لتندمج مع هضبة تنزانيا المجاورة .

وتضاريسياً تقسم أوغنده الى ثلاثة أقسام متباينه هى :

(أ) إقليم بحيرة فكتوريا التى تنحدر اليها الهضبة محاطة بسهل ساحلى ضيق . وقد تناثرت مجموعات جزرية أمام سواحل البحيرة .

(ب) إقليم المنخفض الهضبى الشمالى إذ تتوسطه بحيرة كيوجا Keyoga التى يصب فيها نيل فكتوريا قادماً من بحيرة فكتوريا عبر شلالات ريبون Ripon . ثم يخرج منها ويصب فى بحيرة ألبرت عند شلالات مرتشيزون Murchison . وقد تصدعت الهضبة لوقوعها بين فرعى الأخدود الإفريقى فظهرت بعض الأخاديد الفرعية الجانبية مع جبال إندفاعية ولاسيما فى الشمال .

(ج) إقليم الأخدود النيلى الذى يشكل جزءاً من الفرع الغربى للأخدود الإفريقى العظيم . ويشغله كل من بحيرة إدوارد التى يخرج منها نهر سمليكى Semliki ليصب فى بحيرة ألبرت . ومنها يخرج باسم نيل ألبرت حتى يدخل السودان الجنوبي باسم نيل بحر الجبل .

وبحيرة ألبرت (٥٣٠ كم٢) بحيرة أخدودية طوليه عميقة . وتفضل هذه البحيرة على بحيرة فكتوريا من الوجهة المائية بأن سواحلها المرتفعة الأخدودية تجعلها صالحة لأن يخزن فيها مقدار عظيم من المياه دون أن تزداد نسبة التبخر من مائها . لأن مساحة سطحها لا تزداد بإرتفاع مستواها إزدياداً كبيراً . كما

تنتهى إليها مياه أعالي النيل مما يؤدي إلى إرتفاع تصرفها كما يبدو من الجدول المرفق . ويتضح منه أيضاً أن متوسط ما ينصب من بحيرة فكتوريا فى النيل هو ٥٦ مليون من الأمطار المكعبة فى اليوم أى حوالى ٦١٢ متراً مكعباً فى الثانية . ويبدو أن هذا التصرف ضعيف إذ أن المساحة السطحية لماء البحيرة يزيد على ٦٦,٠٠٠ كم<sup>٢</sup> . وأن منسوبها لا يتغير إلا قليلاً ويرجع السبب فى ذلك الى عظم ماتفقده البحيرة بالتبخر . فإن نسبة ماتفقده البحيرة بالتبخر الى ما ينصرف منها فى نهر النيل هو بنسبة (٩ : ٢) . وقد قدر أن الكميات المختلفة من المياه المكتسبة والمفقودة على أساس عمق المياه فى البحيرة هى على النحو الآتى تقريباً :

المكتسب من الأمطار ١٢٠ سم

المكتسب من الأنهار التى تصب فيها ٣٠ سم

الفاقد من التبخر ١٢٠ سم

الفاقد من تصرف نيل فكتوريا ٣٠ سم

فمقادير الأمطار والتبخر متعادلة تقريباً . وتبلغ نحو أربعة أمثال كمية المياه التى تدخل الى البحيرة أو تخرج بواسطة الأنهار

معدل المتوسط الشهري للتصرف ١٩١٢ - ١٩٤٢  
بالمليون من الأمتار الكمية في اليوم<sup>١</sup>

السنة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الموقع
٩٣	٦٣	١٥٥	٢٧٦	٣٢٥	١٩٣	٧	٢	٢	٢	٤	١٤	٧٣	١ - فرع رشيد
٤٤	٣٠	٧٠	١٢٨	١٤٧	٨٩	١٥	٧	٣	٢	٥	١١	٢٠	٢ - فرع دمياط
٢٣٥	١٥٢	٢٤٧	٤٧٩	٧١٨	٦١٤	١٦٤	٦٤	٥١	٥٥	٦٦	٨٦	١١٧	٣ - النيل الرئيسي عند حلفا
٣٢	٢	٦	٢٦	١١٦	١٧٢	٥٥	٣	-	-	-	-	-	٤ - نهر عطبرة عند المصب
١٤١	٤٥	٩١	٢٥٥	٤٨٣	٥٠٣	١٨٢	٤٢	١٦	١١	١٤	١٧	٢٦	٥ - النيل الأزرق عند الخرطوم
٦٩	٩١	١٠١	١١٧	٩٥	٤٩	٤٦	٥٣	٤٦	٤٦	٥٠	٦١	٧٧	٦ - النيل الأبيض عند الخرطوم
٣٦	٥٣	٦٦	٦٤	٥٩	٥٢	٤٢	٢٩	١٤	٨	٩	١٣	٢٦	٧ - نهر السرايط عند المصب

السنة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الموقع
٣٩	٤١	٣٩	٤١	٤٠	٣٨	٣٦	٣٦	٣٧	٣٨	٤٠	٤١	٤٣	٨ - النيل الأبيض في نهاية الاستقاعات
٧٤	٧٠	٧٩	٨٠	٩٠	٨٩	٧٩	٧٤	٧٥	٦٢	٥٨	٦٠	٦٤	٩ - بحر الجبل عند منجلا
٦٥	٧١	٧١	٦٩	٦٦	٦٤	٦٢	٦٢	٦١	٥٩	٦٠	٦٣	٦٧	١٠ - بحر الجبل شمال بحيرة البرت
٥٦	٥٣	٥٢	٥٣	٥٤	٥٧	٦٠	٦٤	٦٣	٥٧	٥٣	٥٢	٥٢	١١ - نيل لكثوريا شمال شلالات ربيون

١- أ. هرسنت : موجز عن حوض النيل - القاهرة ١٩٤٦ - ص ٥٧

ترجمة محمد تنظيم - وزارة الأشغال

ومناخها تمتاز أو عنده مناخ استوائى هضبى رطب مع مدى حرارى ضعيف على مدار السنة . والأمطار طول العام فى القسم الاوسط بمعدل نحو ٢٠٠ سم . وتقل الأمطار فى المناطق الغربية وفى أراضى ظل المطر الى نحو ١٢٥ سم . كما تقل الأمطار فى الأطراف الشمالية والجنوبية الى نحو ١٠٠ سم . مع فصل جاف فى نحو ثلاثة أشهر فى الجنوب من يونيو الى أغسطس . وفصل الجفاف فى الشمال يمتد من ديسمبر الى مارس . والغطاء النباتى يتمثل فى سقانا غنية مع أشجار متناثرة . وقد قطعت مساحات كبيرة لتحل محلها زراعة الحبوب كالذرة والأرز وأشجار الموز والشاى والبن والقطن والأخشاب الإقتصادية . مع إنتشار المراعى فى الأحواض الداخلية ولاسيما فى الشمال الهضبى وفى أراضى ظل المطر .

والتركيب السكانى يتمثل فى مجموعتين إحداهما شمالية من الجماعات النيلية الزنجية الحامية يشبهون فى ذلك قبائل السودان الجنوبى المجاور وغالبيتهم من المسلمين ويعملون فى الزراعة ولاسيما الحبوب والرعى .

وأما المجموعة الثانية فهم سكان الجنوب من زنوج البانتو Bantu ويعملون أساساً فى الزراعة . هذا بالإضافة الى أقلية أوربية فى حدود ١٥ ألف نسمة كانوا الى عهد قريب يسيطرن على النشاط الصناعى والتجارى إلا أن الأهالى فى السنوات الأخيرة بدؤا يندمجون فى هذا النوع من النشاط الإقتصادى . مع أقلية من الآسيويين فى نحو مائة ألف نسمة أغليبيهم من الهنود يعملون فى التجارة والخدمات العامة ومصانه حليج القطن وزراعة قصب السكر وبعض المحاصيل النقدية .

وقد ظهرت أخيراً طبقة من الأفارقة تنافس الآسيويين فى تنوع نشاطهم الإقتصادى . وأمام المقاومة الشعبية للأجانب قامت الحكومة الأوغندية بتأميم الشركات والأعمال الأجنبية لصالح الأهالى . وانكمش عدد الأجانب تدريجياً

ولم يبق منهم إلا ذوى الخبرة الفنية العالية لخدمة الدولة . ويحل محلهم الأفارقة الذين اكتسبوا خبرة فنية وعلمية عالية . وقد بلغ عدد السكان وفق إحصاء ١٩٦٩ الى نحو ٩,٥ مليون نسمة قد تضاعف عددهم فوصل الى نحو ٢٠ مليون نسمة . وقد ساعد على سرعة النمو السكانى إنخفاض نسب الوفيات مع التّقدم الصحى والعى الثقافى بالإضافة الى الهجرة الواردة من البلاد المجاورة ولاسيما السودان .وزائير لأسباب سياسية مع الرغبة فى تحقيق فرص العمل المتاحة .

وقتاز أوغنده بإنتشار المدن الصغيرة والقرى الزراعيه . ومن أهم مدنها العاصمة كامبالا Kampala التى قارت على مليون نسمة ومدينة جنجا Jinja الصناعية بنحو ٢٥٠ ألف نسمة عند مخرج نيل فكتوريا قرب العاصمة.

وإقتصادياً يشكل إقليم بوغنده أهم نطاق إقتصادى فى البلاد ممتداً فى شريط من السهول الساحلية الى الشمال من بحيرة فكتوريا تكتنفه بعض اللاجوانات والسيخات البحيرية الضحلة . ويليّه شمالاً شريط من التلال القبابية حيث تتناثر قرى المزارعين . وتنحدر الهضبة الشمالية نحو الإقليم تدريجياً . وقد تميز الإقليم السهل بتنوع فى التربة ما بين تربة رسوبية فيضية نهريّة فى أشربة طويلة مع المجارى النهرية القصيرة التى تنتهى الى البحيرة بالإضافة الى وادى نيل فكتوريا الرئيسى . وكذلك تربة سبخية شاطئية فى دور التجفيف والاستصلاح . والتربة الحمراء مع التربة الكثيبه على طول نطاق التلال التى يفصل بينها احواض صغيرة . وإمتدت غابات استوائية كثيفة فى شريط ضيق مع السهل الساحلى - يليها حشائش السفانا وشجيرات . وقد قطع معظمها وحلت مكانها مزارع الأشجار الإقتصادية من بن وموز وقطن وفاكهة وخضروات وكذلك مزارع الحبوب مثل الذرة والكسافا والبطاطه الحلوة ولاسيما بجوار

المدن . وإنتشرت الصناعات المختلفة معتمدة على المواد الخام المحلية مع إستثمار مساقط المياه فى توليد طاقة كهربائية كبيرة تغذى هذه الصناعات . ويوزع الإنتاج عن طريق شبكة من الطرق والسكك الحديدية فى إقليم مزدحم بالسكان مع قائض للتصدير يتم عن طريق الموانئ بكينيا المجاورة ولاسيما ميناء مومبasa الذى ينتهى عندها طريق السكك الحديدية مخترقاً أوغنده وكينيا . ومن أهم المدن التى تنمو صناعياً وتجارياً مدينة كامبالا Campala العاصمة ومدينة جنجا المجاورة عند مخرج نيل فكتوريا ولاسيما بعد بناء السد وتوليد طاقة كهربائية تقدر بحوالى ١٥٠ مليون كيلو واط يصدر جزء منها الى كينيا . ومن مصانعها مصانعة للأسمنت والنسيج والبيرة وصهر ومعالجة خامات النحاس ومصنع للألواح الفولاذية وتصنيع الفول السوداني ومصانع للملابس . ومدينة إنتيبى Entebbe تشكل مدينة صغيرة فى شبه جزيرة شمال غرب بحيرة فكتوريا الى الجنوب من كامبالا بنحو ٢٢ كم . وموقعها فى إقليم سنجى بحيرى شديد الحرارة طول العام جعل غمها بطيئاً مما أدى الى نقل العاصمة الى كامبالا التى تمتاز بموقع ثلاثى أفضل وتشكل مركزاً لشبكة من الطرق العامة . يدعمها الخط الحديدى فى نفوس كبير حول إقليم بحيرة كيوجا Kioga ممتداً حتى ممبا على ساحل المحيط الهندى بكينيا .

والى الشرق من أوغنده يمتد شريط من مرتفعات الجبل البركانية فى مجموعة من سلاسل متوازية تحتضن أودية طوليه ويليها غرباً نطاق من التلال التى تنحدر نحو سهل بحيرة كيوجا . وقد غطيت بالغابات وحشائش السافانا . وقطعت مساحات كبيرة لتحل زراعة القطن والبن وتربية الماشية فى كثافتسكانيه بنحو ٤٠٠ نسمة كم ٢ من مزارعين ورعاء . والى الجنوب الغربى تمتد منطقة أخرى من السهول والهضاب المنخفضة مابين الحدود مع تنزانيا حتى الحافة الأخدودية لبحيرة ألبرت . وهى منطقة مزدحمة بالسكان تحولت الى



أراضى فسيحة لزراعة الحبوب والقطن والبن وتشكل إستمراراً للمنطقة المجاورة فى بوغنده . كما أن خط السكة الحديد مخترقاً المنطقة الى مدينه كاسيسا عند سفوح جبل روونزورى Ruwenzori جنوب بحيرة ألبرت وماينتهى اليه من طرق برية قد ساهم فى التوسع فى زراعة قصب السكر والشاى والتبغ .

والنطاق الشمالى ما بين بحيرة كيوجا Kioga الى حدود السودان يسوده المظهر الهضبى الموج . وقد إخترقه الخائق الأخدودى لنهر نيل فكتوريا الذى ينتهى الى بحيرة ألبرت ليخرج منها باسم نيل البرت حتى حدود السودان إذ يدخل السودان الجنوبي باسم نهر بحر الجبل . وهو إقليم السفانا الرئيسى فى أوغنده حيث تسود حوفة رعى الماشية مع زراعة الحبوب.

## ٢- جمهورية كينيا :

تقع هذه الجمهورية التى إستقلت ١٩٦٣ من الإستعمار البريطانى فى «ضبة البحيرات الإستوائية محاطة بأثيوبيا والسودان شمالاً وأوغنده غرباً مع جزء من بحيرة فكتوريا وتانزانيا جنوباً . والصومال والمحيط الهندى شرقاً . ويمر خط الاستواء من منتصفها . وتبلغ مساحتها نحو ٥٨٣ ألف كم<sup>٢</sup> يسكنها حوالى ٢٥ مليون نسمة . والأقلية الأوربية وصلت أثناء الاستعمار الى نحو ٦٧ ألف نسمة يسكنون فى نيروبي Nairobi العاصمة وماحولها فى أرض الهضبة البيضاء ذات المناخ المعتدل ويملكون نحو ٢٥ ٪ من الأراضى الزراعية الجيدة يعمل فيها الأهالى اجراء لمصلحة المستعمر الأوربى فى معاملة سيئة أدت الى نمو المقاومة الشعبية التى عرفت بجماعة الماوماو وتلك المنظمة التى أشاعت الرعب فى نفوس هذه الأقلية والتى أدت الى إنكماشها تدريجياً ثم إستقلال البلاد . كما توجد أقلية أخرى من الهنود الآسيويين بنحو ١٤٠ ألف نسمة يعملون فى ميدان التجارة والخدمات العامة فى المدن المختلفة . والعرب يشكلون أقلية كبيرة بنحو مليون نسمة قدموا من شبه الجزيرة العربية منذ نحو ثلاثة آلاف عام . وهم الذين أسسوا مملكة زنجبار الساحلية التى أخضعها البرتغال لنفوذهم عام ١٩٤٨م . ثم تمكن العرب بعد قرنين من الزمان من طرد البرتغاليين . ثم حل محلهم النفوذ الأوربى ممثلاً فى الإنجليز بعد فترة من الزمن . إذ سيطرت بريطانيا على كينيا بعد أن اشترتها شركة شرق أفريقيا البريطانية من سلطان زنجبار وأعلنتها مستعمرة بريطانية عام ١٨٩٥ .

وتضاريسيا تنقسم كينيا الى عدد من الأقاليم المتباينة على النحو الآتى :

أ) إقليم بحيرة فكتوريا وهو يشكل جزءاً صغيراً من البحيرة فى قسمها الشمالى الشرقى يتمثل فى خليج بحيرى يحيطه شريط من سهل ضيق تكتنفه مرتفعات عالية أخدودية المظهر .

ب) إقليم أخدودى فى أقصى الغرب حيث بحيرة رودلف Rudolf الطولية الأخدودية كجزء من الفرع الشرقى للأخدود الأفريقى العظيم . وتنحدر الحافات نحو البحيرة إنحداراً شديداً مع قمم بركانية مثل قمة جبل كينيا بإرتفاع يصل الى ٥٢٠٠ متر على الجانب الشرقى لهذا الأخدود وقمه جبل إلجون بإرتفاع ٤٣٠٠ م على الجانب الإخدودى الغربى . ويمتد الأخدود مع حدود كينيا الغربية مع السودان .

ج) إقليم الهضبة الذى يسود معظم كينيا فى سطح موج ينحدر تدريجياً فى مدرجات متوالية نحو السهل الشرقى وقد قطع بخوانق تجرى فيها أنهار أخدودية .

د) السهل الشرقى الذى يتسع شمالاً ويضيق جنوباً نحو سهل تنزانيا . وينحدر نحو المحيط الهندى ببطء شديد . وقد قطع ببعض أنهار قصيرة آتية من الهضبة بجاريها الأخدودية الهضبية . وتقطع السهل فى أودية نهريّة بتربة رسوبية فيضية خصبة .

ومن هذه الأنهار نهر تانا Tana ونهر آثى Athi وعلى مصبه ميناء مالندى Malindi عند ساحل قليل التعاريج شمال جزر زنجبار Zanzibar.

ومناخياً يسود الهضبة مناخ معتدل على مدار السنة رغم وقوعها فى النطاق الإستوائى وذلك لعظم إرتفاعها بمعدل يصل إلى نحو ١٣٠٠ متر .

ونيروى العاصمة لإرتفاعها الى نحو ١٧٠٠ متر تتمتع بمناخ معتدل فدرجة الحرارة العظمى تصل الى نحو ٢٥م بينما يهبط متوسط درجة الحرارة الصغرى الى نحو ٤م . وتصل الأمطار الى نحو ١٠٠ سم سنوياً تسقط معظمها فى المنطقة الغربية الأخدودية المرتفعة ذات الجبال العالية . وهذه الأمطار كثيراً ماتتذبذب ما بين ٥٠ الى ١٥٠ سم .

والنبات الطبيعي يختلف من منطقة لأخرى وفقاً للإرتفاع وكمية الأمطار  
فحشائش السثانا مع أشجار متناثرة تغطى معظم الهضبة . إلا أنها تختفى عند  
إرتفاع ٢٠٠٠ متر لتظهر الغابات المعتدلة مع حشائش ومراعى خضراء حتى  
إرتفاع ٣٠٠٠ متر . وتختفى الأشجار وعند إرتفاع ٤٠٠٠ متر حيث يسود  
مراعى الألب حتى خط الثلج الدائم عند القمم العالية مثل جبل كينيا وجبل  
المجون . كما تمتد حشائش السثانا أيضاً فى السهول المجاورة . وقد قطعت  
مساحات واسعة من الغطاء النباتى لتحل محلها أنواع الزراعة المختلفة ومزارع  
الأعلاف للثروة الحيوانية .

وأهم مناطق الإنتاج الزراعى وأكثرها إزدحاماً بالسكان هى : -

(١) إقليم الهضبة مابين إرتفاع ١٢٠٠ الى ٢٠٠٠ متر إذ تسود تربة خصبة  
بركانية وأمطار متوفرة . فقطعت مساحات كبيرة من حشائش السثانا وحلت  
زراعة الحاصلات الغذائية كالشعير والسيسال والقمح والشوفان وبعض الأشجار  
الإقتصادية . وأهم المدن نيروبي بأكثر من ٦٠٠ ألف نسمة وتقع على الخط  
الحديدي مابين ممبسة وأوغنده ماراً بكيسومو Kisumu على البحيرة .

(٢) إقليم السهول الشرقية الى الشرق من الهضبة يتسع فى الشمال ويضيق  
جنوباً . وقد قطع ببعض الأنهار التى كونت أشرطه من تربة رسوبية فيضية  
خصبة بالإضافة الى التربة الرملية الجيرية والتربة السبخية حول اللاجونات  
الساحلية وتربة التفتتات المرجانية . والأمطار متوفرة فى القسم الجنوبى التى  
تسقطها رياح محيطية جنوبية شرقية ثم تتحرك شمالاً موازية للساحل الشمالى  
لتتم دورتها الهوائية فلا تسقط أمطاراً تقريباً مما أدى الى ظاهرة الجفاف فى  
القرن الإفريقى . ولاسيما أن الحرارة مرتفعة مما تزيد فى جفاف الإقليم . وقد  
قطعت مساحات كبيرة من الغابات المدارية الجنوبية وأحراش السثانا لتحل  
محلها زراعة الأرز والقطن والذرة ونخيل الزيت وقصب السكر . وأما المراعى  
فتسود فى القسم السهلى الشمالى .


ومن أهم المدن مدينة ممبا Mombasa وهى مركز تجارى هام فى نهاية الخط الحديدى مع أوغنده والمنفذ التجارى للدولتين كينيا وأوغنده . وكذلك مدينة مالندى الى الشمال من ممبا على ساحل المحيط الهندى كمركز تجارى وصناعى آخر .

٣) الأقليم الشمالى الهضبى حول بحيرة رودلف Rudolf وهى هضبة داخلية متوسطة الإرتفاع تشكل إقليماً شبه جاف بأمطار قليلة من فلول الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية آتية من المحيط الهندى . ولذلك فينتشر بالاقليم بعض الحشائش القصيرة والشجيرات . وتستثمر فى رعى الماشية .

وقد حولت بعض المساحات الى زراعة الحبوب معتمدة على المياه الحوفية وبعض الأمطار بمعدل نحو ٥٠ سم سنوياً ومياه الأنهار التى تنساب نحو بحيرة رودلف . وهو إقليم منخفض الكشافة السكانية . ولذلك تعمل الدولة على مشروعات التوسع الزراعى باستغلالا الإمكانات المائية المتاحة لتشجيع السكان بالهجرة نحو الشمال .

فقد استثمرت مياه نهر تانا Tana وروافده فى التوسع الزراعى فى تربة سوداء جيدة . كما إستثمرت مياه نهر أثى Athi أيضاً فى زراعة مساحات واسعة من الحبوب ولاسيما الأرز . وإقامة سدود حديثة مع شبكة من القنوات مكن من التوسع فى زراعة الفول السودانى والقطن وفول الصويا والأرز فى أراضى هذه الأودية النهرية المشار اليها والمشروع الحديث تحت الإنجاز هو إقامة سد على نهر تانا الأدنى لرى نحو ١,٥ مليون هكتار من الأراضى الجيدة . والقطن المحصول الرئيسى لهذا المشروع . وقد إستفادت كينيا من السدود التى أقامتها على نهر تانا فى توليد طاقة كهربائية لخدمات المنازل والمصانع فى كل البلاد المجاورة . والسد الذى تحت الإنجاز سيساهم فى الطاقة الكهربائية بالإضافة الى خلق بحيرة صناعية كبيرة تزيد فى الثروة السمكية مع منطقة سياحية جميله.

ومما يدعم هذا النمو الإقتصادي شبكة من الطرق الجيدة التي تتكامل مع الخط الحديدي الرئيسي وفروعه ما بين ممبسا عبر أوغنده الى كمبالا وماحولها وأهم صادرات كينيا هي البن والسيسال والشاي والقطن واللحوم وتأتي بريطانيا في المركز الأول من حيث التعامل تجارياً مع كينيا .



- الهجرات الحامية والسامية إلى افريقية العربية

### ٣ - جمهورية تنزانيا Tanzania،

وتقع ما بين كينيا وأوغنده شمالاً والكنغو أو زائير غرباً وموزبيق جنوباً مطلة على المحيط الهندي . ووقعت تحت الاستعمار الألماني منذ عام ١٨٨٥ عن طريق الشركة الألمانية لشرق إفريقيا . والتي خدعت سلطان جزيرة زنجبار حاكم كل هذه الأراضي بمعاونة شيوخ القبائل وزعمائها عن طريق الهدايا والاموال والأقمشة والنبيد حتى حصلت على الموافقة بمعاهدات تنازل من هؤلاء الزعماء والشيوخ عن مساحات واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها سلطان زنجبار نفسه . وأخطرت الحكومة الألمانية دول معاهدة برلين على ماحصلت عليه من أراضي في شرق إفريقيا وحمايتها لها .

وأمام التهديد الألماني وعدم مسانده بريطانيا اضطّر سلطان زنجبار على قبول الأمر الواقع فوافق على عقد معاهدة مع ألمانيا ومنحها امتيازات في أراضيه . وفي عام ١٨٨٦ إتفقت ألمانيا وبريطانيا على الاعتراف بسيادة السلطان على الأراضي الساحلية أمام جزره لمسافة ١٦ كم من الساحل .

وإتفقت الدولتان على تقسيم الأراضي خلف الشريط الساحلي بينهما كمنطقتي نفوذ الشمالية البريطانية والجنوبية ألمانية . ووافق السلطان على المعاهدة تحت التهديد الاستعماري . ثم باع السلطان مرغماً أراضي الشريط الساحلي للدولتين وأصبحت تنجانيقا مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية . إلا أن الصورة قد تغيرت عقب إنتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا وحلفائها . فضمت مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية للنفوذ البريطاني . وفي الحرب العالمية الثانية وما بعدها استمر الإستعمار البريطاني لتنجانيقا التي إستقلت بعد جهاد طويل شعبي عام ١٩٦١ وتكونت الجمهورية وبالنسبة لجزر زنجبار وبمبا فقد تخلصتان من الحماية البريطانية عام ١٩٦٣ .

ثم ثار الجيش على السلطان وتم طرده . وأعلنت زنجبار إنحداها مع

تنجانيقا فكرننا مايسمى بجمهورية تنزانيا الاتحادية بمساحة تصل الى ٢٢٣, ٨٧٤ كم كدولة مفتوحة على المحيط الهندي بمينائها الرئيسى وعاصمتها دار السلام المركز الرئيسى لتجمع شبكات الطرق والسكك الحديدية.

وتضاريسياً تشكل تنزانيا بلد المتناقضات فى أفريقيا ما بين أعلا قمه فى القاره وهى قمه جبل كلمنجارو Kilimanjaro بارتفاع يصل الى نحو ٦ آلاف متر وبحيرة تنجانيقا Tanganika التى يهبط مستوى سطحها الى ٣٥٨ متراً تحت سطح البحر . وقد تأثرت تنجانيقا الهضبية بنشأة الأخدود الإفريقى وغوه فى أراضيها . إذ يتفرع الى فرعيه الرئيسين الى الشمال من بحيرة نياسا أو ملوى فى أراضي تنزانيا . ولذلك يمكن أن تقسم تنزانيا الى أربعة أقاليم تضاريسيه على النحو الآتى :

(١) إقليم السهل الساحلى والجزر الساحلية . ويمتد فى شريط ضيق من الشمال الى الجنوب إذ يندحز تدريجياً نحو المحيط الهندى وقد قطع بعدد كبير من أنهار قصيرة . بالإضافة الى النهرين الرئيسين وهما نهر روفيجى Rufiji الذى يقطع الهضبة فى قسمها الأوسط نابعاً من الحافة الأخدودية لبحيرة نياسا ليصب بدلتا كبيرة فى المحيط الهندى قرب جزيرة ماڤيا Mafia . ونهر رو فوما Ruvuma الذى يشكل الحدود مع جمهورية موزمبيق نابعاً من نفس الحافة الأخدودية قرب منابع النهر السابق . ويتجه شرقاً ليصب فى المحيط الهندى عند رأس دلجادو Cape Delgado ، ويمتاز الساحل بعدد كبير من اللاجونات والجزر الصغيرة .

(٢) إقليم الفرع الشرقى من الأخدود الأفريقى الذى يبدأ الى الشمال من بحيرة نياسا مخترقاً وسط الهضبة الى غرب كينيا حيث يحيره رودلف . ثم ينثنى نحو الشمال الشرقى مخترقاً جنوب الحبشة الى البحر الأحمر .



٣) إقليم الهضبة : ويسود التنظيم التضاريسى ممثلاً فى هضبة أونيام ويزى الموجه السطح Unyamwezi. وهى تنقسم الى عدة أحواض داخلية بجبال إندفاعيه متناثره ، كرد فعل للنمو الأخدودى . وهى تشكل إستمراراً لهضبة كينيا شمالاً وهضبة موزمبيق جنوباً . وتنحدر تدريجياً نحو السهل الساحلى الشرقى . وقد قطعت بعدد من الأنهار الصغيرة والرئيسية وروافدها وقد أشرنا إليها . كما تنحدر بشدة نحو الجزء الجنوبى من بحيرة فكتوريا الحوضية إذ يفصلها سهل بحيرى ضيق جداً كثير التعاريج والخلجان مع شريط من الجزر البحيرية الصغيرة .

٤) إقليم الفرع الغربى من الأخدود الإفريقى الى الغرب من الهضبة محتضناً بحيرة تنجانيقا الأخدودية الطويلة . ويمتد هذا الفرع الغربى شمالاً بحيث يتضمن بحيرة ادوارد وبحيرة ألبرت ونهر سميلكى بينهما .

ثم يستمر المد الأخدودى ممثلاً فى نيل ألبرت الذى يدخل السودان الجنوبى باسم نيل بحر الجبل .

ومناخياً يسود المناخ المدارى الحار الرطب السهل الشرقى بينما يسود الهضبة مناخ معتدل على مدار السنة وتنخفض درجة الحرارة على المرتفعات العالية . وتتراوح الأمطار ما بين ٧٥٠ مم على السهل الساحلى تصل الى اكثر من ١٠٠٠ مم على الجبال المرتفعة ثم تهبط الى نحو ٥٠٠ مم على الهضبة الداخلية . ومصدر الأمطار رياح موسمية من المحيط الهندى على مدار العام . وتتذبذب كمية الأمطار بين فترة وأخرى . وقد يحل الجفاف بالهضبة الداخلية فتهلك الماشية كما حدث ١٩٦١ . إلا أن نقص الأمطار تعوضه مياه الأنهار الكثيرة التى تنساب الى المحيط الهندى والبحيرات الداخلية مع المياه الجوفية . وتستخدم هذه الانهار فى توليد طاقة كهربائية تغطى إستهلاك البلاد . مع استخدام هذه المياه فى التوسع الزراعى . ونباتياً تظهر الغابات المدارية وغابات

المانجوروف على السهل الساحلى بينما تسود الغابات المعتدلة على المرتفعات وحشائش السفانا على الهضبة الداخلية .

وقد قطعت مساحات واسعة من هذه النباتات حيث التربة البركانية والتربة المدارية الحمراء والتربة الرملية الصفراء وكلها خصبة غنية بالتكوينات العضوية المتحللة فى قطاع التربة . وذلك لتحل زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة .

يصل تعداد السكان الى نحو ٤٠ مليون نسمة فى نمو سكانى سريع من نحو ١٥ مليون نسمة ١٩٧٥ . وترتفع الكثافة السكانية على سفوح المرتفعات فى مدرجات متوالية حيث اعتدال المناخ مع وفرة فى الأمطار وتصل معدل الكثافة الى أكثر من ٣٥٠ نسمة كم<sup>٢</sup> . كما ترتفع الكثافة حول البحيرات الداخلية . إلا أنها تهبط الى أقل من مائة نسمة فى الهضاب الداخلية . هذا فضلاً عن بعض الأقليات من العرب والهنود الآسيويين والاوربيين ولاسيما فى المدن الرئيسية مثل دار السلام العاصمة بسكان يصلون الى نحو ١,٥ مليون نسمة . وهى أيضاً الميناء الرئيسى وكذلك المركز التجارى والصناعى العام على مستوى الجمهورية .

وجزيرتا زنجبار ومبا مزدحمتان بالسكان بمعدل ٤٠٠ ألف نسمة فى الأولى و ١٥٠ ألف نسمة فى الثانية. وتبلغ مساحتهما ١٦٤٢ كم<sup>٢</sup> وأن مساحة زنجبار ضعف مساحة مبا . ويتميز مناخ الجزيرتين بالحرارة المرتفعة ما بين ٢٠ الى ٣٠ م مع رطوبة عالية على مدار العام والأمطار معظم السنة . وتشتهر هذه الجزر بزراعة الأرز والقرنفل ويصدر نصف إنتاج القرنفل الى إندونيسيا ليخلط مع التبغ فى صناعة السجائر .

وتهتم الدولة بالتوسع أيضاً فى زراعة الكاكاو والحمضيات . ومعظم السكان من المسلمين فى مستوى اقتصادى وثقافى وإجتماعى جيد . ويشكلون ركيزه هامة فى إقتصاد الدولة .

#### ٤- جمهورية إثيوبيا ، Ethiopia

ويحيط بها السودان غرباً وشمالاً وكينيا والصومال جنوباً وجنوباً بشرق ويفصلها عن البحر الأحمر كل من جيبوتي وإريتريا . وكانت مستعمرة إيطالية إستقلت بعد الحرب العظمى الثانية وإنهزام المحور الإيطالى الألمانى أمام الحلفاء . كما إستقلت عنها إريتريا بقرار من الأمم المتحدة عام ١٩٩٣ .

فتحولت أثيوبيا الى دولة داخلية منفذها الرئيسى ميناء جيبوتي على مدخل البحر الأحمر وطريق قناة السويس الذى يربط الشرق الإفرقى بحوض البحر المتوسط والمحيط الأطلسى من ناحية والمحيط الهندى والمحيط الهادى من ناحية أخرى . كما ترتبط بشبكات من الطرق الحديثة مع الدول المجاورة .

سـ وتبلغ مساحتها نحو ٩٠٠,٠٠٠ كم٢ وعدد سكانها نحو ٥٠ مليون نسمة يعيشون فى جماعات متناثرة على سطح هضبة الحبشة التى تتوسطها العاصمة أديس أبابا . وكانت الحبشة مركزاً لتلاقى هجرات بشرية حامية وسامية تنتمى لجنس البحر المتوسط آتية من شبه الجزيرة العربية والشمال الأفريقى من ناحية وموجات زنجية آتية من إفريقيا الزنجية المجاورة ، من ناحية أخرى . والتقى الجمعان فتكون سكان إثيوبيا تسودهم ملامح جنس البحر المتوسط مع تأثير زنجى . وتضاريسياً تقسم إثيوبيا الى ثلاثة أقاليم تضاريسية تتمثل فى :

(١) إقليم الفرع الشرقى للأخدود الإفرقى الذى يمتد قاصلاً بين الهضبة الحبشية الشمالية الغربية والهضبة الحبشية الجنوبية الشرقية .

إذ يمتد هذا الخائق الأخدودى العظيم بحيث ترتفع الجوانب فى حافات أخدودية شديدة الانحدار نحو قاع الأخدود الموج السطح . فى مجموعة من الأحواض البحيرية والتى منها حوض بحيرة رودلف ثم حوض بحيرة إستفانى Stefanie وحوض بحيرة شاما Shama وغيرها من البحيرات الحوضية

الصغيرة . ويمتد هذا الحائق الأخدودى فى اتجاه عام من الجنوب الغربى نحو الشمال الشرقى لينفرج فى سهل مثلث الشكل نحو حوض البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الجنوبى .

(٢) إقليم الهضبة الشمالية الغربية . وهى هضبة بركانية يتراوح إرتفاعها ما بين ٣٠٠ الى ٤٠٠٠ متر . موجه السطح وتتكون من طبقات من صخور بركانية قديمة نتيجة للطفوح البركانية من خطوط إنكسارية متقاطعة . وتشبه فى ذلك هضبة اليمن المجاورة ويفصل بينهما حوض البحر الأحمر . كما تمتاز هذه الهضبة بعدد من القمم البركانية العالية مثل قمة رأس داشان Dashan (٤٦٢٠ متراً) الى الشمال الشرقى من بحيرة تانا Tana . وقد قطعت هذه الهضبة بعدد من الحوائق الإنكسارية النهرية والتي من أهمها النيل الأزرق الذى ينبع من بحيرة تانا عند فوهة بركان قديم . ثم يتقوس فى عده خنادق إنكسارية نحو الشمال الغربى ليشكل الراقد الرئيسى لنهر النيل عند الخرطوم . ويجرى موازياً له نهر عطبرة الذى يندفع فى خائق إنكسارى مشابه لحائق النيل الأزرق . وينبع من الهضبة الإريثرية باسم نهر تكازا Takkaza . ونهر السوبات So-bat الذى ينبع هو الآخر فى خائق إنكسارى فى جنوب غرب الهضبة . ثم يتجه صوب الشمال الغربى ليصب فى النيل الرئيسى عند بدايه النيل الأبيض . والأنهار الثلاثة هى الروافد الحبشية لنهر النيل وهى المغذى الاول له بمياه الفيضان الموسمى الصيفى . وأخيراً تشير الى نهر أومو Omo الذى ينبع من جنوب الهضبة ليصب فى شمال بحيرة رودلف Rudolf .

(٣) إقليم الهضبة الجنوبية الشرقية : بمعدل إرتفاع ما بين ٢٠٠٠ الى ١٥٠٠ متر . وتنحدر تدريجياً نحو سهول الصومال . ويخترقها بعض الأنهار التى من أهمها نهر جوبا Juba ونهر أوابى جيبلى وينبعان من الحافة الأخدودية فى اتجاه عام صوب الجنوب الشرقى ليمرا بسهول الصومال نحو المحيط الهندى .

ومناخياً يسود المناخ الموسمي المداري إلا أن إرتفاع الهضبة يعدل من درجات الحرارة . ففي معظم سطح الهضبة تتراوح ما بين ١٥ - ٢٠م وقد تنخفض الى درجة التجمد على القمم الجبلية العالية . وتمتاز بقلة المدى الحراري فهي لا تتجاوز الخمس درجات في أديس أبابا . أما في الأحواض المنخفضة ولاسيما في الهضبة الجنوبية الشرقية فيصل المعدل الحراري صيفاً الى نحو ٣٥م في المتوسط وقد تصل أحياناً الى أكثر من ٤٨م . وهي شتاءً في حدود ١٥م .

سوكمية المطر السنوي نحو ١٠٠ سم على الهضبة ولاسيما في أجزائها الغربية والجنوبية الغربية المواجهة للرياح الموسمية الصيفية الجنوبية الغربية من المحيط الأطلسي . وتهبط هذه الكمية الى نحو ٣٥ سم في الأحواض الداخلية وتقل كلما إتجهنا شرقاً وجنوباً بشرق . ومعظم الأمطار في نصف السنة الصيفي بفعل الرياح الموسمية من المحيط الأطلسي نحو الضغط المنخفض على هضبة الحبشة والصحراء الكبرى . وتسقط بعض أمطار في الشتاء بفعل الرياح الجنوبية الغربية من المحيط الهندي وخليج عدن التي تصعد على المرتفعات والمحافات الأخدودية مسقطاً للأمطار .

ونباتياً يتبع الغطاء النباتي مدى الإرتفاع مع كمية الأمطار . فحيث الأمطار الغزيرة في جنوب غرب الهضبة تنمو غابات موسمية . ثم تظهر حشائش السقانا الطويلة مع الشجيرات على سطح الهضبة . وتتحول الى سفانا قصيرة في المنطقة الشرقية والأحواض الداخلية .

وزراعيّاً تتأثر زراعة المحاصيل بالموقع الجغرافي ومدى الإرتفاع والنظام الحراري وكمية الأمطار ومدى تذبذبها والري النهرى وعلى المياه الجوفية ومدى توفر الأيدي العاملة والسوق المستهلكة . فعلى سفوح الهضبة المنخفضة وفي الوديان الداخلية بمعدل إرتفاع أقل من ١٨٠ متر حيث ينعدم الصقيع تزرع الذرة الشامية والذرة الرفيعة والدخن وقصب السكر والتبغ والموز والتبن ونخيل

التمر هندي وبعض أشجار البن . وعلى سطح الهضبة فى إرتفاع ما بين ١٨٠٠ متر الى ٢٧٠٠ متر بالأقليم الذى يسمى محلياً (الوينا ديجا) تنمو محاصيل متنوعة مثل فواكه البحر المتوسط والحمضيات والتين والخوخ والكروم كما تزرع الحبوب مثل الذرة والقمح والشعير وهو أقليم مراعى الماشية والأغنام . والمناطق التى تتراوح إرتفاعها ما بين ٢٧٠٠ متر الى أكثر من ٢٤٠٠ متر زرع بها الحبوب كالقمح والشعير والبطاطس والكتان وبعض الخضروات كما تنمو الأشجار الصنوبرية والنفضية . وهذه تتدرج الى حشائش الألب القصيرة حيث تربي بعض الماشية والأغنام التى تتحمل رطوبة الجو فى ضباب منتشر وإنخفاض فى درجة الحرارة . وفى المناطق الجافة المنخفضة يجمع الصمغ العربى من أشجاره والشمع من خلايا النحل البرى .

وأثيوبيا دولة داخلية تعتمد فى تجارتها على موانئ جيرانها مثل عصب ومصوع وجيبوتى وموانئ الصومال . وأديس أبابا العاصمة تشكل مركزاً مهما للطرق التى تربطها بالموانئ المجاورة الى إريتريا وجيبوتى والصومال والسودان . وهذه الشبكة من الطرق تتكامل من زاوية النقل للبضائع والسكان مع الخط الحديدى الرئيسى الذى يمتد ما بين ميناء جيبوتى والعاصمة أديس أبابا متسلقاً الحافة الجبلية للهضبة المورجة السطح .

وأهم الصادرات تتمثل فى البن والجلود والبلور الزيتية والفواكه والخضروات وبعض الماشية والأخشاب . أما الواردات فأهمها المنسوجات والأدوية والنفط ووسائل النقل والأدوات الكيميائية والميكانيكية والأجهزة بأنواعها الثقيلة والخفيفة وبعض مواد البناء وبعض الأثاث .

## رابعاً، دول إفريقيا الإستوائية

### (جمهورية زائير (الكنغو) -

وكانت مستعمرة ملكيه بلجيكية بمجهودات الملك ليوبولد البلجيكي وهو الذى دعا المكتشف الأيرلندى الأصل ستانلى مكتشف حوض نهر الكنگو بين أعوام ١٨٧٤ إلى ١٨٧٧ لزيارة بروكسل . بعد أن نشر إستانلى تفصيلات رحلته عن حوض الكنگو وثرواته الهائلة من نخيل الزيت وأشجار الأخشاب والمطاط وغيرها . وفأوضه على التعاون معه لتحقيق مشروعات إستثمار حوض الكنگو . وقد وافق إستانلى على عرض الملك البلجيكي بعد أن يثس من إغراء حكومته البريطانية بإعلان الحماية على حوض الكنگو . وفى عام ١٨٧٨ تألفت هيئة دراسة الكنگو كلجنة فرعية من الهيئة الدولية لكشف إفريقيا وتحضيرها التى تكونت فى المؤتمر الدولى الجغرافى الذى دعا إليه فى بروكسل ملك بلجيكا عام ١٨٧٦ للكشف الجغرافى للقارة وتحضيرها ومقاومه تجاره الرقيق وإستثمار الموارد الإقتصادية . وقد أرسلت هيئة دراسة الكنگو المكتشف إستانلى ليأسس محطات تجارية فى هذا الحوض العظيم ويعقد إتفاقات مع زعماء القبائل للحصول على إمتيازات للإستثمار الزراعى ومد الطرق الرئيسية بالحوض . وتم فعلاً فى عام ١٨٨٠ تأسيس ٢٢ محطة على نهر الكنگو وروافده . وعقدت عدة معاهدات مع زعماء القبائل . وفى عام ١٨٨١ تم بناء الطريق البرى ما بين الساحل ومدينة استانلى بول لتفادي الشلالات الخمسة التى تعترض مجرى النهر . وبذلك أصبحت المدينة Stanley Pool المركز الرئيسى بالإقليم . وأمام هذا النجاح الكبير أعلن الملك ليوبولد حكمه الفردى للإقليم متناسياً أهداف المؤتمر والهيئة الدولية . فتنهبت الدول الكبرى كبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وسارعت بالتوغل الإستعمارى فى إفريقيا . وإعترفت الدول الأوروبية بالنفوذ البلجيكي على الكنگو وفقاً لمؤتمر برلين ١٨٨٤ . وتم الإتفاق على

الحدود بين بلجيكا الدولة الحاكمة وكل من فرنسا فى الكنفو الفرنسى برازا فيل Brazzaville والدولة العربية بأعلى الكنفو وكانت دولة مسلمة متقدمة إقتصادياً وثقافياً . ودب الخلاف بين العرب وبلجيكا فقامت الحرب بينهما إنتهت بهزيمة العرب ١٨٩٣ وسخر الأفارقة فى مزارع المطاط وقطع الأخشاب وجمع العاج والعمل بمناجم النحاس فى إقليم كتنجا Katanga جنوب الكنفو . وحددت إقامة الأهالى فى قراهم دون الإنتقال الى غيرها إلا بأمر الحاكم البلجيكى .

وساد الظلم والتعسف إلا أن البرلمان البلجيكى تدخل لإصلاح الموقف . واستمر الحكم الإستعمارى الذى قاومه الشعب الكنفولى حتى نال الإستقلال وإعلان الجمهورية سنة ١٩٦٠ وعاصمتها ليوبولدفيل Leopoldville التى أصبحت كنشاسا kenshasه ولها شقه ضيقه تطل بها على المحيط الأطلسى عند مصب الكنفو منحت لها من قبل أنجولا البرتغالية فى مقابل تنازلها عن رقعة واسعة من إقليمها الجنوبى الغربى ضمت إلى أنجولا البرتغالية فى فترة الإستعمار البرتغالى لها .

ولولا هذا اللسان المائى الضيق لكانت زائير دولة داخلية . وفى عام ١٩٧٠ أصبح اسم الدولة الرسمى جمهورية زائير .

وهى من اكبر دول إفريقيا جنوب الصحراء بمساحة ٢,٢٤٥,٥٠٠ كم<sup>٢</sup> وعدد سكانها نحو ٣٧ مليون نسمة . وهم يتزايدون بنسبة ٢,١ ٪ سنوياً ويؤلف سكان المدن نحو ٣٥ ٪ من السكان والباقى ٦٥ ٪ من سكان الريف . ونحو ٤٠ ٪ من عدد السكان دون سن ١٤ سنة من غير العاملين مما يشكل حملاً ثقيلاً تعوله الدولة . وحركة الهجرة الى المدن مستمرة طلباً للأمن والإستقرار بعيداً عن المنازعات القبلية والحزبية . وتضاريسياً : تنقسم زائير الى ثلاثة أقاليم تضاريسية متباينة هى :



أ) إقليم الأخدود الإنكسارى فى أقصى الشرق ممثلاً فى أخدود بحيرة تنجانيقا Tanganyika المقسمه مابين تانزانيا وزائير وبورندى . وهذا الأخدود الإنكسارى المركب إذ ترتفع الجوانب فى حافات انكسارية شديدة الانحدار نحو قاع البحيرة الهابط . وهو يشكل جزءاً من الفرع الغربى للأخدود الإفريقى العظيم . ويمتد هذا الفرع الغربى محتضناً بحيرة تنجانيقا وبحيرتى إدوارد والبرت التى يخرج منها نيل ألبرت Albert ليدخل السودان الجنوبى باسم نيل بحر الجبل .

ب) الهضبة الجنوبية التى تشغل نحو نصف مساحة زائير . وهى تشكل جزءاً من هضبة الجنوب الإفريقى . وتنحدر بحافات شديدة الانحدار نحو حوض نهر الكنفو . وقد قطعت بعدد كبير من روافد نهر الكنفو صانعه عدداً كبيراً من الشلالات الضخمة التى من أهمها شلالات استانلى Stanley Falls قرب مدينة ستانلى فيل Stanly Ville . وقد قسمت الهضبة الى عدد من الأحواض النهرية والأحواض الداخلية البحرية الصغيرة . وقد فصل بينها بعض الجبال الإندفاعية كرد فعل للحركة الأخدودية التى كونت الأخدود الإفريقى العظيم .

ج) إقليم حوض نهر الكنفو : إذ تشمل الجمهورية معظم حوض نهر زائير أو نهر الكنفو الذى تنتهى إليه مجموعة كبيرة من الفروع والروافد فى شكل مروحة نهريّة ضخمة تلتقى غرب البلاد لتسير فى مجرى واسع عميق يشق طريقه الى المحيط الأطلسى . وقد هبطت هذه الفروع وروافدها من حافة الهضبة من ارتفاع حوالى ٢٢٠ متر مكونة مجموعة من الشلالات النهرية . ويخترق النهر الرئيسى فى تجمع مائى ضخم الطرف الغربى من الهضبة فى مجموعة من الشلالات من أهمها شلالات لفنجستون Livingstone.

وكان هذا الحوض العظيم فى بدايته يتكون من بحيرة داخلية حوضية يحيط

بها نطاق هضبي . وخلال العصر البرمي Permian بأواخر الزمن الجيولوجي الأول تعرضت لتأثير الزحف الجليدي وما ترتب عليه من تكوين ركامات صخرية تناثرت فرق سطحها فتكونت صخور رسوبية سمكية . وبعد فترة العصر الجليدي البرمي غمرت مياه المحيط هذه الهضاب تاركة فوقها رواسب من صخور جيرية ورملية . وفي العصر الجوراسي Jurasى بأواسط الزمن الثاني ، إنحسرت المياه عنها إلا أنها بقيت تغمر قاع الحوض حيث ارسبت طبقات سمكية من الطمي . وفي عصر الميوسين Miosene بأواسط الزمن الثالث وكرد فعل للحركات الألبية الأخدودية العظيمة إنحسرت المياه عن قاع الحوض منصرفاً نحو المحيط في خائق إنكسارى ضخمة . وبقيت آثار هذه البحيرة العظيمة ممثلة في بعض البحيرات الداخلية مثل بحيرة ليوبولد وبحيرة ميرو Mweru ومحولها من مستنقعات . وانتشر النهر وروافده على أنقاض هذه البحيرة .

وذلك في شكل نظام مروجي ضخم إذ تجري الفروع والروافد في خوانق انكسارية متشعبة في كل الهضبة ممتدة صوب النهر الرئيسي . وهو يخترق الحوض الذي لا يزيد إرتفاع سطحه عن ٥٠٠ متر مندفعاً نحو الخائق الرئيسي الذي ينتهي الى المحيط الأطلسي . أما النطاق الحوضي الهضبي فيستراوح إرتفاعه ما بين ٧٠٠ إلى ١٠٠٠ متر . وكثرة الشلالات تعيق الملاحة في هذا النهر العظيم . ووجود الشلالات الخمسة في منطقة المصب النهري تعرقل من الوصول الى المحيط . ولتلافى هذا الخائق الكبير مدت سكة حديد من كنبشاسا العاصمة إلى متادي Matadi كما إنتشرت شبكة من الطرق الرئيسية الممهدة للتكامل مع النهر في أجزائه الصالحة للملاحة .

ومناخياً ونباتياً : فيقسم الإقليم الى نطاقين رئيسيين وهما :

أ) الإقليم الشمالى : بمناخه المدارى المطير مع غابات إستوائية كثيفة يمتد من خط عرض ٥ درجة جنوباً حتى قرب الحدود الشمالية . ويتميز بحرارة

مرتفعة ذات مدى حرارى سنوى ضعيف ورطوبة عالية وأمطار غزيرة طول العام .  
فمعدل الحرارة السنوى ٢٥م يمدى حرارى سنوى فى نحو درجتين . أما المدى  
اليومى فيصل الى ١٠م . ومعدل المطر السنوى ٢٠٠ سم فى أمطار تصاعدية .

١ (ب) الإقليم الجنوبى : ممتداً بين خطى عرض ٥° جنوباً و ١٠° جنوباً . وهو  
إقليم السافانا الحار على الهضبة متميزاً بفترة جفاف قصيرة شتاءً . مع معدل  
مطر سنوى ما بين ٧٥ سم الى ١٠٠ سم . حيث تنمو السافانا الغنية بدلاً من  
الغابات الاستوائية . كما أن المدى الحرارى اليومى والسنوى يزيدان على  
مثليهما فى المناخ المدارى الشمالى .

وإستغلالاً للثروة الغابية وللتنوع الزراعى والرعى والتعدينى والصناعى  
امتدت شبكة كبيرة من الطرق والسكك الحديدية تتكامل مع طرق الملاحة النهرية  
فى نهر الكنفو وروافده . ومن أهم خطوط السكك الحديدية الخط الممتد ما بين  
كنشاسا وميناء متادى فى منطقة المصب و ذلك لتتلا فى شلالات لفنجستون  
Livingstone . وخط حديدى آخر يربط ما بين ستانلى فيل Stanley Ville  
ومدينة بنثيرفيل Ponthierville لتفادى شلالات ستانلى على نهر الكنفو .  
كما ترتبط سكك حديد إقليم النحاس بمنطقة شابا مع سكك حديد أنجولا المجاورة  
وزامبيا إذ يمر بمدينة لفنجستون على نهر الزمبىزى . ويستمر الخط الى موانى  
المحيط الهندى حتى مابوتو (لورنسو ماركيز Lourenco Marques)  
عاصمة موزمبيق حيث ينقل النحاس وغيره من الغلات الى موانى التصدير .

وزراعى تعتمد زائر أساساً فى إقتصادها على الزراعة للتصدير والإستهلاك  
المحلى إذ يعمل فى هذا الميدان نحو ٧٥ ٪ من السكان . وقد تطورت الزراعة  
من البدائية الى الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة . فإنتشر استخدام الميكنة  
والمخصبات والدورات الزراعية لتتابع المحاصيل وفقاً لنوع التربة ، وإختيار  
البذور المحسنة والشتلات . وقد قطعت مساحات من الغابات للتنوع الزراعى  
تحت إشراف الدولة ممثلة فى معهد البحوث الزراعية .

ومن أهم المحاصيل الزراعية الغذائية لسد الإستهلاك المحلى الكسافا والموز الإفريقى والبقوليات والفول السوداني فى أراضى السفانا التى تحولت الى مساحات زراعية وكذلك على طول الأودية النهرية . وأهم المحاصيل النقدية نخيل الزيت، المطاط، الكاكاو والبن والقطن . ويبلغ المعدل السنوى لما يصدر من زيت النخيل ٢٠٠ ألف طن قش ١٨ ٪ من إنتاج القارة . وتمتلك الشركات مساحات زراعية واسعة تقدر بنحو نصف المساحة الزراعية . كما تشجع الدول صغار الملاك .

والكاكاو يسود فى التربة الصلصالية العميقة إلا أن معدل إنتاجه السنوى لايزيد عن سبعة آلاف طن وتعمل الدولة على التوسع فى زراعته مستقبلاً . وانتشرت زراعة البن مع القطن فى المناطق جيدة الصرف بالإقليم الشرقى حيث فترة جفاف قصيرة .

ووصل معدل إنتاج البن سنوياً نحو ٣٥ ألف طن من أنواع جيدة على إرتفاع ما بين ١١٠٠ إلى ٢٤٠٠ متراً . وتوسعت زائير فى زراعة قصب السكر وصناعة السكر لتغطية الإستهلاك المحلى المتزايد سنوياً بإنتاج سنوى يصل الى نحو ٤٠ ألف طن .

والمعادن تشكل أهم صادرات اللاد ومعظمها يأتى من إقليم شابا حيث يوجد معدن النحاس بكميات كبيرة . ويصدر منه سنوياً نحو ٣٥٠ ألف طن أو ٨ ٪ من الإنتاج العالمى . ويمتاز خام النحاس بإرتفاع نسبة المعدن فيه أفضل من خامات شيلى والولايات المتحدة الأمريكية . والمنطقة الجنوبية الشرقية هى أهم مناطق تعدين النحاس حيث يصهر الى صفائح فى مصانع البزايث قبل Eliza bethville ومنطقة كولوزى إلى الغرب من المنطقة السابقة تمثل مركزاً رئيسياً لتعدين الخامات بالاعتماد على الطاقة الكهربائية الضخمة من مساقط المياه النهرية لروافد الكنفو والتى منها نهر لوفيرا Lufyra ونهر لوفوجو Luvugo

ونهر لوبيلاش Lubilash. وينتج إقليم شابا أيضاً بالإضافة الى خام النحاس وبما يقدر ما بين نصف وثلث الإنتاج العالمى من معدن الكوبالت ومعدن الزنك .

بالإضافة الى معدن الفضة والذهب . وتنتج زائير معظم إحتياجات العالم تقريباً من معدن الراديوم . كما تستخرج خامات معدن المنجنيز من مناجم قرب الحدود مع أنجولا بجوار خط السكة الحديدية الذى يمر بمنابع نهر لوبودى -Lubu di وهو من روافد نهر الكونغو بشلالاته القوية . كما يوجد المنجم الرئيسى للماس بإقليم كاساي Kasai الى الشمال الغربى من إقليم شابا أو كاتانجا Katanga حيث يقطع الماس ويصقل فى مصانع مدينة تشكابا Tchikapa.

والصادرات الرئيسية ممثلة فى النحاس والكوبالت والماس والبن وزيت النخيل . وأما القطن والكاكاو فيصدران بكميات قليلة فى بعض السنين وإنتاج الحبوب والخضروات والفاكهة وقصب السكر فللمساهمة فى تغطية الإستهلاك المحلى المتزايد سنوياً مع النمو السكانى السريع . وتستورد معظم المصنوعات كالأدوات الكهربائية والأجهزة الميكانيكية والسيارات والقاطرات وقطع الغيار بأنواعها المختلفة والأدوية وبعض المواد الغذائية ولاسيما المحفوظة والمعلبة منها . ، والمنسوجات بأنواعها المختلفة وأدوات الزينة والكماليات وغيرها . والميزان التجارى لصالح الدولة لإرتفاع اسعار الثروة المعدنية بنوع خاص فى الأسواق العالمية .

وبالبلاد فى حاجة ماسة الى التوسع فى استثمار الطاقة الكهربائية من مساقط المياه المتعددة لإقامة المصانع والخدمات المدنية ، وكذلك التوسع فى مد شبكات الطرق وتحسين مستوى الخدمات الصحية والثقافية والتوسع الأفقى والرأسى للإنتاج الزراعى والرعى وإستثمار الثروة السمكية النهرية والبحيرية والبحرية فضلاً عن الربط الجوى بالعالم .

## ٢- جمهورية إفريقيا الوسطى :

وهى إحدى مقاطعات إفريقيا الإستوائية الفرنسية سابقاً بإسم أوبنجى - شارى Ubangi-Shari نسبة الى نهر أوبانجى الرافد الأول لنهر الكنفو شمالاً ونهر شارى النهر الرئيسى الذى يصب فى بحيرة تشاد شمالاً وهى مقسمة سياسياً ما بين جمهوريات تشاد ولها نصف البحيرة شرقاً والنيجر ونيجيريا ولهما النصف الغربى بالمناصفة تقريباً كما يمتد اللسان الشمالى للكمرون حتى الساحل الجنوبى للبحيرة . وقد إستقلت إفريقيا الوسطى ١٩٦٠ بعد إستعمار فرنسى لأكثر من سبعين عاماً . وبقيت ضمن الجماعة الفرنسية الإفريقية . وعلى الرغم من كبر مساحتها التى تفوق مساحة العراق وملاءمة مقوماتها الجغرافية الطبيعية للإنتاج الزراعى فإن عدد سكانها يزيد قليلاً على ثلاثة ملايين نسمة . وذلك بسبب هجرة السكان الى المناطق المجاورة هروباً من قسوة الإستعمار الفرنسى .

وهى تتصل بشبكة من الطرق بجاراتها زائير والكنغو الشعبية والكمرون وتشاد والسودان مما يسهل حركة السكان والنقل بينها .

وتضاريسياً يسود النظام الهضبى الحوضى بمعدل إرتفاع نحو ٦٠٠ متر . بحيث ترتفع الهضبة تدريجياً نحو الشرق الى خط تقسيم المياه بين نهر أوبانجى وروافده من ناحية ونيل بحر الجبل وروافده من ناحية أخرى . كما ترتفع الهضبة تدريجياً نحو الغرب الى مرتفعات الكمرون التى تشكل هى الأخرى خط تقسيم مياه بين روافد أنهار شارى Shari الذى ينتهى الى بحيرة تشاد وبنوى Benue الرافد الاول لنهر النيجر Niger واوبانجى Ubangi الرافد الاول لنهر الكنفو .

وتنحدر الهضبة شمالاً نحو منخفض تشاد وجنوباً نحو حوض زائير ، وقد قطعت هضبة إفريقيا الوسطى بالأنهار المشار إليها وروافدها فى شبكة متشعبة

من الأودية النهرية الحأنقية المطهر والتي كومت أشرطة من سهول نهريه  
فيضية ضيقة .

ومناخ الهضبة ينتمى الى المناخ المدارى المعتدل بعامل الإرتفاع . مع أمطار  
طؤل العام بمتوسط ما بين ٢٠٠ سم جنوباً الى ١٠٠ سم شمالاً . مما ترتب عليه  
إنتشار حشائش السفانا الطويلة مع بعض غابات مدارية ولاسيما فى بطون  
الادوية النهرية . وإستغلت الحشائش فى تربية ثروة حيوانية من الماشية والأغنام  
والماعز . وقطعت بعض الغابات التى أعيدت زراعتها بغابات إقتصاديه  
للثروة الخشبية . مع التوسع فى زراعة بعض المحاصيل النقدية والغذائية . وذلك  
مثل الفول السودانى والقطن والكافور وزيت النخيل وبعض المطاط والبن .  
ويصدر فائض الإنتاج الى البلاد المجاورة والخارج مع بعض احجار الماس من  
المناجم المحلية . ويستورد معظم المصنوعات الضرورية من الخارج ومن أهمها  
المنسوجات والأدوية والأجهزة بأنواعها من كهربائية وميكانيكية والسيارات  
وسائل النقل وقطع الغيار والأثاث والملابس والأحذية وبعض المواد الغذائية  
وغيرها . وتعتبر بانجى العاصمة Bangui على نهر أوبانجى المركز الأول  
للنشاط الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والصناعى والتجارى فى البلاد .

وهى على إتصال جيد بشبكة من الطرق بباقى البلاد والدول المجاورة إلا أن  
إفريقيا الوسطى فى حاجة ماسة الى نهضة حديثة شاملة فى كل مجالات التوسع  
الزراعى والرعى والصناعى بإستخدام وسائل التقنية العلمية الحديثة . فضلاً  
على مواصلة النهوض بالمستوى الصحى والثقافى .

ولاسيما أن البلاد تمتلك المقومات الجغرافية لتحقيق هذه النهضة من موقع  
جغرافى جيد ومناخ معتدل ومطر وأنماط من تربة خصبة وثروة نباتية وحيوانية  
جيدة وتنوع فى الخامات الزراعية والمعدنية تنتظر حسن الإستثمار .

## خامساً: دول إفريقيا الجنوبية

### ١- جمهورية زامبيا

وهي دولة داخلية تحيط بها أنجولا من الغرب وزائير وتنزانيا من الشمال وملاوى وموزمبيق من الشرق وزمبابوى وناميبيا من الجنوب . وقد عمل الإستعمار على ربطها بخطوط حديدية مع جاراتها أنجولا وزائير وزمبابوى لنقل خامات النحاس الى موانئ التصدير وإستيراد المواد الإستهلاكية والوقود الى مناطق المناجم . وتوفرت الطاقة الكهربائية مع إنشاء سد كاريبا Kariba عند شلالات فكتوريا على نهر زمبيزي الذى يفصل بين زامبيا شمالاً وزمبابوى جنوباً حيث تقع محطة توليد الطاقة الكهربائية . وإستكملت هذه الشبكة من السكك الحديدية لتربط زامبيا بالخط الحديدى الرئيسى فى تنزانيا الذى ينتهى عند ميناء دار السلام كمنفذ لتجارة زامبيا على المحيط الهندى . هذا فضلاً عن شبكات الطرق والنقل النهري فى الزمبيزي وروافده .

ونالت الجمهورية إستقلالها عام ١٩٦٤ من بريطانيا . وذلك بعد كفاح طويل دام عدة سنوات . وكانت منذ عام ١٩٢٤ محمية بريطانية باسم روديسيا الشمالية . وقبلها كانت تحت نفوذ وإدارة شركة جنوب إفريقيا البريطانية .

وتضاريسياً يسود زامبيا نظام هضبي حوضى بمعدل إرتفاع ما بين ٩٠٠ إلى ١٥٠٠ متراً . إذ ترتفع الهضبة تدريجياً شرقاً نحو إقليم بحيرة نياسا Nyasa الأخدودى الجبلى الإنكسارى . كما ترتفع تدريجياً أيضاً صوب الغرب الى مرتفعات أنجولا Angola وصوب الشمال الى مرتفعات كتانجا Katanga بجنوب زائير . وتنحدر جنوباً نحو وادى الزمبيزي الاوسط . وقد قسمت الهضبة الى عدد من الأحواض الصغيرة التى تحتلها بعض البحيرات والسنتجات . وقد فصل بين هذه الأحواض جبال وتلال إندفاعية كرد فعل للحركة الاخدودية المجاورة فى الاخدود الأفريقى العظيم من ناحيتى الشرق والشمال وحركة الرفع بين مرتفعات بنجويلا Benguela بأنجولا غرباً .



وقد قطعت الهضبة تقطيعاً شديداً بنهر الزمبيزي Zambezi وروافده العديدة . والتي من أهمها نهر كافوي Kafue حيث تقع العاصمة لوساكا -Lu-saka قرب التقاء بالنهر الرئيسى . ومن هذه الروافد النهرية أيضاً نهر كابمبو Kabompo فى غرب البلاد .

ومناخياً يسود المناخ المدارى المعتدل بسبب الإرتفاع الهضبى مع أمطار ما بين ٧٥ إلى ١٠٠ سم معظمها فى نصف السنة الصيفى الجنوبي بفعل الرياح المحيطية الموسمية من المحيطين الهندى والأطلسى الجنوبي مندفعة نحو الضغط المنخفض على جنوب القارة إمتداداً للضغط الإستوائى . وفى الشتاء يسود ضغط مرتفع محلى تخرج منه رياح جافة . وأحياناً تتوغل الرياح المحيطية المطيرة نحو الداخل عندما يضعف الضغط المرتفع القارى المحلى .

ونباتياً تنتشر بعض الغابات النفضية ودائمة الخضرة ولاسيما فى بطون الاودية النهرية . وتمتد الحشائش على سطح الهضبة . وقطعت مساحات واسعة من الثروة النباتية لتحل محلها أراضى التوسع الزراعى والرعى الحديثة . واحتجزت بعض المساحات لتكون مناطق سياحية للصيد وحديقة لحيرانات طليقة مثل متنزه كافوي Kafue National Park الى الغرب من العاصمة لوساكا . وتتباين انماط التربة ما بين تربة سبخية ملحية فقيرة حول البحيرات والسبخات الى تربة طفليه حمراء وتربة داكنة صلصالية على سطح الهضبة والمنحدرات الحوضية وتربة رسوبية فيضية فى بطون وجوانب الاودية النهرية . تستثمر فى غو المحاصيل النقدية مثل التبغ والفول السودانى والقطن وقصب السكر بالإضافة الى محاصيل غذائية كالذرة والدخن والكسافا والفواكه المدارية وشبه المدارية .

ومم يعوق التوسع الزراعى ضعف شبكات الطرق وظاهرة الجفاف ولاسيما فى الجنوب . إلا أن الدولة بدأت فى التوسع فى مد الطرق ولاسيما الزراعية مع

تطوير وسائل الري . فنحو ٧٠ ٪ من السكان يعملون في الزراعة والصيد والرعى بمعاونة الدولة في مكافحة ذبابة تسي تسي وتنشيط استخدام التقنية الحديثة ولاسيما الدورات الزراعية ومكافحة أمراض الثروة الحيوانية وتحسين أصل السلالة والغذاء الحيواني عن طريق الاعلاف الحديثة . وبالإضافة الى مياه الامطار فالجارى المائية تعطى مصدراً هاماً لمياه الري . ونهر زمبىزي وروافده يشكلون المصدر المائى النهرى الرئيسى . وحيث ينحدر بشدة عند موقع مارامبا (الفنجستون Livingstone) مكوناً شلالات فكتوريا الشهيرة ، يمتد هذا النهر عندها بالجران فى مضيق طولى إنكسارى إذ أنشأ سد عظيم لحجز المياه مكوناً بحيرة كاريبا الصناعية التى يبلغ طولها ٢٢٤ كم . وتولد عند السد طاقة كهربائية كبيرة . وأما نهر كافوى Kafue فيصرف مياه منطقة النحاس متجهاً جنوباً ليخترق مستنقعات وغابات الصيد السياحية (كافوى) . ثم يجرى فى سهل فيضى بالقرب من العاصمة لوزاكا قبل أن يرفد نهر الزمبىزي . وهو يغذى منطقة مناجم النحاس بمايلزمها من مياه لهذه الصناعة . كما يصرف الشرط الشمالى من زامبيا مياهه نحو نهر لوالابا Lualaba أو أعالي نهر الكنفو أو زانير . وهو لا يصلح للملاحة لكثرة شلالاته وتذبذب كمية مياهه مع تغير كمية الامطار .

وسكانيا يبلغ عدد السكان نحو عشرة ملايين نسمة فى مساحة نحو ٧٤٦,٢٥٠ كم. أى بكثافة نحو ١٢ نسمة كم. ٢ . وهى كثافة منخفضة نسبياً . بسبب فقر التربة وانتشار ذبابة تسي تسي والجفاف النسبى ولاسيما جنوباً وفى الأحواض الداخلية . وعلى الرغم من ضخامة الدخل من إنتاج النحاس فهو أقل بكثير من أن يغطى إحتياجات البلاد لمكافحة الأمراض والتخلف الإقتصادى والثقافى والإجتماعى شأن جميع الدول المتخلفة والنامية . ونحو ٧٠ ٪ من السكان يحترفون الزراعة والرعى والصيد .

والباقي يعيشون فى المدن على جوانب الخطوط الحديدية ولاسيما فى لوزاكا بنحو ٨٠٠,٠٠٠ نسمة ومارامبا (لفنجستون) وكافوى وغيرها . والهجرة مستمرة الى المدن لضعف الخدمات فى الريف . كما تمتد الهجرة الى خارج البلاد ولاسيما الى الدول المجاورة ودولة جنوب إفريقيا لإمكانية فرص العمل . وتشارك النساء الرجال فى العمل الزراعى . فالرجال مهمتهم إعداد الأرض للزراعة . وما تبقى من عمليات زراعية تقع على عاتق النساء . وتعمل الدولة جادة فى رفع المستوى الإقتصادى والثقافى والاجتماعى . فتقدم الكثير من خدمات الري والتقنية الزراعية وإرشاد المزارعين لمتابعة الدورات الزراعية وعلاج فقر التربة وتحسين نسل الماشية ومكافحة الأمراض ونشر التعليم والخدمات المدنية تشجيعاً للفلاحين للبقاء فى أراضيهم . إلا أن الزراعة تعاني من قلة الأيدى العاملة بسبب الهجرة الى المدن ومراكز الصناعة الى الخارج . وقد بدأت ظاهرة الملكية الزراعية الفردية تنتشر بتشجيع من الدولة ولاسيما فى أراضى الودية النهرية لزراعة المحاصيل الغذائية والتغذية . كالذرة والبطاطه الحلوة والكسافا والفلول السودانى والبقوليات بالإضافة الى زراعة القطن والتبغ وقصب السكر وتربية المواشى والدواجن .

ونحو نصف مساحة المحاصيل النقدية تزرع فى المزارع التجارية الواسعة التى يمتلكها كبار المزارعين . وباقى المساحة يزرعها مزارعون صغار مستقرين ومتنقلين . وفق أساليب زراعية بدائية مع شبكة ضعيفة من الطرق الزراعية الى الأسواق المحلية . وينطبق هذا التخلف على وسائل صيد الأسماك من الانهار والبحيرات المحلية . إلا أن الدولة بادرت فى ظل الإستقلال بتشجيع التقنيه العلمية الحديثة فى مناطق التوسع الزراعى والرعى وإرشاد المزارعين والرعاة والصيادين الى أفضل وسائل الإنتاج تدريجياً .

وإنجده الإهتمام نحو استثمار الثروة المعدنية وخاصة النحاس من إقليم شمال

غرب البلاد المجاور لإقليم النحاس الزائيري والفحم من مناجم مامبابواى الزمبيزي . بالإضافة لكميات قليلة من معادن الكوبالت والمنتجنيز والفضة والحديد فى المناطق المتأثرة بالحوادث والإنكسرات.

وتأتى زامبيا فى المركز الثالث عالمياً فى إنتاج النحاس . ويمثل نحو ٩٠ ٪ من قيمة الصادرات . وتتركز مناطق الإنتاج المعدنى فى منطقتين :

أ) الإقليم الشرقى فى وادى نهر لوانجوا Luangwa ووادى نهر كافوى Kafue وما بينهما من أرض هضبية قطعت بروافد هذين النهرين . وكل الشبكة النهرية تنتهى الى نهر زمبيزي الحد الجنوبى لزمبيا .

ب) الإقليم الغربى حتى الحدود مع أنجولا مثلاً فى وادى أعالى نهر زمبيزي وروافده مثل نهر كابمبو Kabompo ونهر كواندو Cuando وما بينهما من إقليم هضبي قطع بروافد نهريه صغيرة .

وقد نشط تعدين النحاس مع الحرب العالمية الثانية لأهميته فى الصناعات الحربية . واستمر غو الإنتاج بعد ذلك ولاسيما لسهولة تصدير معدن النحاس والمعادن الأخرى عن طريق خطين من السكك الحديدية وهما خط يمتد عبر زائير وأنجولا الى ميناء لوبيتو Lobito على المحيط الأطلسى الجنوبى والخط الثانى عبر دولتى زمبابوى وموزمبيق الى ميناء بيرا Beira على المحيط الهندى .

وتعمل زامبيا الآن فى إستكمال الخط الحديدى مع جارتها الصديقة تنزانيا الى دار السلام والتوسع فى شبكات الطرق ولاسيما على طول الاودية النهرية المتشعبة فى أراضيها والبلاد المجاورة مع التوسع أيضاً فى انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية اللازمة للنمو الصناعى والزراعى والخدمات العامة وذلك من مساقط المياه المنتشرة بالبلاد فى سبيل تأمين إستقلالها السياسى والإقتصادى . وأصبحت زامبيا الآن تشرف على إنتاج ثروتها المعدنية ولم تعد للشركات

الأجنبية السلطة العليا عليها . مما ضاعف في الدخل القومي فضلاً على النمو الإقتصادي المتواصل في مجالات :

أ) التوسع الزراعي الأفقى والرأسى عن طريق استصلاح مساحات كبيرة من أراضي السبخات والادوية النهريه ورفع معدلات الإنتاج .

ب) التوسع في إدخال التقنية الحديثة زراعياً ورعوياً وصناعياً.

ج) التوسع في مد شبكات الطرق.

د) رفع المستوى الإقتصادي والصحي والثقافي والإجتماعى .

## ٢ - جمهورية جنوب إفريقيا :

وتقع فى الطرف الجنوبى الضيق من إفريقيا بين مدار الجدى وخط عرض ٣٥ جنوباً . مطلة على المحيط الهندى بساحل طويل قليل الخلجان والموانى الطبيعية والتي من أهمها إيست لندن East London وميناء سانت جونز Port st. Johns ودربان Durban. ومن جهة الغرب تطل على المحيط الأطلسى بساحل قليل الأهمية لفقر ظهيره الشبه جاف . ويحدها شمالاً جمهوريات ناميبيا وتشوانا وزمبابوى وموزمبيق . وتقتد هذه الحدود الشمالية بعد صراع طويل مع قوى الإستعمار المختلفة .

ووصل الى سواحلها البرتغاليون الذين أفسحوا المجال للهولنديين إذ دخلوا البلاد فى جماعات كبيرة هرباً من الإضطهاد فى بلادهم فى أواخر القرن السادس عشر . واختلطوا مع السكان الأصليين من جماعات زنوج البانتو - Bushmen وأضافو سلالة جديدة من المولدين (البوير) . والذين يسمون حالياً بالملونين . وفى أواخر القرن الثامن عشر وصل الإنجليز واستولوا بقواتهم على مقاطعة الكاب Cape . فزحف البوير شمالاً مكونين ولاية الأورنج Orange الحرة وجمهورية الترنسفال Transvaal . وقامت الحرب بين الطرفين إنتهت بإنتصار الإنجليز عام ١٩٠٠ وتكوين إتحاد من أقاليم الأورنج والترانسفال والكاب وناتال Natal . وأعتبر الإتحاد عضواً فى مجموعة الكمنولث Common Wealth إلى أن طرد منها عام ١٩٦١ بسبب ممارسة التفرقة العنصرية بطرق غير إنسانية . وبعد نضال طويل إنتصرت الأغلبية السوداء على الأقلية البيضاء فنشأت جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية التى أصبحت عضواً فى منظمة الوحدة الإفريقية بزعامة مانديلا .

وتبلغ مساحة الجمهورية نحو ١,٢٢٤,٣٠٠ كم<sup>٢</sup> تضم أكثر من ٤٠ مليون نسمة موزعين فى كثافة سكانية متباينة وفقاً لما يأتى :

أ) ما بين ٧٠ الى ١٣٠ نسمة فى كم ٢ على طول السهل الساحلى ما بين مدينة الكاب Cape Town فى الطرف الجنوبى الغربى حتى الطرف الشمالى الشرقى عند الحدود مع موزمبيق . وترتفع الكثافة السكانية الى أكثر من ١٣٠ نسمة كم ٢ فى المدن وماحولها . وهو إقليم يتكون من السهل الساحلى والمقدمات الهضبية بمناخ معتدل وأمطار غزيرة وتربة خصبة وموقع جغرافى جيد .

ب) من ٢٠ - ٧٠ نسمة كم ٢ فى الشريط الهضبى الذى يمتد فى شكل هلالى متضمناً جنوب إقليم رأس الرجاء الصالح بدرجةاته الهضبية Cape of good hope مع القسم الشرقى من إقليمى الاورنج والترانسفال وهو إقليم جبلى متموج السطح حيث مرتفعات دراكنزبرج Drakensberg ويمتاز بمناخ معتدل ومعدل أمطار نحو ١٥٠ سم سنوياً وغطاء نباتى غنى من الثروة الغابية والحشائش المعتدلة . فهو نطاق زراعى رعوى هام غنى بثروته الخشبية .

ج) من ١٠ - ٢٠ نسمة كم ٢ فى القسم الأوسط من الهضبة الحوضية المموجة السطح بمعدل أمطار ١٠٠ سم مع فصل جفاف شتوى . فهو إقليم الرعى الرئيسى مع الزراعة بأساليب حديثة وتقنية متقدمة .

د) من أقل من ١٠ نسمة كم ٢ فى القسم الغربى من الهضبة بمناخ معتدل شبه جاف ومعدل أمطار من ٢٥ - ٥٠ سم سنوياً . وهو إقليم حشائش الاستبس الفقيره . معتمداً فى زراعة الحبوب والرعى على مياه الامطار صيفاً والمياه الجوفية ومياه نهر أورنج وزوافده ولاسيما نهر فال Vaal .

ويؤلف البيض حوالى ٢٥ ٪ من السكان نصفهم يسكن المدن . ويبلغ عدد الملونين نحو ٤ مليون نسمة . وعدد الاسيويين نحو نصف مليون نسمة أكثرهم من الهنود الذين يعملون فى التجارة والخدمات العامة .

وتضاريسياً تنقسم الجمهورية إلى أربعة أقاليم تضاريسية وجغرافية :

(١) إقليم السهول الساحلية الضيقة الذي يحيط بالنظام الهضبي ممثلاً فى السهل الساحلى الشرقى الضيق القليل التعاريج والذي يتسع قليلاً فى جزئه الشمالى ليمتد نحو سهول موزمبيق المحيطية مطلقاً على المحيط الهندى . ويمتد السهل جنوباً فى تقوس هلالى حول الطرف الجنوبى من الهضبة إذ يضيق السهل جداً ويختفى فى بعض الاجزاء لتمتد الهضبة مطلة على المحيط برؤوس بارزة مثل رأس هانجلپ Cape Hanglip ورأس الرجاء الصالح الممتد جنوباً Cape of good hope ويحصران بينهما خليج فالس False Bay. ثم يتقوس السهل الضيق لیساحل الهضبة غرباً مطلقاً على المحيط الأطلسى .

(٢) إقليم المرتفعات الشرقية والمدرجات الجنوبية : ممثلاً فى سلسلة تمتد فى قوسين جبليين فى اتجاه عام من الجنوب الغربى صوب الشمال الشرقى حتى قرب الحدود الجنوبية لجمهورية موزمبيق وهما كواثلامبور Quathlamboor وقوس دراكنز برج Drakensberg. وينحدران بشدة نحو الهضبة الشرقية التى تمتد فى انحدار تدريجى نحو السهل الساحلى الضيق حيث إقليم ناتال الهضبي Natal وسهله الساحلى . وقد قطعت بعدد كبير من الاودية النهرية القصيرة.

وأما المدرجات الجنوبية فهى استمرار لهذا التقوس الجبلى الضخم نحو الجنوب ممثلة فى مدرج نيوفلد Nieuwveld يليه جنوباً مدرج الكارو الكبرى Great Karroo ثم مدرج الكارو الصغرى Little Karroo والذي ينحدر نحو سهل ساحلى ضيق فى إنحدار سلمى شديد .

(٣) إقليم الهضبة ويمتد الى الغرب داخلياً من الإقليم السابق حتى يندمج مع هضبة ناميبيا Namibia فى نظام هضبي حوضى . مثل حوض بحيرة فليبر



GrootVloer التى ينتهى إليها نهر زاك Zak وحوض نهر دورن Doorn وروافده فى الركن الجنوبى الغربى مفتوحاً نحو السهل الساحلى الغربى عند خليج سانت هيلنا St. Helena.

٤) إقليم وادى نهر أورنج وروافده : إذ ينبع النهر الرئيسى من هضبة باستو Basuto Land بعدد من الفروع الإنكسارية الحانقية التى تتجمع لتكون النهر الرئيسى فى مجراه الأعلى . ثم ينساب النهر غرباً فى عدة ثنيات نهريّة مختزقاً الهضبة حتى المحيط الأطلسى . ويرفده نهر فال Vaal فى قسمه الاوسط نابعاً من جبال دراكنزبرج . ويصنع الحد الإدارى بين إقليمى الأورنج جنوباً وترانسفال شمالاً . وينتهى الى نهر أورنج فى قسمه الأدنى مجموعة من الاخوار النهريّة الموسمية آتية من جمهورية نامبيا شمالاً من اقليم صحراوى جاف فتتجمع فيها بعض الامطار الموسمية الصيفية من فلول الرياح الجنوبية الشرقية آتية من المحيط الهندى . وتسقط معظم أمطارها فى الطريق على الهضبة الشرقية . ونهر أورنج فى قسمه الأدنى يشكل الحدود السياسية بين جمهورتى جنوب إفريقيا ونامبيا . ويشكل المصدر الرئيسى للسرى فى مجراه الاوسط والأدنى .

ويمكن أن تقسم الجمهورية الى عدد من الأقاليم الطبيعية تتمثل فى :

#### (١) إقليم الكاب :

ويقع فى الركن الجنوبى الغربى من القارة . إذ يتكون من شريط ضيق من سهول ساحلية تتعرج فى خلجان متعمقة نحو الداخل منها خليج فالس False وخليج ولكر Walker وخليج الكاب Cape يليها جبال إلتوائية تتخللها وديان طولية تمتد مابين الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى . وقد قطعت السلاسل الجبلية بعدد من الممرات المنخفضة . ويجرى فى بعض هذه الوديان أنهار قصيرة منها نهر إيند Einde الذى يصب فى خليج سباستيان

Sebastain ونهر برج Berg الذى يصب فى خليج هيلينا Helena. ويسود الإقليم مناخ البحر المتوسط بأماطاره الشتوية . وهى كافية لزراعة الحبوب ولاسيما القمح وغو حشائش الرعى . فتكثر تربية الماشية والأغنام التى تون منتجاتها سكان المدن . ومنها ميناء كيب تون Cape Town الذى يتصل بالداخل بشبكة متطورة جيدة من الطرق والسكك الحديدية . وهو الميناء الرئيسى بجنوب إفريقيا وعلى إتصال جيد بالعالم الخارجى بشبكة ضخمة من طرق الملاحة البحرية فضلاً عن خطوط الملاحة الجوية .

#### ٢) إقليم الجنوب الغربى الجاف :

وهو يشكل تدرجاً نحو الداخل لإقليم الكاب فى نظام هضبي . وقد قطع ببعض الانهار التى منها نهر أوليفانتس Olifants فى الشمال الذى ينتهى عند ميناء فشووتر Fishwater على المحيط الأطلسى . وكذلك نهر بريد Breede وهو نهر داخلى فى الجنوب . ويستخدم النهران فى رى مزارع الفاكهة والتبغ والكروم فى فصل الصيف الجاف . كما تنمو بعض المحاصيل الشتوية مثل القمح والشعير والشوفان على امطار الشتاء التى تتدرج من ٥٠ الى ٢٥ سم بفلول الرياح الممطرة شتاءً فى شكل أعاصير آتية من الجنوب والجنوب الغربى من المحيط الأطلسى .

وفى الصيف تهب الرياح الجنوبية الشرقية وهى شبه جافة آتية من المحيط الهندى عبر جنوب القارة . وهذه الأمطار تغذى أيضاً المراعى فى الأودية والهضبة الداخلية إذ تربي الماشية والأغنام فى مزارع حديثة للأعلاف . وتعتمد أيضاً على المياه الجوفية . وقد إنتشرت بعض المدن فى هذه الوديان ومنها مدينة ووستر Worcester ومدينة سيرز Ceres ومدينة هاملت Hamlet كمراكز صناعية لتعليب وتجفيف الفاكهة مثل التفاح والبرقوق وغيرها . وكذلك النبيذ من العنب .

### (٣) إقليم الجبحة الجنوبية الرطبة :

ويمتد ما بين رأس جريت فش Great fish point ورأس إنفانتا Cape Infanta في الجنوب الإفريقي ممثلاً في سهل ساحلى ضيق يتدرج نحو المرتفعات الخلفية بإسم جبال لانجبرجن Lange Bergen ويشكل منطقة إنتقال بين مناخ البحر المتوسط غرباً والمناخ الموسمي ذي الأمطار الصيفية شرقاً . إذ تسقط على هذا الإقليم أمطار صيفية بمعدل نحو ٥٠ سم تهبط في الشتاء الى نحو ٢٥ سم . وقد قطع الإقليم بشبكة من الانهار منها نهر جريت فش Great Fish ورافده فش الصغير Little Fish. ويمتاز بتنوع في أنماط التربة ما بين التربة الرسوبية النهرية والتربة السوداء والتربة الطفلية والتربة السبخية الساحلية . فقد إستصلحت مساحات واسعة في أراضي السهل الساحلى والمنحدرات الجبلية التي حولت الى مدرجات لزراعة الاشجار الإقتصادية ولاسيما الفاكهة والكروم . ومن أهم المحاصيل الزراعية المحبوب كالقمح والشوفان وكذلك الخضروات والبقوليات والبطاطس فضلاً عن أراضي المراعى الجيدة ولاسيما على المنحدرات الداخلية .

إذ تنتشر تربية الماشية والأغنام . ويعتمد التوسع الزراعى الرعوى على مياه الأمطار ومياه شبكات الانهار . ومن أهم المدن ميناء إليزابيث Port Elizabeth ومدينة بلانكو Blanco ومدينة George. وهي مراكز للصناعات الغذائية من تعليب وتجفيف للفاكهة وصناعة النبيذ وصناعة مستخرجات الألبان ودباغة الجلود والمنسوجات الصوفية . ويخدم الإقليم شبكة جيده من الطرق والسكك الحديدية .

### (٤) إقليم الكاروو Karroo وإمتهاده الشمالى

متضمناً مدرجات الكاروو الكبرى Great Karroo ويليها جنوباً مدرجات الكاروو الصغرى Little Karroo وما بينهما من مرتفعات زفارت

برج Zwart Berg. ويمتد خلف الإقليم السابق شمالاً في الداخل . والإقليم يعاني قلة في الأمطار بمعدل نحو ٤٠ سم تنخفض غرباً الى ٢٥ سم . وهي أمطار صيفية متذبذبة وتنمو بعض الحشائش تربي عليها أغنام المارينو وماعز الموهير . كما يعتمد الإنتاج الزراعى على مياه الأمطار والرعى من المجارى المائية التى منها نهر جروت Groot وروافده وهي التى تغذى من امطار المرتفعات . وتنتشر زراعة الحبوب والتبغ والكرودم والفاكهة والحمضيات . ويخترق الاقليم خط سكة حديد الرئيسى ما بين مدينة الكاب وجوهانسبرج ماراً ببعض المدن التى منها مدينة كمبرلى Kimberly كمراكز لصناعة الصوف والجلود ومستخرجات الألبان وغيرها وتقل الأمطار تدريجياً الى الشمال والغرب من إقليم الكاروو نحو صحراء كلهارى وتنتشر المراعى الفقيرة حيث تربي الأغنام . ويروى نهر أورانج أراضي واديه والمساحات المجاورة حيث تجود زراعة القطن . وفى أقصى الغرب تقع صحراء ناميب Namib الساحلية التى لاتستلم من الامطار اكثر من ١٢ سم فأرضها رملية قاحله .

##### (٥) إقليم السمبول والمرتفعات الشرقية :

ممثلاً خاصة في إقليم ناتال Natal. ويتكون من شريط من السهول الساحلية الضيقة تتدرج نحو المرتفعات التى تشكل حافة الهضبة الجنوبية .

ومن أهم هذه المرتفعات جبال دراكنزبرج التى ترتفع بعض قممها الى نحو ٣٠٠٠ م . وقد قطع الاقليم بعدد كبير من الأنهار القصيرة . ويسقط معظم المطر فى نصف السنة الصيفى بمعدل نحو ١٠٠ سم على السهول والمنحدرات المواجهة للرياح الجنوبية الشرقية الصيفيه . وتقل الامطار داخلياً ما بين ٥٠ الى ٧٥ سم . وتنتشر الغابات المعتدلة الدفيئة والنفضية على المرتفعات تتخللها مساحات من الحشائش . حيث تربي الإغنام والماشية . وعلى طول السهل الساحلى وفى الاودية النهرية تزرع الحبوب والقطن وقصب السكر والموايح

والفاكهة . وتنتشر المدن على طول السهل الساحلى ومن أهمها مدينة دربان Durban ومدينة إيست لندن East London كمراكز تجارية وللصناعات المختلفة التى من أهمها المنسوجات والسكر والورق وتعليب وتحفيف الفاكهة والمصنوعات الخشبية . وهذه المدن على إتصال جيد بالداخل بشبكة من الطرق والسكك الحديدية . فضلاً عن الملاحة النهرية على طول الأنهار الساحلية والتى تتوغل داخلياً .

#### ٦ إقليم الهضبة الداخلية :

ممتدة فى هضاب الأورنج وترانسفال والبشمن Bushman . ويفصلها شمالاً عن جمهورية زيمبابوى نهر لمبوبو Limpopo الذى يخترق جنوب موزمبيق الى المحيط الهندى . أما رافده نهر نوسوب Nosob فيفصلها عن بلاد بتشوانا Bechuana شمالاً . ونهر اورنج الأدنى يفصلها عن جمهورية ناميبيا Namibia فى أقصى الغرب . وتمتد الهضبة جنوباً حتى مدرجات الكارو وتمتاز الهضبة بتموج السطح فى أحواض داخلية تخترقها الشبكات النهرية وروافدها التى أشرنا إليها . ويتراوح معدل إرتفاعها ما بين ١٢٠٠ الى ١٩٠٠ متر فى قسمها الشرقى يهبط الى ما بين ٥٠٠ الى ٦٠٠ متر فى قسمها الغربى . ويسود مناخ مدارى معتدل بمعدل أمطار تتراوح ما بين ٧٥ إلى ٥٠ سم فى الشرق تهبط الى ما بين ٥٠ الى ٢٥ سم غرباً . ويمتاز الإقليم بأنماط خصبة من التربة منها التربة الرسوبية الفيضية النهرية والتربة السوداء والتربة الطفلية واللصالية البنية . فتسود غابات نفضية على المرتفعات الشرقية بينما تنتشر الحشائش على باقى الهضبة .

وقد قطعت مساحات واسعة لتحل زراعة الاشجار الاقتصادية والحبوب كالذرة والقمح وكذلك التبغ والقطن على الأمطار والرى النهري . وتنتشر بعض المدن مثل بليوم فونتئين Bloem Fontein عاصمة إقليم أورانج ومدينة

جوهانسبرج Johannesburg عاصمة إقليم ترانسفال Transvaal ومدينة  
بريتوريا Pretoria عاصمة الاتحاد جنوب إفريقيا وكلها مدن صناعية وتجارية  
ربطت بشبكة من الطرق والسكك الحديدية .

ويشتهر الإقليم بثروته المعدنية كالذهب بالقرب من جوهانسبرج والماس فى  
حوض نهر أورانج والفحم فى إقليم الكارو وماحوله والنحاس فى وادى نهر لمبويو  
بالشمال الشرقى .

وقمتاز جمهورية جنوب إفريقيا بظواهرات جغرافية متباينة منها :

أولاً: أنها تتضمن مملكتين ضمن أراضيها وهما :

(أ) مملكة لوسوتو Lusoto فى أقصى الجنوب الشرقى من القارة .  
تحتضنها مرتفعات دراكنزبرج والمد الهضبي المجاور . وقد إستقلت ١٩٦٦ من  
الحكم البريطانى ، ومساحتها ٣٤٥ . ٣٠ كم٢ بعدد سكان يصل الى مليون  
ونصف نسمة . وأمطارها تروى زراعة القمح والذره والفاكهه والأشجار  
الاقتصادية مع تربية الماشيه والأغنام فى مراعيها الواسعة . وتعتمد صادراتها  
على الاصواف الجعيده والجلود وشعر الموهير والأخشاب والماس . وربطت  
عاصمتها ماسيرو Masero بخط حديدى وشبكة من الطرق مع جنوب إفريقيا  
لمحركة السكان والنقل التجارى .

(ب) مملكة سوازى Swazi فى الشمال الشرقى من الجمهورية التى تحيط  
بها إلا من جانبها الشرقى فحدودها مع موزمبيق . ويغطى المد الهضبي الذى  
قطع بالروافد العليا لنهر فال Vaal . ومساحتها نحو ٦٧ ألف كم٢ . وسكانها  
نحو ١ , ٥ مليون نسمة من زنج السوازى . وهم رعاة ومزارعون حيث تنتشر  
المراعى الواسعة والأراضى الزراعية على مياه الأمطار والرى النهري لزراعة  
القطن والتبغ والبطاطس والموز وقصب السكر والفول السودانى وغيرها ومن

ثروتها المعدنية الإستبتسوس والفحم . وهذه المملكة التى إستقلت ١٩٦٨ من الحكم البريطانى ترتبط اقتصادياً وسكانياً بجمهورية جنوب إفريقيا بشبكة من الطرق والسكك الحديدية تتفرع من عاصمتها مبابان Mbabane التى ترتبط أيضاً بموزمبيق .

**ثانياً:** تمتاز جمهورية جنوب إفريقيا بالتباين التضارىسى الكبير فهى تشكل هضبة عظيمة المساحة وقد قسمت الى عدة أحواض داخلية تخترقها شبكة من المجارى النهرية وروافدها . وقد تأثرت هذه الهضبة بالأخدود الإفرقى العظيم من ناحية وبالحركة الألبية من ناحية أخرى فظهرت تقوسات جبلية فى شرقها . كما إمتدت المدرجات الجبلية فى جنوبها نحو سهل ساحلى ضيق . وكما أصيبت (الهضبة ببعض المرتفعات الإندفاعية التى ساهمت فى خلق نظامها الحوضى .

**ثالثاً:** تمتاز الجمهورية أيضاً بالتباين المناخى ممثلاً فى المناخ المدارى المعتدل بالسهول والمقدمات الهضبية الجنوبية والجنوبية الشرقية . ومناخ البحر المتوسط فى الركن الجنوبى الغربى بإقليم الكاب . والمناخ الجبلى على طول السلاسل الجبلية الشرقية . والمناخ شبه الجاف فى الهضبة الداخلية والمناخ الصحراوى فى الأطراف الغربية . وماتبع ذلك من تنوع فى الغطاء النباتى ما بين الغابات المدارية والغابات النفضية والغابات الصنوبرية وحشائش الإستبس وحشائش السفانا والنباتات الشوكية الصحراوية . ونتج عن كل ذلك تعدد أنماط التربة من تربة رسوبية فيضية نهرية وتربة السبخات والبحيرات الداخلية والتربة السوداء والتربة الطفلية البنية والتربة البركانية الجبلية والتربة الرملية الصحراوية والتربة الحمراء التى تنتمى الى مناخ البحر المتوسط .

وقد قطعت مساحات واسعة من النباتات الطبيعية وحلت محلها زراعات متنوعة من حبوب وفاكهة ، خضروات وأشجار الكروم والتبغ والقطن وقصب السكر والفول السودانى والنباتات الزيتية والاشجار الإقتصادية لأخشابها

الممتازة من فلين ويلوط وزان وسرو وصنوبر بأنواعه . بالإضافة الى ثروة صناعية ومعدنية متنوعة . وما يدعم هذا التوسع الزراعى والرعى فى تنوع تربية الماشية والاعنام والماعز للحومها وجلودها وصوفها ومستخرجات الألبان والنمو الصناعى والمعدنى أن الدولة تتبع أحدث أساليب التقنيه العلميه الحديثه مع العناية بتنمية شبكة كبيرة من الطرق والسكك الحديدية . لتغذية المدن والأسواق المحلية والمجاورة . فضلاً عن نشاط الموانئ تجارياً . مما جعل دولة جنوب إفريقيا فى مستوى إقتصادى مرموق إفريقياً ودولياً .



## سادساً، الجزر الإفريقية

### ١- جمهورية مالاغاش

تمثلة فى جزيرة مدغشقر Madagascar بالمحيط الهندى . ويفصلها عن الساحل الشرقى الإفريقى مضيق موزمبيق بمسافة نحو ٤٠٠ كم . وتمتد الجزيرة بشكلها المستطيل ما بين خطى عرض ١٢ - ٢٥ جنوباً بطول يصل الى نحو ١٦٠٠ كم ويعرض الى ٦٠٠ كم ما بين الشرق والغرب . وتبلغ مساحتها نحو ٥٨٢ ألف كم<sup>٢</sup> . وعدد سكانها نحو ١٧ مليون نسمة منها جالية فرنسية ٨٠ ألف نسمة وجالية اسيوية ٣٠ ألف نسمة . وأستوطنها العرب قبل البرتغاليين الذين وصلوا إليها فى القرن السادس عشر . وقد أصبحت مستعمرة فرنسية منذ عام ١٨٦٠ . ونالت إستقلالها ١٩٦٠ بعد مقاومة شعبية قوية متواصلة ضد الحكم الفرنسى .

وتضاريسياً تسود الهضبة معظم الجزيرة . وتنحدر حافاتها الشرقية إنحداراً شديداً نحو سهل ساحلى ضيق . بينما تنحدر الهضبة تدريجياً نحو الغرب الى سهل ساحلى يتسع فى تقوس هلالى ليضيق فى الطرف الجنوبى من الجزيرة .

وهى التى فصلت من الشرق الإفريقى المناظر منذ أواخر العصر الترياسى Teriasic فالطبقات الصخرية البلورية القديمة متشابهة على الجانبين . ثم تلتها طبقات جيرية رملية أحدث تنتمى الى الزمنين الثالث والرابع . وقد قطعت الجزيرة بعدد كبير من الأنهار التى تنساب شرقاً وغرباً من خط تقسيم المياه فى شرق الهضبة وهو أعلا أجزائها بإرتفاع نحو ٢٨٠٠ متراً حيث جبال إنكاراترا Ankaratra . ومن أهم هذه الأنهار نهر مانجوكى Mangoky ونهر أونيتاهى Onitahi ويجريان غرباً الى مضيق موزمبيق .

ومناخياً تهب على الجزيرة رياح شرقية وجنوبية شرقية من الضغط المرتفع

الدائم على المحيط الهندي طول العام مع رياح جنوبية وجنوبية غربية آتية من الضغط المرتفع على الجنوب الإفرقي شتاءً وهى تهب موازية للساحل الجنوبي والغربى للجزيرة فلا تسقط إلا القليل من الأمطار . ولذلك فإن السهل الساحلى الشرقى والمقدمات الجبلية تستلم أمطاراً سنوية تزيد على ٣٠٠ سم .

وهى تقل تدريجياً نحو الداخل لتصل الى نحو ما بين ١٠٠ - ٢٠٠ سم على الهضبة لتقل فى الأجزاء الغربية والسهل الجنوبي الغربى الى ما بين ٥٠ - ٧٥ سم . وهى أقل من ٥٠ سم فى الطرف الجنوبي والجنوبى الغربى من الجزيرة .

والنبات الطبيعى يتمثل فى الغابات المدارية على طول السهل الساحلى الشرقى والمقدمات الهضبية . ويتخللها غابات المانجروف Mangrove فى أراضي السبخات واللاجونات الساحلية . وتنتشر على الهضبة حشائش السفانا للرعى . وقد قطعت مساحات واسعة لتحل زراعة الكثير من المحاصيل الزراعية مثل الأرز والبن والذرة والتبغ والكسافا وقصب السكر والموز والكافا والفانيليا والقرنفل والمطاط والأخشاب الثمينة للتصدير من فائض الإستهلاك المحلى .

ومن المراكز التجارية الهامة ميناء تاما تاف Tamatave على الساحل الشرقى . وتتصل بخط حديدى بالعاصمة تانا ناريف Tana narive على الهضبة فى الداخل . فضلاً عن شبكة من الطرق البرية الجيدة . وكذلك قناة ملاحية طويلة حفرت خلف الكثبان الرملية الساحلية لتربط بين اللاجونات بالسهل الساحلى الشرقى ما بين تاما تاف شمالاً ومانا نجارى Mananjary جنوباً . بالإضافة الى الملاحة النهرية بالأنهار الرئيسية المشار إليها .

والمراعى تسود فى الأحواض الهضبية الداخلية وقد فصلت بجبال إندفاعية وتلال متناثرة غطيت هى الأخرى بحشائش الرعى والشجيرات . مما جعل حرفة

الرعى تشكل حرفة رئيسية فى الجزيرة . كما تنتشر المراعى أيضاً على المدرجات الجبلية الشرقية . وتستخدم الأساليب العلمية الحديثة فى مزارع الاعلاف مع العناية بأصل السلالة للماشية والأغنام والماعز فإزدهرت صناعة الجلود ومستخرجات الألبان وحفظ اللحوم ويصدر فائض الإنتاج الى الخارج من ماشية وخنازير وأغنام .

كما تتجه العناية الى الثروة الخشبية من الغابات الصنوبرية والنفضية والمدارية . فقامت صناعة قطع الأخشاب بإنتاج سنوى نحو ٤ مليون متر مكعب ويصدر الفائض الى الخارج . كما إزدهرت بعض الصناعات الخشبية والورق .

وعلى الرغم من وجود ثروة معدنية فى الطبقات الصخرية البلورية إلا أن الإنتاج لايزال محدوداً . لبعض المعوقات التى منها ضعف شبكات الطرق فى المناطق التضاريسية الوعرة . وقلة الخرائط الجيولوجية التفصيلية والأجهزة العلمية المتطورة التى تكشف عن مواطن المعادن مع قلة الخبرة الفنية .

ومن هذه المعادن الذهب الذى قل إنتاجه منذ الحرب العالمية الثانية . وكذلك الميكا والفوسفات بإنتاج سنوى نحو ٤٠٠ طن لكل منهما . ويصدر معظم الإنتاج الى الخارج .

وتجهت الأهمية الى الثروة السمكية بأنواعها المختلفة فى المجارى النهرية المتعددة والخلجان الساحلية ولاسيما فى خلجان سهول الشمال والشمال الغربى . وحول الجزر الشمالية . وفى المياه العميقة فى المحيط الهندى ومضيق موزمبيق وحول جزر قومورو Comoro . بإنتاج سنوى نحو ٤٠٠ طن يصدر منها الى الخارج والشرق الإفريقى .

والمستقبل الإقتصادى يبشر بالازدهار فى هذه الجزيرة لتكامل عوامل جغرافية مختلفة منها الموقع الجغرافى الممتاز فى المحيط الهندى حيث تتجمع

طرق ملاحية هامة تمتد نحو البحر الاحمر وقناة السويس . وفضلاً عن تنوع مظاهر السطح بحيث يصلح للتوسع الزراعى اكثر من نصف مساحة الجزيرة . ولاسيما فى الأودية النهرية ذاك التربة الرسوبية الخصبة مع وفرة مياه الامطار على مدار العام .

وفى الداخل على الهضبة تزدهر حرفة الرعى الحديث المتطور لوفرة المراعى والأعلاف الجيدة مع وفرة الأيدى العاملة والسوق المستهلكة . كما أن التنوع المناخى أدى الى تنوع الثروة الزراعية والخشبية بفائض إنتاج متزايد يصدر الى السوق الافريقية وجنوب المحيط الهندى بنوع خاص . كما أن الجزيرة يمكن أن تستوعب النمو السكانى مع رفع المستوى الإقتصادى وذلك لتنوع مصادر الثروة الإقتصادية على النحو الذى أشرنا إليه من قبل .

والثروة السمكية تيشر بنمو متطور لوفرة هذه الثروة التى تغذى على مدار العام بتيارات مائية تحمل الأسماك من المحيط الهندى والمحيط الهادى والبحر الأحمر وحوض البحر المتوسط عبر تيارات قناة السويس .

## ٢- جزر القمر Comoro

وتتكون من عدة جزر بركانية صغيرة الى الشمال الغربى من جزيرة مدغشقر بين خطى عرض ١١ - ١٣ جنوباً . ومن أهم هذه الجزر جزيرة قومورى الكبرى Great Gomore وجزيرة مسرهيلي Moheli وجزيرة أوزا أودزى Ozaoudzi . وقد سكنها العرب فى هجراتهم الى الشرق الإفريقى ولاسيما جزر زنجبار وتنزانيا وموزمبيق . فمعظم السكان يدينون بالإسلام الحنيف ويتكلمون اللغة السواحلية المتأثرة بالعربية تأثيراً كبيراً . وسكانها وهم ٢/١ مليون نسمة تقريباً ضاقت بهم هذه الجزر فهم فى هجرة مستمرة الى غرب جزيرة مدغشقر . وقد إمتلكوا الكثير من الأراضى الزراعية . ويشكلون نحو ٢٥ ألف نسمة فى زيادة مستمرة .

ومناخياً تقع الجزر فى ظل مناخ مدارى عطر معظم العام بفعل الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية المحيطية . بإستضمامها مع المرتفعات الجبلية والهضبية البركانية التى تسود المظهر التضارىسى العام . وقد غمت بعض الغابات والحشائش المدارية . متناثرة على هذه الجزر ولاسيما فى مواجهة الرياح الممطرة .

وقطعت مساحات متناثرة من غطائها النباتى لتحل زراعة بعض الحبوب والخضروات والفاكهة للإستهلاك المحلى . وأهم ماتعتمد عليه هذه الجزر فى إقتصادها هو زراعة قصب السكر الذى يصدر فى سائل مكثف . كما يصدر جوز الهند المجفف والفانيليا . بالإضافة لزراعة الحشائش والنباتات التى تستخدم فى صناعة العطور والتى يصدر معظمها الى فرنسا . وهى من أهم دول أوروبا فى إنتاج العطور وتجارتها عالمياً .

وقد حصلت هذه الجزر على إستقلالها منذ أوائل التسعينات من القرن العشرين بعد حكم فرنسى دام أكثر من ١٥٠ عاماً . إلا أنها مرتبطة الى حد كبير بالإقتصاد والنفوذ الفرنسى .


### ٣- جزر كنارى Canary


وهى تشكل مدأ جزريا لأسبانيا فالسكان من أصلى أسباني يتكلمون الأسبانية . الا أنها جغرافياً هى جزر إفريقية حيث تقع بالقرب من سواحل المملكة المغربية بين خطى عرض ٣٠ - ٢٨ شمالاً . وتتكون من سبع جزر فى مساحة نحو ٩٢٧٢ كم<sup>٢</sup> . أكبرها جزيرة تنريف Tenerife وبها العاصمة الإدارية سانتا كروز Sta Cruz من اكبر مدن المجموعة الجزرية بسكان يبلغ عددهم اكثر من ١٧٠ ألف نسمة . يليها مدينة لاس بالماس Las Palmas بجزيرة جران كاناريا Gran Canaria . وهى تشبه الجزيرة السابقة فى المساحة والسكان .

وتضاريسها تتكون الجزر من كتل هضبية متضرسة تتخللها اودية صغيرة وتحيط بها سهول ساحلية ضيقة كثيراً ماتختفى لتشرق الحافات الهضبية مباشرة على مياه المحيط الأطلسى .

ومناخياً هذه الجزر تمثل مناخ البحر المتوسط الجزرى بأمطار أساساً فى نصف السنة الشتوى مع بعض أمطار صيفاً . مما ساعد على تنوع أنماط التربة مثل التربة الحمراء Terra Rosa التى تنتمى الى مناخ البحر المتوسط والتربة الرسوبية البنية والسوداء والتربة الجبلية وتربة السواحل السميكية . وقد إستثمرت فى زراعة الكروم والموز وبعض أنواع الفاكهة والخضروات .

إلا أن مظهرها التضاريسى الجبلى وتأثرها بتيار كنارى البارد اكسبها مناخاً معتدلاً جذب اليها السياح ولاسيما لمناظرها الطبيعية الخلابة . فهى مركز سياحى عالمى إذ أصبحت السياحة مرورها الأول . فنما عدد السكان حتى زاد على مليون نسمة .











# المفهرس


٥	الفصل الاول : المنهج الاقليمي والفكر الجغرافى .....
٢٥	الفصل الثانى : الجغرافيا الطبيعية لافريقيا .....
٧٩	الفصل الثالث : أنماط التربة بالشمال الافريقى دراسة إقليمية .....
١٥٣	الفصل الرابع : تنوع مصادر المياه بالشمال الافريقى دراسة تحليلية .....
٢٢٥	الفصل الخامس : النطاق الجبلى المغربى فى الوطن العربى .....
٢٥٣	الفصل السادس : الأهمية الاقتصادية للموانى العربية .....
٢٨٧	الفصل السابع : جغرافية مصر الطبيعية .....
٣١٨	الفصل الثامن : سكان مصر وتطورها الاقتصادى .....
٣٧١	الفصل التاسع : حوض البحر الاحمر .....
٣٩٩	الفصل العاشر : إريتريا وحوض البحر الاحمر .....
٥١١	الفصل الحادى عشر : افريقيا جنوب الصحراء .....

---





БИБЛИОТЕКА АЛЕКСАНДРИНА  
Университетская библиотека им. П. П. Ершова



0298511